

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Code tabs<sup>®</sup>-imeskelytabletit**

kokillaanankuoriute

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Code tabs on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Code tabs-imeskelytabletteja
3. Miten Code tabs-imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Code tabs-imeskelytablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Code tabs on ja mihin sitä käytetään**

Code tabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 2 mg kokillaanankuoresta (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby) valmistettua nesteuutetta kuivana. Kokillaanankuoriute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Code tabs-imeskelytabletteja**

##### **Älä käytä Code tabs-imeskelytabletteja**

- jos olet allerginen kokillaanankuoriuutteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

##### **Muut lääkevalmisteet ja Code tabs**

Kerro lääkäriillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai ravintolisä.

##### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

##### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen eikä koneiden käyttöön.

##### **Code tabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia, natriumbentsoattia ja glukoosisiirappia**

Yksi imeskelytabletti sisältää sakkaroosia 453,5 mg, bentsoattia 2,7 mg, natriumia 4,68 mg ja glukoosia 2,7 mg.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

### **3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään**

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Ei alle 4-vuotiaille.

### **Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www- sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

### **5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen**

Säilytä alle 25 °C:ssa, kuivassa paikassa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskiin. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

#### **Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää**

- Vaikuttava aine on kokillaanankuoresta (*Guarea rusbyi*, (Britton) Rusby) valmistettu etanolinesteute (2:1), 27 mg/tabletti. Tämä vastaa 2 mg:aa kuivattuna. Uttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.
- Muut aineet ovat sakkaroosi, ammoniumkloridi, talkki, natriumsyklamaatti (E 952), sokerikulööri (E 150a), magnesiumstearaatti, sakkariinatrium (E 954), mentoli (raseeminen), anisöljy ja lakritsiaromi (vesi, glyseroli (E 422), glukoosisiirappi, natriumbentsoaatti (E 211) ja kaliumsorbaatti.

**Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko**

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti  
Tabletin halkaisija on 13 mm ja paksuus 4,3 mm.

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

**Myyntiluvan haltija**

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

**Valmistaja**

allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12  
37081 Göttingen, Saksa

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.10.2020**

## Bipacksedel: Information till användaren

### Codetabs<sup>®</sup>-sugtabletter

cocillanabarkextrakt

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Codetabs är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Codetabs
3. Hur du använder Codetabs
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Codetabs ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Codetabs är och vad det används för**

Codetabs används för kortvarig symtomatisk behandling av hosta av olika orsaker.

1 sugtablett innehåller 2 mg vätskeextrakt tillverkat av cocillanabark (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby) i torr form. Cocillanabarkextrakten påverkar slemmets sammansättning och gör att slemmet i luftrören lossnar lättare i samband med infektion. Dessutom lindrar cocillanabarkextraktet hostretning.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Codetabs**

**Använd inte Codetabs**

- om du är allergisk mot cocillanabarkextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

**Andra läkemedel och Codetabs**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller kosttillskott.

**Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Preparatet skall inte användas under graviditet och amning.

**Körförmåga och användning av maskiner**

Preparatet har ingen inverkan på körförmåga eller användning av maskiner.

**Codetabs-sugtabletter innehåller sackaros, natriumbensoat och glukossirap**

En sugtablett innehåller sackaros 453,5 mg, bensoat 2,7 mg, natrium 4,68 mg och glukos 2,7 mg.

Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter, diskutera med läkaren innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

### 3. Hur du använder Codetabs

För vuxna 1–2 tabletter 3–4 gånger per dygn.

För ungdomar mellan 11 och 15 år ½ tablett 3–4 gånger per dygn.

För barn mellan 4 och 10 år ¼ tablett 3–4 gånger per dygn.

Inte för barn under 4 år.

### Om du har tagit för stor mängd av Codetabs

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

### 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid rekommenderade doser förekommer knappast några biverkningar. Om biverkningar förekommer, bör läkaren alltid informeras.

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA.

### 5. Hur Codetabs ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C, på ett torrt ställe.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förstör gamla läkemedel och förpackningar enligt de föreskrifter som gäller i din hemkommun. Kasta blisterförpackningen i soporna. Kartongasken och bipacksedeln kan återvinnas.

### 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är etanolvätskeextrakt (2:1) tillverkat av cocillanaextrakt (*Guarea rusbyi* (Britton) Rusby), 27 mg/tablett. Det motsvarar 2 mg i torr form. Lösningmedlet för extraktion är 40 % V/V etanolvattenblandning.

- Övriga innehållsämnen är sackaros, ammoniumklorid, talk, natriumcyklammat (E 952), sockerkulör (E 150a), magnesiumstearat, sackarinnatrium (E 954), mentol (racemisk), anisolja och lakritsarom (vatten, glycerol (E 422), glukossirap, natriumbensoat (E 211) och kaliumsorbit.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Brun, rund, plan tablett med fasad kant och korskår

Tablettens diameter är 13 mm och tjocklek 4,3 mm.

Förpackningsstorleken är 20 sugtabletter.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

**Tillverkare**

allphamed Pharmed Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12

37081 Göttingen, Tyskland

**Denna bipacksedel ändrades senast 29.10.2020**