

## Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

### Berinert 2000 IU, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuos ta varten Ihmisen C1-esteraasi-inhibiittori

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tie toja.

- Säilytä tämä pakkaus seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus selosteessa. Ks. kohta 4.

#### Tässä pakkaus selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Berinert on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Berinert-valmistetta
3. Miten Berinert-valmisteita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Berinert-valmisten säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Berinert on ja mihin sitä käytetään

##### **Mitä Berinert on?**

Berinert koostuu kuiva-aineesta ja liuottimesta. Niistä sekoitetaan liuos, joka annetaan injektiona iholle alle.

Berinert on valmistettu ihmisen plasmasta (veren nestemäisestä osasta). Se sisältää vaikuttavana aineena proteiiniperäistä ihmisen C1-esteraasi-inhibiittoria.

##### **Mihin Berinert-valmisteita käytetään?**

Berinert-valmisteita käytetään hereditaarisena angioedeeman (HAE, perinnöllinen angioedeema) toistuvien kohtausten ennaltaehkäisyyn nuorilla ja aikuisilla. HAE on synnynnäinen verisuonistosairaus. Se ei ole allergiasairaus. HAE johtuu tärkeän valkuaisaineen, C1-esteraasi-inhibiittorin, vajausksesta, puutumisesta tai virheellisestä muodostumisesta elimistössä. Sairaudelle ovat luonteenomaisia seuraavat oireet:

- äkillisesti ilmaantuva käsi- ja jalkaterien turpoaminen
- äkillisesti ilmaantuva kasvojen turpoaminen, johon liittyy kiristyksen tunnetta
- silmäluomien turpoaminen, hulut turpoaminen, mahdollisesti kurkunpään (äänihulut) turpoaminen, johon liittyy hengitysvaikeuksia
- kielen turpoaminen
- vatsanseudun äkillinen, kova sisäelinkipu (coliikkikipu).

Sairaus voi kohdistua yleisesti ottaen mihin tahansa elimistön osaan.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Berinert-valmista

Seuraavissa kohdissa on tietoa, joka lääkärin on huomioitava ennen kuin saat Berinert-hoitoa.

##### **Älä käytä Berinert-valmista**

- jos sinulla on esiintynyt henkeä uhkaavia välittömiä yliherkkyyssreaktioita, anafylaksia mukaan lukien, proteiini C1-esteraasi-inhibiittorille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

**Kerro lääkärille tai apteekkissa, jos olet allerginen jollekin lääkkeelle tai ruoka-aineelle.**

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Berinert-valmistetta:

- jos sinulla on vaikeita allergisia tai anafylaksian kaltaisia reaktioita (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa vaikeita hengitysvaikeuksia tai huimausta). **Berinert-valmisten antaminen on lope tettava heti (esim. injektion anto on keskeytettävä).**
- jos sinulla on aiemmin ollut veren hyytymisongelma. Veritulppia on esiiintynyt laskimoon annettavaa Berinert-hoitaa saavilla potilailla. Hyvin suuret Berinert-annokset muissa kuin HAE-taudissa saattavat lisätä veritulppien vaaraa. Yhteyttä veritulppiin ei kuitenkaan ole osoitettu ihon alle annettavan Berinerten käytön yhteydessä, kun lääkäri määräää lääkettä suositusannoksilla. Kerro lääkärille, jos sinulla on aiemmin ollut sydän- tai verisuonisairaus, aivohalvaus, veritulppia tai vereson paksua, sinulla on kestokatetri/laskimokatetri tai olet joutunut olemaan liikkumatta jonkin aikaa. Nämä saattavat lisätä veritulpan vaaraa Berinerten käytön jälkeen. Kerro lääkärille myös, mitä lääkkeitä käytät, sillä tietty lääkkeet, kuten ehkäisytabletit ja androgeenit (mieshormonit), saattavat lisätä veritulpan vaaraa.

Lääkäri punnitsee tarkoin Berinert-hoidon hyödyt näiden komplikaatioiden riskiin nähdien.

### **Virusturvallisus**

Kun ihmisen verestä tai plasmasta valmistetaan lääkkeitä, infektioiden siirtymistä potilaisiin estetään tietyn toimenpitein. Tällaisia ovat:

- veren ja plasman luovuttajien tarkka valinta sen varmistamiseksi, että infektiota mahdollisesti kantavat henkilöt voidaan sulkea pois ja
- kaikesta luovutetusta verestä ja plasmasta sekä plasmapoolista tutkitaan viruksiin/infektioihin viittaavat merkit.

Tällaisten valmisteiden valmistajat ovat myös ottaneet veri- tai plasmavalmisteiden valmistuksessa käyttöön vaiheita, joissa virukset voidaan inaktivoida tai poistaa. Tällaisista toimenpiteistä huolimatta taudina heuttajien siirtymisen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois, kun käytetään ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkevalmisteita. Tämä koskee myös tuntemattomia tai vasta kehittymässä olevia viruksia tai muuntyypisiä infektiota.

Käytössä olevien toimenpiteiden katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV, aids-virus), hepatiitti B -virukseen, hepatiitti C -virukseen (maksatulehdus) ja vaipattomiin viruksiin kuten hepatiitti A -virus (maksatulehdus) ja parvovirus B19.

Lääkäri saattaa suositella rokotuksen ottamista hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan, jos saat säännöllisesti/toistuvasti ihmisen plasmasta valmistettuja lääkevalmisteita.

Antopäivä, valmisten eränumero (Lot) ja potilaalle annettu lääkemäärä kehotetaan kirjaamaan Berinert-valmisten jokaisen antokerran yhteydessä.

### **Muut lääkevalmisteet ja Berinert**

- Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt.
- Berinert-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden ja liuottimien kanssa samaan ruiskuun.

### **Raskaus ja imetys**

- Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Berinert ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

### **Berinert sisältää natriumia**

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## **3. Miten Berinert-valmista käytetään**

Berinert on tarkoitettu annettavaksi itse pistoksenä ihmisen alle. Tarvittaessa sinua tai hoitajaasi opastetaan, miten Berinert annetaan.

## Annostus

Suositeltu Berinert-annos on 60 IU painokiloa kohden.

## Lapset ja nuoret

Suositusannos on sama kuin aikuisilla.

## Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

## Jos käytät enemmän Berinert-valmistetta kuin sinun pitääsi

Jos olet saanut tai ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkärin, sairaalaan tai Myrkystytietokeskukseen (puh. [0800 147111](tel:0800147111)) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

## Käyttövalmiuksi saattaminen ja antotapa

Jos lääkäri päättää, että kotihoito voi soveltu sinulle, hän antaa sinulle yksityiskohtaiset ohjeet. Sinun täytyy myös kirjata jokainen kotona annettu hoitoannos päiväkirjaan, jonka otat mukaan lääkärikäynneille. Sinun tai avustajasi injektiotekniikka tarkistetaan säännöllisesti jatkuvan oikean kästtelyn varmistamiseksi.


## Yleiset ohjeet




- Kuiva-aine on sekoitettava ja vedettävä injektiopullossa ruiskuun aseptisissa olosuhteissa. Käytä tuotteen mukana toimitettua ruiskua.
- Käyttövalmaksi sekoitetun liuoksen on oltava väritöntä ja kirkasta tai hieman opalisoivaa. Liuos on tarkistettava suodattamisen tai ruiskuun vetämisen (ks. seuraavassa) jälkeen silmämäärisesti ennen antoa, ettei siinä ole havaittavissa hiukkasia eikä värimuutoksia.
- Älä käytä liuosta, jos se on sameaa tai siinä on sakkaa.
- Käytämätön valmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten ja lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

## Käyttövalmaksi saattaminen


Anna Berinert-kuiva-aineen ja liuottimen lämmetä huoneenlämpöiseksi avaamatta kumpaakaan injektiopulloa. Tämä voidaan tehdä joko antamalla injektiopullojen olla huoneenlämmössä noin tunnin ajan tai pitämällä niitä kädessä muutaman minuutin ajan. ÄLÄ altista injektiopulloja suoralle lämmölle. Injektiopulloja ei saa lämmittää ruumiinlämpötilaa (37 °C) korkeammassa lämpötilassa.

Poista suojakorkki varovasti liuottimen ja kuiva-aineen sisältävästä injektiopullossa. Puhdistaa kummankin injektiopullon esiin tullut kumitulppa alkoholipyyhkeellä (kumpikin eri pyyhkeellä) ja anna tulppien kuivua. Liuotin voidaan nyt siirtää kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon künnitettävän antolaitteen (Mix2Vial) avulla. Noudata seuraavia ohjeita.



 3	<p>3. Poista pakaus varovasti Mix2Vial-laitteesta siten, että pidät pakkauksen reunasta kiinni ja vedät <b>kohtisuoraan</b> ylöspäin. Varmista, että vedät pois vain pakkauksen etkä Mix2Vial-laitetta.</p>
 4	<p>4. Aseta injektiopullo tasaiselle ja tukevalle alustalle. Käännä liuotinpullo ja siihen kiinnitetty Mix2Vial ylösalaisin, ja paina läpinäkyvän sovitimen piikki <b>suoraan</b> kuiva-aineinjektiopullon tulpan <b>läpi</b>. Liuotin siirtyy automaattisesti kuiva-aineen sisältäväan injektiopulloon.</p>
 5	<p>5. Ota toisella kädellä kiinni Mix2Vial-laitteen kuiva-aineen sisältävän injektiopallon puolelta ja toisella kädellä liuottimen sisältävän injektiopallon puolelta ja kierrä vastapäivään laite varovasti kaheen osaan. Hävitä liuotinpullo ja siihen kiinnitetty sininen Mix2Vial-sovitin.</p>
 6	<p>6. Pyöritlee kuiva-aineinjektiopuloa ja siihen kiinnitettyä läpinäkyvää sovitinta, kunnes kuiva-aine on liuennut täysin. Ei saa ravistaa.</p>
 7	<p>7. Vedä tyhjään, steriiliin ruiskuun ilmaa. Käytä tuotteen mukana toimitettua ruiskua. Kun kuiva-aineen sisältävä injektiopullo on oikeinpäin, kiinnitä ruisku Mix2Vial-sovitimen Luer Lock -liittimeen myötäpäivään kiertämällä. Ruiskuta ilma kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.</p>

## Valmisten vetäminen ruiskuun ja anto

		8. Kun ruiskun mäntä on alas painettuna, käännä laite ja injektiopullo ylös salaisin ja vedä liuos ruiskuun vetämällä mäntää hitaasti ulospäin.
		9. Kun liuos on nyt siirretty ruiskuun, ota tukeva ote ruiskun kammiosta (pitäen ruiskun mäntää samalla alas päin) ja irrota ruiskusta läpinäkyvä Mix2Vial-sovitin kiertämällä vastapäivään.




### Antotapa

#### Itseannostelu (anto ihon alle)

Lääkäri opastaa, miten Berinert pistetään turvallisesti. Kun osaat pistää lääkkeen oikeaoppisesti, noudata annossa seuraavia ohjeita.

#### Ohjeet Berinert-valmisten itseannosteluun

<b>Vaihe 1: Kokoa tarvittavat välineet</b> Ota esille Berinert-ruisku, seuraavat kertakäyttöiset välineet ja muut tarvikkeet (teräville esineille tarkoitettu säiliö tai muu astia, hoitopäiväkirja tai muistivihko):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypoderminen neula tai infuusiosetti ihmalaista antoa varten</li> <li>• Steriili ruisku (käytä silikonitonta ruiskua)</li> <li>• Alkoholipyyhkeet</li> <li>• Hansikkaat (jos terveydenhoitohenkilökunta näin suosittelee)</li> </ul>	
<b>Vaihe 2: Puhdistaa alusta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyyhi pöytä tai muu tasainen alusta huolellisesti alkoholipyyhkeillä.</li> </ul>	
<b>Vaihe 3: Pese kädet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pese kädet huolella ja kuivaa ne.</li> <li>• Jos sinua on kehotettu käyttämään hansikkaita infuusion valmistamisen aikana, pue ne pääälle.</li> </ul>	

<p><b>Vaihe 4: Valmistele pistoskohta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valitse vatsan alueelta sopiva pistoskohta, ellei lääkäri ole kehottanut toisin (Kuva 1).</li> <li>• Pistä pistos aina eri kohtaan kuin edellisellä pistoskerralla ja vaihtele puolia.</li> <li>• Uuden pistoskohdan tulee olla vähintään 5 cm:n (2 tuuman) päässä edellisestä pistoskohdasta.</li> <li>• Älä koskaan valitse pistoskohdaksi ihoalueutta, jossa esiintyy kutinaa, turvotusta, kipua, mustelmia tai punoitusta.</li> <li>• Vältä pistämästä kohtiin, joissa on arpi tai raskausarpia.</li> <li>• Puhdista pistoskohdan iho alkoholipyyhkeellä ja anna ihan kuivua (Kuva 2).</li> </ul>	 <p>Kuva 1</p>  <p>Kuva 2</p>
<p><b>Vaihe 5: Pistäminen vatsan alueelle</b></p> <p>Noudata terveydenhuoltohenkilökunnan ohjeita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kiinnitä hypoderminen neula tai infuusiosetti ihonalaista antoa varten (siipineula) ruiskuun terveydenhoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Valmistele neula tai letkusto ohjeiden mukaan.</li> </ul> <p>Injektiö käyttäen hypodermistä neulaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Työnnä neula ihopoimuun (Kuva 3).</li> </ul> <p>Injektiö ihonalaiseen antoon tarkoitetun infuusiosetin avulla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Työnnä neula ihopoimuun (Kuva 4).</li> </ul>	 <p>Kuva 3</p>  <p>Kuva 4</p>
<p><b>Vaihe 6: Siivous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun olet pistänyt koko määrän, irrota neula ihosta.</li> <li>• Hävitä käytämätön liuos ja kaikki antovälineet asianmukaisella tavalla paikallisten vaatimusten mukaisesti.</li> </ul>	
<p><b>Vaihe 7: Kirja hoito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirjaa Berinert-injektiopullon etiketissä oleva eränumero sekä infuusion antopäivä ja kellonaika hoitopäiväkirjaan tai muistivihkoon aina, kun käytät Berinert-valmistetta.</li> </ul>	

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

##### Ota heti yhteyttä lääkäriin

- jos sinulle ilmaantuu jokin haittavaiketus tai
- jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Haittavaikutukset ovat Berinert-hoidon yhteydessä harvinaisia.

Seuraavia haittavaikutuksia on hyvin yleisesti (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä):

- Pistoskohdan reaktiot (mustelma, kylmäntunne, eritevuoto, punoitus, verenpurkauma, verenvuoto, kovettuma, turvotus, kipu, kutina, ihottuma, arpi, turvotus, nokkosihottuma, kuumotus).

- Nasofaryngiitti (vuotava tai tukkoinen nenä, aivastelu, silmien vetistäminen).

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu yleisesti (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä):

- Yliherkkyyss- tai allergiset reaktiot (kuten yliherkkyyys, kutina, ihottuma ja nokkosihottuma).
- Heitehuimaus.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Berinert-valmisten säilyttäminen**

- **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**
- Älä käytä tätä läkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
- Säilytä alle 30 °C.
- Ei saa jäätää.
- Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
- Berinert ei sisällä säilytysainetta, joten valmiiksi sekoitettu injektioneste on mieluiten käytettävä heti.
- Jos käyttövalmiiksi sekoitettua injektionestettä ei anneta heti, se on käytettävä 8 tunnin kuluessa ja säilytettävä **injektiopullossa**.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Berinert sisältää**

#### **Vaikuttava aine on:**

Ihmisen C1-esteraasi-inhibiittori (2000 IU injektiopullossa, kun se on saatettu käyttövalmiiksi sekoittamalla 4 ml:aan injektionesteisiin käytettävä vettä 500 IU/ml)

Ks. lisätietoja kohdasta *Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille.*

#### **Muut aineet ovat:**

Glysiimi, natriumkloridi, natriumsitraatti

*Liuotin:* Injektionesteisiin käytettävä vesi

#### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot**

Berinert on valkoinen kuiva-aine, jonka lisäksi pakkaus sisältää injektionesteisiin käytettävää vettä liuottimena käytettäväksi.

Käyttövalmiiksi sekoitetun liuoksen on oltava väritöntä ja kirkasta tai hieman opaalinhohtoista.

#### **Pakkaus**

Ulkopakkaus sisältää:

yhden kuiva-aineen sisältävän injektiopullon

yhden 4 ml injektionesteisiin käytettävää vettä sisältävän injektiopullon

yhden suodattimella varustetun siirtolaitteen 20/20

Annostelutarvikkeet (sisäläatikko) sisältävät:

yhden kertakäytöisen 5 ml:n ruiskun

yhden hypodermisen neulan  
yhden injektiosetin ihonalaista injektiota varten (siipineula)  
kaksi alkoholipyyhettä  
yhden laastarin

Pakkaus, jossa 1 x 2000 IU, sekä kotelo, jossa 1 antolaitte.  
Pakkaus, jossa 5 x 2000 IU, sekä kotelo, jossa 5 antolaitetta.  
Pakkaus, jossa 20 x 2000 IU, sekä 4 koteloja, joissa 5 antolaitetta.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

CSL Behring GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76  
35041 Marburg  
Saksa

**Lisätie toa tästä valmisteesta antaa myyntiluvan haltajan edustaja:**

CSL Behring AB  
Box 712  
182 17 Danderyd  
Ruotsi

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Berinert 2000 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung \_\_\_\_\_ Itävalta  
Berinert 2000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie \_\_\_\_\_ Belgia  
Berinert 2000 \_\_\_\_\_ Kypros, Saksa, Kreikka, Puola, Portugali  
Беринерт 2000, Прах и разтворител за инжекционен разтвор C1- естеразен инхибитор, човешки \_\_\_\_\_ Bulgaria  
Berinert 2000 IU \_\_\_\_\_ Tshekki, Slovakia  
Berinert \_\_\_\_\_ Tanska, Italia  
Berinert 2000 IU, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten \_\_\_\_\_ Suomi  
Berinert 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable \_\_\_\_\_ Ranska, Luxemburg  
Berinert 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz \_\_\_\_\_ Unkari  
Berinert 2000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, opplösning \_\_\_\_\_ Norja  
Berinert 2000 2000 UI, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă \_\_\_\_\_ Romania  
Berinert 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje \_\_\_\_\_ Slovenia  
Berinert 2000 UI polvo y disolvente para solución inyectable subcutánea \_\_\_\_\_ Espanja  
Berinert 2000 IE, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning \_\_\_\_\_ Ruotsi  
Berinert 2000 IU Powder and solvent for solution for injection \_\_\_\_\_ Iso-Britannia, Malta

**Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi: 11.10.2021**

---

**Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille**

**VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

C1-esteraasi-inhibiittorien teho ilmaistaan WHO:n ihmisen C1-esteraasi-inhibiittoreita koskevan voimassa olevan standardin mukaisesti kansainvälisänä yksikköinä (International Units, IU).

## Bipacksedel: Information till användare

### Berinert 2000 IE, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning human C1-esterashämmare

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackse del finns information om följande:**

1. Vad Berinert är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Berinert
3. Hur du använder Berinert
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Berinert ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Berinert är och vad det används för**

##### **Vad är Berinert?**

Berinert består utav ett pulver och en spädningsvätska, som bereds till en färdig lösning. Lösningen ges sedan som en injektion under huden.

Berinert tillverkas av human plasma (vätskedelen i blodet). Det innehåller proteinet human C1-esterashämmare som aktivt innehållsämne.

##### **Vad används Berinert för?**

Berinert används för att förebygga återkommande anfall av ödem som uppträder vid ärfligt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna. HAE är en medfödd sjukdom i blodkärlen. Det är en icke-allergisk sjukdom. HAE orsakas av brist på, frånvaro av eller en defekt syntes av C1-esterashämmare, som är ett viktigt protein. Sjukdomen kännetecknas av följande symptom:

- plötslig svullnad av händer och fötter
- plötslig svullnad av ansiktet med spänningskänsla
- ögonlocksvullnad, läppsvullnad, eventuell svullnad i luftstrupen med andningssvårigheter,
- svullen tunga
- koliksmärter i magen

Allmänt kan alla delar av kroppen påverkas.

Det humana proteinet C1-esterashämmare som finns i Berinert kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Berinert**

Följande avsnitt innehåller information som din läkare ska beakta innan du får Berinert.

##### **Använd inte Berinert**

- om du har upplevt livshotande och plötsliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, mot C1-esterashämmarproteinet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel som anges i avsnitt 6.

**Informera din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot något läkemedel eller mot någon mat.**

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Berinert:

- om du får en allvarlig allergisk eller anafylaktisk reaktion (en allvarlig allergisk reaktion som medför stora svårigheter att andas eller yrsel). **Användningen av Berinert ska genast avbrytas (det vill säga injektionen ska avbrytas).**
- om du tidigare har haft problem med blodproppar. Blodproppar har inträffat hos patienter som fått Berinert intravenöst (injektion i en ven). Väldigt höga doser av Berinert vid andra sjukdomar än HAE kan öka risken för blodproppar. Det finns däremot ingen fastställd koppling mellan blodproppar och Berinert som ges subkutant (injektion under huden) vid den dos som läkaren rekommenderas att förskriva. Tala om för läkaren om du tidigare har haft en hjärt- eller kärlsjukdom, stroke (slaganfall), blodproppar eller har tjockt blod, en inbyggd kateter/åtkomstanordning i någon av dina arter, eller har varit orörlig under en längre tid. Dessa tillstånd kan öka risken för att du ska få en blodpropa efter att ha använt Berinert. Tala även om för läkaren vilka läkemedel du använder, eftersom vissa läkemedel, såsom p-piller eller vissa androgener (manliga könshormon), kan öka risken för att du ska få en blodpropa.

Din läkare kommer att noggrant överväga nyttan med behandling med Berinert jämfört med risken för ovanstående komplikationer.

### **Virussäkerhet**

När läkemedel framställs ur humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

- ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts, samt
- test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion.

Tillverkare av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel framställda ur humant blod eller plasma ges. Detta gäller även okända eller nya virus och andra typer av infektioner.

De åtgärder som vidtas anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV som orsakar AIDS), hepatit B-, hepatit C-virus (inflammation i levern) och mot icke höljeförsedda virus såsom hepatit A (inflammation i levern) och parvovirus B19.

Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med humana plasmaderiverade preparat.

Det rekommenderas starkt att datum för administering, batchnummer (Lot) och injicerad volym registreras varje gång du får Berinert.

### **Andra läkemedel och Berinert**

- Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.
- Berinert ska inte blandas med andra läkemedel och spädningsvätskor i sprutan.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Berinert påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### Berinert inne håller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## 3. Hur du använder Berinert

Berinert är avsedd för att ges av dig själv eller din vårdgivare genom subkutan injektion (injektion under huden). Du eller din vårdgivare måste utbildas i hur man administrerar Berinert.

### Dosering

Den rekommenderade dosen av Berinert är 60 IE/kg kroppsvikt. IE = Internationella enheter.

### Barn och ungdomar

Den rekommenderade dosen är densamma som hos vuxna.

### Om du har använt för stor mängd av Berinert

Inga fall av överdosering har rapporterats. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. [0800 147111](tel:0800147111)) för bedömning av risken samt rådgivning.

### Beredning och administreringssätt

Om din läkare beslutar att det kan vara lämpligt med hembehandling för dig, kommer han/hon att ge dig detaljerade instruktioner. Du kommer att ombes föra dagbok för att dokumentera varje behandling som du får hemma och att ta med den till dina läkarbesök. Din eller din medhjälparens injektionsteknik kommer med jämn mellanrum att ses över för att försäkra fortsatt korrekt hantering.


### Allmänna instruktioner






- Pulvret måste lösas och dras upp från injektionsflaskan under aseptiska förhållanden. Använd sprutan som medföljer produkten.
- Den färdigberedda lösningen ska vara färglös och klar till lätt opaliserande. Efter filtrering eller uppdrag (se nedan) ska lösningen inspekteras visuellt efter små partiklar och missfärgning innan den ges.
- Använd inte lösningen om den är grumlig eller om den innehåller flagor eller partiklar.
- Oanvänd eller överbliven produkt ska kastas enligt gällande riktlinjer.

### Beredning


Utan att öppna injektionsflaskorna, värm Berinert pulver och lösningen till rumstemperatur. Detta kan göras antingen genom att lämna injektionsflaskorna i rumstemperatur ca 1 timme eller genom att hålla dem i handen ett par minuter. UTSÄTT INTE injektionsflaskorna för direktvärme. Injektionsflaskorna ska inte värmas över kroppstemperatur (37°C).

Avlägsna försiktigt skyddslocken från injektionsflaskorna. Rengör gummipropparna på båda injektionsflaskorna med en alkoholtork och låt dem torka. Lösningsmedlet kan nu överföras till pulvret med hjälp av administrationssetet (Mix2Vial). Följ instruktionerna nedan.

 1	1. Öppna Mix2Vial-förpackningen genom att dra av förslutningen. Ta <b>inte</b> ut Mix2Vial ur förpackningen!
--	--

 2	<p>2. Placera flaskan med vätska på en plan, ren yta och håll fast flaskan stadigt. Tag förpackningen med Mix2Vial-setet och tryck fast den blå delen <b>rakt ner</b> på vätskeflaskans propp.</p>
 3	<p>3. Ta försiktigt bort förpackningen från Mix2Vial-setet genom att ovanifrån ta tag om kanten och dra <b>rakt upp</b>. Se till att endast förpackningen tas bort, inte Mix2Vial-setet.</p>
 4	<p>4. Ställ flaskan med pulver på ett plant, fast underlag. Vänd vätskeflaskan med det fastsatta Mix2Vial-setet och tryck fast den transparenta adapttern <b>rakt ner</b> på pulverflaskans propp. Vätskan kommer automatiskt att rinna över till pulverflaskan.</p>
 5	<p>5. Fatta tag i den del av Mix2Vial-setet där pulverflaskan sitter med ena handen och den del av Mix2Vial-setet där vätskeflaskan sitter med den andra handen och skruva isär setet motsols i 2 delar. Kassera vätskeflaskan med den blå delen fastsatt.</p>
 6	<p>6. Rotera pulverflaskan med den transparenta adapttern försiktigt tills pulvret löst sig fullständigt. Skaka inte flaskan.</p>
 7	<p>7. Dra in luft i en tom, steril spruta. Använd sprutan som medföljer produkten. Medan pulverflaskan står rakt upp kopplas sprutan ihop med Luer-locksinpassningen på Mix2Vial-delen genom att skruva medsols. Spruta in luft i flaskan.</p>

## Fyllning av spruta och administrering


	<p>8. Med sprutkolen intryckt vänds flaskan (tillsammans med set och spruta) upp och ned. Dra in lösningen i sprutan genom att föra kolen långsamt tillbaka.</p>
	<p>9. När all lösning har förts över till sprutan, fatta ett fast tag om sprutan (håll sprutan med kolven nedåt) och koppla bort Mix2Vial-setet från sprutan genom att skruva isär moturs.</p>

## Administrering

### Självadministrering (subkutan administrering)

Läkaren kommer att lära dig hur du säkert administrerar Berinert. När du väl lärt dig att ge Berinert till dig själv, följ instruktionerna nedan.

### Instruktioner för att ge Berinert till dig själv

<b>Steg 1: Samla ihop tillbehör</b> <p>Samla ihop Berinert-sprutan och följande engångsartiklar, och andra artiklar (behållare för vassa föremål eller annan behållare, behandlingsdagbok eller loggbok):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Injektionsnål eller subkutant infusionsset</li> <li>• Steril spruta (använd en silikonfri spruta)</li> <li>• Alkoholtorkar</li> <li>• Handskar (om det rekommenderas av din läkare)</li> </ul>	
<b>Steg 2: Rengör ytan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör ett bord eller annan plan yta noggrant med hjälp av alkoholtorkar.</li> </ul>	
<b>Steg 3: Tvätta händerna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvätta dina händer noga och torka dem.</li> <li>• Om du har blivit tillsagd att ha på dig handskar när du förbereder infusionen, sätt på dig handskarna.</li> </ul>	
<b>Steg 4: Förbered injektionsstället</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj ett område i bukområdet (magen) för injektionen, såvida inte din läkare har sagt att du ska använda ett annat område (Figur 1).</li> <li>• Använd ett annat ställe än vid förra injektionen, du ska byta mellan olika injektionsställen.</li> <li>• Nya injektionsstället ska vara minst 5 centimeter bort från det ställe där du gav din förra injektion.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ge aldrig en injektion i områden där huden klärt, är svullen, gör ont, har blåmärken eller är röd.</li> <li>Undvik att ge dig injektioner på ställen där du har ärr eller bristningar.</li> <li>Rengör huden på injektionsstället med en alkoholtork och låt huden torka (Figur 2).</li> </ul>	 <b>Figur 1</b>  <b>Figur 2</b>
<p><b>Steg 5: Injektion i bukområdet</b></p> <p>Enligt anvisningar från din läkare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fäst en injektionsnål eller subkutant infusionsset ("butterfly") till sprutan enligt instruktioner från din läkare. Fyll nålen eller slangen enligt vad som krävs och enligt instruktioner.</li> </ul> <p>Injektion med injektionsnål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stick in nålen i hudvecket (Figur 3).</li> </ul> <p>Injektion med subkutant infusionsset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stick in nålen i hudvecket (Figur 4).</li> </ul>	 <b>Figur 3</b>  <b>Figur 4</b>
<p><b>Steg 6: Städa undan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta bort nålen när du har injicerat hela mängden av Berinert.</li> <li>Kassera oanvänt lösning och all administreringsutrustning på ett lämpligt sätt enligt gällande riktlinjer.</li> </ul>	
<p><b>Steg 7: Registrera behandling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrera lot-/batch-numret från etiketten på Berinerts injektionsflaska i din behandlingsdagbok eller loggbok med datum och tid för infusion varje gång du använder Berinert.</li> </ul>	

#### 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

##### Kontakta din läkare omedelbart

- om någon av biverkningarna uppsträder, eller**
- om du märker några biverkningar som inte nämns i den här informationen**

Biverkningar av Berinert är sällsynta.

Följande biverkningar har observerats mycket vanligen (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- Reaktioner vid området där injektionen gavs (blåmärken, köldkänsla, utsöndring, hudrodnad, hematom (utgjutning av blod i huden), blödning, förhårdning, ödem, smärta, kåda, utslag, ärrbildning, svullnad, nässelutslag, värmekänsla).
- Nasofaryngit (rinnande eller täppt näsa, nysningar, rinnande ögon)

Följande biverkningar har observerats vanligen (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Överkänslighets- eller allergiska reaktioner** (såsom överkänslighet, kåda, utslag och nässelutslag).
- Yrsel**

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## 5. Hur Berinert ska förvaras

- **Förvara detta läke medel utom syn- och räckhåll för barn.**
- Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.
- Förvaras vid högst 30 °C.
- Får ej frysas.
- Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
- Berinert innehåller inget konserveringsmedel så den färdigberedda lösningen bör användas omedelbart.
- Om den färdigberedda lösningen inte används omedelbart måste den användas inom 8 timmar och ska bara förvaras i **inje k tionsf l a s k a n**.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

#### ***Den aktiva substansen är:***

Human C1-esterashämmare (2000 IE/injektionsflaska; efter beredning med 4 ml vatten för injektionsvätskor: 500 IE/ml)

Se avsnitt "Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal" för ytterligare information.

#### ***Övriga innehållsämnen är:***

Glycin, natriumklorid, natriumcitrat

Spädningsvätska: Vatten för injektionsvätskor

### Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Berinert finns som ett vitt pulver och tillhandahålls tillsammans med vatten för injektionsvätskor som spädningsvätska. Den färdigberedda lösningen ska vara färglös och klar till lätt opaliserande.

### Förpackning

Kartongen innehåller:

- 1 injektionsflaska med pulver
- 1 injektionsflaska med 4 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringsset med filter 20/20

Tillbehör för administrering (innerkartong):

1 engångsspruta (5 ml)

1 injektionsnål

1 subkutant injektionsset ("butterfly")

2 alkoholtorkar

1 plåster

Förpackning med 1 x 2000 IE, inklusive en kartong med ett administreringsset.

Multipack för 5 x 2000 IE, inklusive en kartong med 5 administreringsset.

Multipack för 20 x 2000 IE, inklusive 4 kartonger med 5 administreringsset.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

**Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:**

CSL Behring GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76  
35041 Marburg  
Tyskland

**Ytterligare upplysningar om detta läke medel kan erhållas av ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:**

CSL Behring AB  
Box 712  
182 17 Danderyd  
Sverige

**Detta läke medel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbeotsområdet under namnen:**

Berinert 2000 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung Österrike  
Berinert 2000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Belgien  
Berinert 2000 Cypern, Tyskland, Grekland, Polen, Portugal  
Беринерт 2000, Прах и разтворител за инжекционен разтвор  
C1- естеразен инхибитор, човешки Bulgarien  
Berinert 2000 IU Tjeckien, Slovakien  
Berinert Danmark, Italien  
Berinert 2000 IU, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Finland  
Berinert 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable Frankrike, Luxemburg  
Berinert 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz Ungern  
Berinert 2000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, opplosning Norge  
Berinert 2000 2000 UI, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă Rumänien  
Berinert 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Slovenien  
Berinert 2000 UI polvo y disolvente para solución inyectable subcutánea Spanien  
Berinert 2000 IE, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Sverige  
Berinert 2000 IU Powder and solvent for solution for injection Storbritannien, Malta

**Denna bipack s edel ändrades senast: 11.10.2021**

---

**Följande uppgifter är endast avsedda för helse- och sjukvårdspersonal**

**KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

Styrkan för human C1-esterashämmare uttrycks med internationella enheter (IE), som är relaterade till den nuvarande WHO-standarden för C1-esterashämmerprodukter.