

## **1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Bepanthen 50 mg/g voide

## **2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

1 g voidetta sisältää 50 mg dekspantenolia

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sisältää setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja villarasvaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

## **3. LÄÄKEMUOTO**

Voide

Valmisteen kuvaus: rasvainen, valkokeltainen.

## **4. KLIINISET TIEDOT**

### **4.1. Käyttöaiheet**

Palovammat, vaippaihottumat, huonosti paranevat haavat, myös nännihaavaumat, rohtuneet huulet ja suupielten haavat, naarmut ja pykimät, genitaalialueen haavaumat.

Paikallisesti käytettynä edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista ja epiteelikerroksen muodostumista.

### **4.2. Annostus ja antotapa**

#### Annostus

Aikuiset ja pediatriset potilaat: Voidetta levitetään kerran tai useita kertoja päivässä vaurioituneelle alueelle.

Imetyksenaikainen rintojen hoito: Voidetta levitetään nännien alueelle imetyksen jälkeen (ks. myös kohta 4.6).

Vaippaihottuman hoito: Voidetta levitetään jokaisen vaipanvaihdon yhteydessä.

#### Antotapa

Iholle

Bepanthen-voide sisältää vaikuttavana aineena dekspantenolia rasvaisessa voidepohjassa. Erittävien haavaumien hoitoon, suojaamattomalle iholle (esim. kasvoin) ja karvaiselle ihoalueelle suositetaan Bepanthen-emulsioidetta, joka on kevyt ja nopeasti ihoon imeytyvä lääkekuoto.

### **4.3. Vasta-aiheet**

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (dekspantenoli) tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

### **4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

Valmisteen joutumista silmiin on varottava.

Bepanthen-voiteen sisältämät apuaineet voivat heikentää lateksista valmistettujen ehkäisyvälineiden, kuten kondomien ja pessaarien, ehkäisytehoa.

Bepanthen-emulsiovoide sisältää setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja villarasvaa, jotka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

#### **4.5. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia.

#### **4.6. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys**

Ei ole viitteitä siitä, että valmisteen käyttöön raskauden tai imetyksen aikana liittyy riskejä. Dekspantenolia tulisi kuitenkin käyttää raskauden aikana vain lääkärin suosituksesta.

Jos valmistetta käytetään imetyksenaikaisten nännihaavaumien hoitoon, se tulee huuhdella pois ennen lapsen imettämistä.

#### **4.7. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn**

Bepanthen-lääkevalmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

#### **4.8. Haittavaikutukset**

Haittavaikutusluettelo perustuu spontaaniraportointiin, eikä CIOMS III -ilmaantuvuusluokitus siksi ole relevantti.

*Immuunijärjestelmä sekä iho ja ihonalainen kudokset:* Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysoireet ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma, yliherkkyysoireet, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä ihorakkulat.

#### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Lääkealan turvallisuus- ja  
kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden  
haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA

#### **4.9. Yliannostus**

Pantoteenihappo on hyvin siedetty myös suurina annoksina, ja kirjallisuudessa tämä aine on luokiteltu ei-toxiseksi. Yliannostustilaa ei tunneta.

## 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

### 5.1. Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Haavojen ja palovammojen hoitoon tarkoitettu valmiste.  
ATC-koodi: D03AX03

Bepanthen-valmisteen sisältämä vaikuttava aine, dekspantenoli, muuttuu iho- ja limakalvokudoksessa B<sub>5</sub>-vitamiiniksi, joka on ihon ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä. Paikallisesti käytettynä dekspantenolin imeytyminen ihoon ja limakalvoihin on hyvin nopeaa. Haavojen paranemisessa pantoteenihapolla on mittoosia lisäävä ja kollageenin kestävyttä parantava vaikutus.

### 5.2. Farmakokineetiikka

Dekspantenoli imeytyy ohutsuolen kaikissa osissa oraalisen annostelun jälkeen. Imeytyminen on ilmeisesti passiivista silloin kun pitoisuudet ovat suuria. Dekspantenoli muuttuu elimistössä nopeasti pantoteenihapoksi.

Pantoteenihappo on veressä proteiineihin sitoutuneena. Pantoteenihapon pitoisuudet ovat 500-1000 mikrog/l kokoverestä mitattuna ja noin 100 mikrog/l seerumista mitattuna.

Oraalisesta annoksesta 60-70 % erittyy virtsaan ja loput ulosteeseen. Pantoteenihappo erittyy elimistöstä muuttumattomana. Vuorokaudessa aikuisilta erittyy virtsaan 2-7 mg ja lapsilta 2-3 mg.

### 5.3. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

*Akuutti toksisuus.* Oraalisesti annetun dekspantenolin hiirten LD<sub>50</sub>-arvo on 15 g/kg. Kahdessa muussa akuuttia, oraaliseen antotapaan liittyneessä toksisuustutkimuksessa 10 g/kg ei aiheuttanut koe-eläinmortaliteettia, mutta annoksella 20 g/kg mortaliteetti oli 100 %.

*Subakuutti toksisuus.* Dekspantenolin päivittäiset 20 mg oraaliset annokset rotille ja 500 mg/kg oraaliset annokset koirille kolmen kuukauden ajan eivät aiheuttaneet toksisia vaikutuksia eivätkä histopatologisia muutoksia.

Kun dekspantenolia annettiin 2 mg oraalisesti 24 rotalle kuuden kuukauden ajan, histopatologisia muutoksia ei raportoitu.

## 6. FARMASEUTTISET TIEDOT

### 6.1. Apuaineet

villarasva  
Protegin X  
valkovaseliini  
valkovaha  
manteliöljy  
setyylialkoholi  
stearyylialkoholi  
nestemäinen parafini  
puhdistettu vesi

### 6.2. Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

### **6.3. Kestoaika**

3 vuotta.

### **6.4. Säilytys**

Säilytä alle 25 °C.

### **6.5. Pakkaustyyppi ja pakkauskoot**

30 g ja 100 g tuubi (pehmeä alumiinituubi, polypropyleenikorkki)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **6.6. Erityiset varotoimet hävittämiselle**

Ei erityisvaatimuksia.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Bayer Oy, Pansiontie 47, Turku, Suomi

## **8. MYYNTILUVAN NUMERO**

861

## **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ / UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 29.1.1975

Myyntiluvan uudistamisen päivämäärä: 19.4.2006

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

28.5.2024

## **1. LÄKEMEDLETS NAMN**

Bepanthen 50 mg/g salva

## **2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

1 g salva innehåller 50 mg dexpanthenol.

Hjälpämnen med känd effekt: Innehåller cetylalkohol, stearylalkohol och ullfett.

För fullständig förteckning över hjälpämnena, se avsnitt 6.1.

## **3. LÄKEMEDELSFORM**

Salva

Produktbeskrivning: Fet, vit till svagt gul salva.

## **4. KLINISKA UPPGIFTER**

### **4.1. Terapeutiska indikationer**

Brännskador, blöjutslag, sår som läker dåligt, inklusive sår på bröstvårtor, spruckna läppar och munsår, skrapår och bölder, sår på könsorganen.

Vid topisk applicering bidrar den till läkning av mindre hud- och slemhinneförändringar och bildandet av ett epitelskikt.

### **4.2. Dosering och administreringsätt**

#### Dosering

Vuxna och pediatrika patienter: Salvan appliceras en eller flera gånger dagligen på det drabbade området.

Bröstvård under amning: Salvan appliceras på bröstvårtsområdet efter amning (se även avsnitt 4.6).

Behandling av blöjutslag: Salvan appliceras vid varje blöjbyte.

#### Administreringsätt

På huden

Salvan innehåller den aktiva ingrediensen dexpanthenol i en fet salvabas. Bepanthen kräm rekommenderas för behandling av utsöndringssår på oskyddad hud (t.ex. ansikte) och hårig hud, eftersom det är en lätt och snabbt absorberad läkemedelsform.

### **4.3. Kontraindikationer**

Överkänslighet mot den aktiva substansen (dexpanthenol) eller mot något hjälpämnen som anges i avsnitt 6.1.

### **4.4. Varningar och försiktighet**

Kontakt av preparatet med ögonen ska undvikas.

Hjälpämnen i Bepanthen-salvan kan minska den preventiva effekten av preventivmedel av latex, t.ex. kondomer och pessar.

Bepanthen salvan innehåller cetylalkohol, stearylalkohol och ullfett som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

#### **4.5. Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

Inga kända interaktioner.

#### **4.6. Fertilitet, graviditet och amning**

Det finns inga indikationer på att det finns risker förknippade med användning av produkten under graviditet eller amning. Dexpanthenol bör dock endast användas under graviditet på inrådan av en läkare.

Om produkten används för att behandla bröstvårtssår under amning ska den sköljas bort före amning.

#### **4.7. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Bepanthen har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

#### **4.8. Biverkningar**

Förteckningen över biverkningar bygger på spontan rapportering och därför är CIOMS III-incidensklassificeringen inte relevant.

*Immunförsvar samt hud och subkutan vävnad:* Följande biverkningar har rapporterats: Överkänslighetsreaktioner och hudreaktioner såsom kontaktdermatit, överkänslighetsutslag, pruritus, erytem, eksem, dermatit, urtikaria, hudirritation och hudblåsor.

##### Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för  
läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

#### **4.9. Överdoser**

Pantotensyra tolereras väl även i höga doser och i litteraturen klassificeras denna substans som icke-toxisk. Ingen status för överdosering är känd.

## **5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

### **5.1. Farmakodynamiska egenskaper**

Farmakoterapeutisk grupp: Preparat för behandling av sår och brännskador. ATC-kod: D03AX03

Den aktiva substansen i Bepanthen, dexpanthenol, omvandlas av huden och slemhinnorna till vitamin B5, en celltillväxtfaktor som är nödvändig för regenerering av hud och slemhinnor. Vid topisk applicering absorberas dexpanthenol mycket snabbt av huden och slemhinnorna. Vid sårhäkning har pantotensyra en mitotisk effekt och förbättrar kollagenresistensen.

### **5.2. Farmakokinetiska egenskaper**

Dexpanthenol absorberas i alla delar av tunntarmen efter oral administrering. Absorptionen verkar vara passiv vid höga koncentrationer. Dexpanthenol omvandlas snabbt till pantotensyra i kroppen.

Pantotensyra binds till proteiner i blodet. Pantotensyrakoncentrationerna är 500-1000 mikrog/l mätt i helblod och cirka 100 mikrog/l mätt i serum.

60-70 % av den orala dosen utsöndras i urinen och resten i faeces. Pantotensyra utsöndras oförändrad från kroppen. 2-7 mg utsöndras i urinen per dag hos vuxna och 2-3 mg hos barn.

### **5.3. Prekliniska säkerhetsuppgifter**

*Akut toxicitet.* LD<sub>50</sub> vid oralt administrerad dexpanthenol hos möss är 15 g/kg. I två andra studier av akut toxicitet med oral administrering orsakade 10 g/kg inte dödlighet hos försöksdjuren, men vid en dos på 20 g/kg var dödligheten 100 %.

*Subakut toxicitet.* Dagliga orala doser av 20 mg dexpanthenol hos råttor och 500 mg/kg oral dos hos hundar under tre månader orsakade inga toxiska effekter eller histopatologiska förändringar.

Inga histopatologiska förändringar rapporterades när dexpanthenol administrerades 2 mg oralt till 24 råttor i sex månader.

## **6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1. Förteckning över hjälpämnen**

ullfett  
Protegin X  
vitt vaselin  
vitt vax  
mandelolja  
cetylalkohol  
cetylalkohol  
flytande paraffin  
renat vatten

### **6.2. Inkompatibiliteter**

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

### **6.3. Hållbarhet**

3 år.

#### **6.4. Särskilda förvaringsanvisningar**

Förvaras under 25 °C.

#### **6.5. Förpackningstyper och innehåll**

30 g och 100 g tub (mjuk aluminiumtub, polypropylenlock).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

#### **6.6. Särskilda anvisningar för destruktion**

Inga särskilda anvisningar.

### **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Bayer Oy, Pansiontie 47, Åbo, Finland

### **8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

861

### **9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

Datum för det första godkännandet: 29.1.1975

Datum för den senaste förnyelsen: 19.4.2006

### **10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

28.5.2024