

## **VALMISTEYHTEENVETO**

### **1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Propolipid 10 mg/ml injektilo-/infusioneste, emulsio, esityytetty ruisku  
Propolipid 20 mg/ml injektilo-/infusioneste, emulsio, esityytetty ruisku

### **2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

#### 10 mg/ml

1 ml emulsiota sisältää 10 mg propofolia.  
Yksi 10 ml:n ruisku sisältää 100 mg propofolia.  
Yksi 20 ml:n ruisku sisältää 200 mg propofolia.  
Yksi 50 ml:n ruisku sisältää 500 mg propofolia.

#### 20 mg/ml

1 ml emulsiota sisältää 20 mg propofolia.  
Yksi 50 ml:n ruisku sisältää 1000 mg propofolia.

Apuaineet, joiden vaikutukset tunnetaan:

Yksi ml emulsiota sisältää:  
sojajäyvä, puhdistettua 50 mg  
natriumia enintään 0,06 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

### **3. LÄÄKEMUOTO**

Injektilo-/infusioneste, emulsio, esityytetty ruisku.

Valkoinen öljy/vesi -emulsio.  
Emulsion pH: 7,5 – 8,5  
Emulsion osmolaliteetti: 270-330 mosmol/kg.

### **4. KLIINISET TIEDOT**

#### **4.1. Käyttöaiheet**

Propolipid 10 mg/ml on laskimoon annettava lyhytvaikutteinen yleisanesteetti

- yleisanestesian induktioon ja ylläpitoon aikuisille, nuorille ja yli 1 kuukauden ikäisille lapsille
- sedaatioon diagnostisten toimenpiteiden ja leikkausten yhteydessä yksinään tai yhdessä paikallis- tai johtopuudutteiden kanssa aikuisille, nuorille ja yli 1 kuukauden ikäisille lapsille
- hengityslaitteessa olevien yli 16-vuotiaiden tehohoitopilaiden sedaatioon

Propolipid 20 mg/ml on laskimoon annettava lyhytvaikutteinen yleisanesteetti

- yleisanestesian induktioon ja ylläpitoon aikuisille, nuorille ja yli 3-vuotiaalle lapsille
- sedaatioon diagnostisten toimenpiteiden ja leikkausten yhteydessä yksinään tai yhdessä paikallis- tai johtopuudutteiden kanssa aikuisille, nuorille ja yli 3-vuotiaalle lapsille
- hengityslaitteessa olevien yli 16-vuotiaiden tehohoitopilaiden sedaatioon

## **4.2. Annostus ja antotapa**

Propolipid injektio-/infuusionestettä saa antaa vain anestesiaan tai potilaiden tehohoitoon perehtynyt lääkäri sairaaloissa tai riittävästi varustetuissa terveydenhuollon yksiköissä.

Potilaan kardiovaskulaarisia toimintoja ja hengitystä on jatkuvasti seurattava (EKG, pulssioksimetri) ja avoimen ilmatien turvaamiseen, hengityksen avustamiseen ja muuhun elvytykseen tarvittavan välineistön on oltava välittömästi saatavilla koko ajan.

Henkilö, joka suorittaa leikkausta tai diagnostista toimenpidettä, ei saa annostella Propolipid injektio-/infuusionestettä sedaatioon näiden toimenpiteiden yhteydessä.

Propolipid-emulsion annos määräytyy yksilöllisesti potilaan vasteen ja käytetyn esilääkityksen perusteella.

Propolipid-laskimoanesteetin lisäksi tarvitaan yleensä lisääanalgeetteja.

### ***Annostus***

#### **Aikuisten yleisaneesia**

##### Anestesian induktio

Anestesian induktiossa Propolipid-annostus on titrattava potilaan vasteen mukaan (noin 20–40 mg 10 sekunnin välein), kunnes anestesian alkaminen todetaan kliinisten merkkien perusteella.

Useimmille alle 55-vuotiaille aikuispotilaille tarvittava annos on todennäköisesti 1,5–2,5 mg propofolia/kg.

Tätä vanhemmille potilaille ja ASA luokkiin III tai IV kuuluville ja erityisesti sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille annetaan pienempi annos ja kokonaisannos voidaan rajoittaa minimiannokseen 1 mg:aan propofolia painokiloa kohti. Propolipid on annettava hitaammin (noin 2 ml Propolipid 10 mg/ml -emulsiota tai 1 ml Propolipid 20 mg/ml -emulsiota eli 20 mg propofolia 10 sekunnin välein).

##### Anestesian ylläpito

Anestesiaa ylläpidetään antamalla Propolipid 10 mg/ml -valmistetta jatkuvana infuusiona tai toistuvina bolusinjektiointina.

Anestesiaa ylläpidetään antamalla Propolipid 20 mg/ml -valmistetta jatkuvana infuusiona.

Anestesian ylläpitoon käytetään yleensä annoksia 4–12 mg/kg/h. Pienempi ylläpitoannos noin 4 mg/kg/h voi riittää kevyemmässä kirurgiassa, kuten vähän kajoavissa toimenpiteissä.

Jos kyseessä on iäkäs, yleistiltaan epävakaa, hypovoleeminen tai ASA luokkiin III tai IV kuuluva potilas tai potilas, jolla on sydämen vajaatoiminta, Propolipid-annosta voi edelleen pienentää riippuen potilaan voimista ja käytetystä anestesiateknikasta.

Jos anestesian ylläpitoon käytetään toistuvia bolusinjektiointia, Propolipid 10 mg/ml -valmistetta on annettava 25–50 mg:n (2,5–5,0 ml) lisäannoksina kliinisen vasteen mukaan.

Nopeita Propolipid 10 mg/ml -bolusinjektiointia (kerta-annokset tai toistuvat annokset) ei saa antaa

läkkäille potilaille, koska ne voivat johtaa kardiopulmonaaliseen lamaan.

## **Yli 1 kuukauden ikäisten lasten yleisanestesia**

### Anestesian induktio

Anestesian induktiossa Propolipid 10 mg/ml-annostus titrataan hitaasti, kunnes anestesian alkaminen todetaan kliimisten merkkien perusteella.

Annos on sovitettava potilaan iän ja/tai painon mukaan. Useimmat yli 8-vuotiaat potilaat tarvitsevat noin 2,5 mg/kg anestesian induktioon. Tätä nuoremmat, varsinkin 1 kk – 3-vuotiaat lapset, voivat tarvita enemmän läkettä (2,5–4 mg/kg).

### Yleisanestesian ylläpito

Anestesiaa voidaan ylläpitää antamalla Propolipid 10 mg/ml -valmistetta infuusiona tai toistuvina bolus-injektioina tarvittavan anestesiataslon ylläpitämiseksi. Antonopeus vaihtelee huomattavasti eri potilailla, mutta antonopeuksilla 9-15 mg/kg/h saavutetaan yleensä riittävä anestesia. Nuoremmat, varsinkin 1 kk – 3 vuoden ikäiset lapset voivat tarvita suurempia annoksia.

ASA III- ja IV-luokan potilaille suositellaan pienempiä annoksia (ks. myös kohta 4.4).

## **Yli 3-vuotiaiden lasten yleisanestesia**

### Anestesian induktio

Anestesian induktiossa Propolipid 10 mg/ml tai Propolipid 20 mg/ml –valmisteen annostus titrataan hitaasti, kunnes anestesian alkaminen todetaan kliimisten merkkien perusteella.

Annos on sovitettava potilaan iän ja/tai painon mukaan. Useimmat yli 8-vuotiaat potilaat tarvitsevat noin 2,5 mg/kg anestesian induktioon. Tätä nuoremmat lapset voivat tarvita enemmän läkettä (2,5 – 4 mg/kg).

### Yleisanestesian ylläpito

Anestesiaa voidaan ylläpitää antamalla Propolipid 10 mg/ml -valmistetta infuusiona tai toistuvina bolus-injektioina tai 20 mg/ml -valmistetta infuusiona tarvittavan anestesiataslon ylläpitämiseksi. Antonopeus vaihtelee huomattavasti eri potilailla, mutta antonopeuksilla 9-15 mg/kg/h saavutetaan yleensä riittävä anestesia. Nuoremmat lapset voivat tarvita suurempia annoksia.

ASA III- ja IV-luokan potilaille suositellaan pienempiä annoksia (ks. myös kohta 4.4).

## **Aikuisten sedaatio diagnostisten ja leikkaustoimenpiteiden yhteydessä**

Sedaatioon diagnostisten ja leikkaustoimenpiteiden yhteydessä annos ja antonopeus on sovitettava kliinisen vasteen mukaan. Sedaation aloitukseen useimmat potilaat tarvitsevat 0,5-1 mg propofolia/kg 1-5 minuutin ajan. Sedaation ylläpito saadaan aikaan titraamalla annos halutulle sedaatiotasolle. Useimmat potilaat tarvitsevat 1,5–4,5 mg propofolia/kg/h. Infuusiota voidaan täydentää antamalla 10–20 mg propofolia (1-2 ml Propolipid 10 mg/ml –valmistetta tai 0,5–1 ml Propolipid 20 mg/ml -valmistetta), jos tarvitaan sedaation nopeaa syventämistä.

Yli 55-vuotiaalle ja ASA III-IV-luokkiin kuuluville potilaille tarvitaan yleensä pienempiä annoksia ja pienempää annosnopeutta.

## **Yli 1 kuukauden ikäisten lasten sedaatio diagnostisten toimenpiteiden ja leikkausten yhteydessä**

Annos ja antonopeus on sovitettava tarvittavan sedaatiotason ja kliinisen vasteen mukaan. Sedaation aloitukseen useimmat lapsipotilaat tarvitsevat 1-2 mg/kg propofolia. Sedaation ylläpito saadaan aikaan titraamalla annos halutulle sedaatiotasolle. Useimmat potilaat tarvitsevat 1,5-9 mg/kg/h propofolia. Infusiota voidaan täydentää antamalla Propolipid 10 mg/ml -valmistetta bolusinjektiiona enintään 1 mg/kg propofolia, jos tarvitaan sedaation nopeaa syventämistä.

ASA III- ja IV-luokan potilaat tarvitsevat yleensä pienempiä annoksia.

## **Yli 3-vuotiaiden lasten sedaatio diagnostisten toimenpiteiden ja leikkausten yhteydessä**

Annos ja antonopeus on sovitettava tarvittavan sedaatiotason ja kliinisen vasteen mukaan. Sedaation aloitukseen useimmat lapsipotilaat tarvitsevat 1-2 mg/kg propofolia. Sedaation ylläpito saadaan aikaan titraamalla annos halutulle sedaatiotasolle. Useimmat potilaat tarvitsevat 1,5-9 mg/kg/h propofolia. Infusiota voidaan täydentää antamalla Propolipid 10 mg/ml -valmistetta bolusinjektiiona enintään 1 mg/kg propofolia, jos tarvitaan sedaation nopeaa syventämistä.

ASA III- ja IV-luokan potilaat tarvitsevat yleensä pienempiä annoksia.

## **Yli 16-vuotiaiden potilaiden sedaatio tehohoidossa**

Kun valmistetta käytetään ventiloitujen potilaiden sedaatioon tehohoidossa, suositellaan että Propolipid-valmistetta annetaan jatkuvana infuusiona. Annos on säädettyvä tarvittavan sedaation syvyyden mukaan. Yleensä riittävä sedaatio saadaan aikaan antonopeudella 0,3-4,0 mg/kg/h propofolia. Suurin suositeltava infuusionopeus on 4,0 mg/kg/h (ks. kohta 4.4).

TCI (Target Controlled Infusion) -laitteen käyttöä ei suositella annettaessa propofolia sedaatioon tehohoidossa.

### Valmisteen annon kesto

Lääkkeen anto ei saa kestää yli 7 vuorokautta.

### ***Antotapa***

Annetaan laskimoon.

Vain kertakäytöön. Käytämättä jäynyt emulsio on hävitettävä.

Esityytetyt ruiskut on ravistettava ennen käyttöä.

Jos ravistamisen jälkeen on näkyvillä kaksi kerrosta, emulsiota ei saa käyttää.

Käytä ainoastaan tasa-aineisia valmisteita ja vahingoittumattomia esityytettyjä ruiskuja.

Propolipid 10 mg/ml -valmistetta voidaan käyttää infuusioon laimentamattomana tai laimennettuna (ks. kohta 6.6).

Propolipid 20 mg/ml -valmiste annetaan laskimoon laimentamattomana jatkuvana infuusiona. Propolipid 20 mg/ml valmistetta ei pidä antaa toistettuna bolusinjektiointina anestesian ylläpitoon.

Propolipid-valmistetta käytettäessä infuusionopeuden säättelyyn on aina käytettävä byrettiä, tipanlaskijaa, ruiskupumppua (mukaan lukien TCI-systeemi) tai tilavuuden mittavaa infuusiopumppua.

Propolipid on rasvaemulsio, joka ei sisällä antimikrobista säilytsainetta ja joka on siten erityisen hyvä

kasvualusta mikro-organismeille.

Propolipid-emulsio on vedettävä aseptisesti infuusiolaitteistoon välittömästi ruiskun avaamisen jälkeen. Valmistenanto on aloitettava viipytmällä.

Propolipid-valmisten ja infuusiolaitteiston osalta on noudatettava aseptiikkaa koko infuusion antamisen ajan. Muiden lääkkeiden tai nesteiden samanaikaisen annon Propolipid -siirtoletkuun on tapahduttava lähelle laskimokanyylia käyttäen Y-kappaletta tai kolmitiehanaa.

Katso ohjeet muiden lääkkeiden samanaikaisesta annosta kohdasta 6.6.

Propolipid-valmistetta ei saa antaa mikrobiologisen suodattimen kautta.

Propolipid-valmistetta sisältävä infuusiovälineistö on tarkoitettu **kertakäyttöön yhdelle potilaalle**. Käytämällä jäänyt infuusioneste on hävitettävä.

#### Laimentamaton Propolipid -infuusio:

Rasvaemulsioiden käyttöön liittyvien yleisten suositusten mukaisesti laimentamattoman Propolipid-infusion kesto ei saa ylittää 12 tuntia. Viimeistään 12 tunnin kuluttua infuusion alkamisesta infuusiovälineistö ja käytämällä jäänyt Propolipid-valmiste on hävitettävä tai tarvittaessa korvattava uudella.

#### Laimennettu Propolipid 10 mg/ml -infuusio

Laimennetun Propolipid 10 mg/ml -infusion nopeuden säätelyyn ja tahattoman, huomattavan yliannostuksen välttämiseksi on aina käytettävä byrettiä, tipanlaskinta tai infuusiopumppua. Yliannostuksen riski on huomioitava, jos harkitaan suurten laimennosten tekemistä byretillä.

Kivun vähentämiseksi injektiokohdassa voi juuri ennen Propolipidin antoa antaa lidokaïni-injektion (ks. kohta 4.4). Vaihtoehtoisesti Propolipid 10 mg/ml -valmisten voi sekoittaa (kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissä olosuhteissa) juuri ennen käyttöä säilytysaineettoman 1 % lidokaïni-injektionesteen kanssa (20 osaa Propolipid 10 mg/ml -valmistetta ja enintään 1 osa 1 % lidokaïnia). Seos on annettava 6 tunnin sisällä valmistamisesta.

Lihasrelaksanteja, kuten atrakuuria tai mivakuuria, saa antaa vasta kun Propolipid-valmisten antoon käytetty infuusiokohta on huuhdottu.

Propolipid-valmiste on tarkoitettu annettavaksi laskimoon joko manuaalisesti tai sähkökäyttöisen pumpun avulla. Jos sähkökäyttöistä pumppua käytetään, on yhteensopivus varmistettava.

10 ml ja 20 ml lasiset ruiskut ja 10 ml muoviruiskut sopivat vain manuaaliseen antoon ja niitä ei saa käyttää pumpun avulla.

Lisäksi liittimen rikkoutumisen tai tukkeutumisen estämiseksi 10 ml:n ja 20 ml:n lasisia ruiskuja ei saa käyttää neulattomien liittimiä kanssa, standardiletkuja tai kolmitiehanoja lukuun ottamatta.

Jos rikkoutuminen tai tukos havaitaan, esitetytty ruisku on hävitettävä ja otettava uusi ruisku.

#### **Lääkkeen anto esitytettyllä ruiskulla (kohta 2 ei koske käyttövalmiita ruiskuja):**

Steriliisiä on varmistettava. Ruiskun ulkopinta ja mäntä eivät ole steriilejä.

- 1) Ota ruisku pakkauksesta ja ravista
- 2) Asenna mäntä ruiskuun kiertämällä mäntää myötäpäivään
- 3) Poista kärjen suojuus ruiskusta ja yhdistä infuusiolinja, neula tai kanyyli ruiskuun. Poista kaasukuplat (pieni kaasukupla voi jäädä) ja asenna käyttövalmis ruisku pumppuun tai anna manuaalisesti.

## **Tavoiteohjattu infuusio (Target Controlled Infusion, TCI) – Propolipid-valmisteen annaminen pumpun avulla (vain 20 ml:n ja 50 ml:n muoviruisku):**

Propolipid-valmisten annaminen TCI-laitteiston avulla on rajoitettu vain aikuisille annettavan yleisanestesian induktioon ja ylläpitoon. Sitä ei suositella käytettäväksi sedaatioon tehohoidossa eikä sedaatioon kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä.

Propolipid voidaan antaa tarkoitukseenmukaisella TCI-ohjelmistolla varustetun TCI-laitteiston avulla. Käyttäjän on tutustuttava infuusiopumpun käyttöoppaaseen ja tiedettävä, miten Propolipid annetaan tavoiteohjattuna infuusiona.

Anestesia- ja tehohoitolääkärien on laitteen avulla mahdollista saavuttaa haluttu induktionopeus ja anestesiasyvyys ja ohjata sitä asettamalla propofolin (ennakoitu) tavoitepitoisuus plasmassa ja/tai vaikutuspaikassa ja säätämällä sitä.

Pumppulitteiden erilaiset toimintatavat on otettava huomioon, sillä TCI-laite saattaa olettaa, että propofolipitoisuus on potilaassa aluksi nolla. Jos potilas on saanut propofolia jo aiemmin, tavoiteohjattua infuusiota aloittaessa saattaa olla tarpeen valita aluksi pienempi tavoitepitoisuus. Tavoiteohjatun infuusion aloittamista uudelleen heti pumpun sulkemisen jälkeen ei myöskään suositella.

Seuraavassa esitetään propofolin ohjeelliset tavoitepitoisuudet. Koska propofolin farmakokinetiikassa ja farmakodynamiikassa on eroja potilaiden välillä riippumatta siitä, onko potilas saanut esilääkitystä, propofolin tavoitepitoisuus on titrattava potilaan vasteen mukaisesti, jotta saavutetaan tarvittava anestesiasyvyys.

### ***Yleisanestesian induktio ja ylläpito tavoiteohjatun infuusion aikana***

Alle 55-vuotiaiden aikuispotilaiden anestesian induktio saadaan tavallisesti aikaan propofolin tavoitepitoisuudella noin 4–8 mikrogrammaa/ml. Jos potilas on saanut esilääkityn, tavoitepitoisuudeksi suositellaan aluksi 4 mikrogrammaa/ml, ja jos potilas ei ole saanut esilääkitystä, tavoitepitoisuudeksi suositellaan aluksi 6 mikrogrammaa/ml. Induktion kesto on näiden tavoitepitoisuksien yhteydessä tavallisesti 60–120 sekuntia. Suurempien tavoitepitoisuksien yhteydessä anestesian induktio tapahtuu nopeammin, mutta siihen saattaa liittyä voimakkaammin hemodynamian laskua ja hengityslamaa.

Alkuvaheen tavoitepitoisuuden on oltava pienempi, jos potilas on yli 55-vuotias tai kuuluu ASA-luokkaan 3 tai 4. Tavoitepitoisuutta voidaan tämän jälkeen suurentaa 0,5–1,0 mikrogrammaa/ml lisäyksin 1 minuutin välein anestesian induktion toteuttamiseksi asteittain.

Lisäanalgesia on yleensä tarpeen, ja samanaikaisesti annettu analgeettimäärä vaikuttaa siihen, miten paljon tavoitepitoisuutta anestesian ylläpitoon voidaan pienentää. Propofolin tavoitepitoisuus noin 3–6 mikrogrammaa/ml pitää anestesian tavallisesti riittävänä.

Ennakoitu propolipitoisuus on heräämisvaiheessa yleensä noin 1,0–2,0 mikrogrammaa/ml, mutta ylläpitovaiheessa annettu analgeettimäärä vaikuttaa tähän.

### ***Sedaatio tehohoidossa (tavoiteohjatun infuusion käyttöä ei suositella)***

Propofolin tavoitepitoisuudeksi veressä on yleensä tarpeen asettaa 0,2–2,0 mikrogrammaa/ml. Anto on aloitettava pienellä tavoitepitoisuudella, jota titrataan potilaan vasteen mukaan halutun sedaatosyvyden saavuttamiseksi.

### **4.3. Vasta-aiheet**

Propofoli on vasta-aiheista potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä propofolle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Propolipid sisältää sojaoöljyä, eikä sitä saa käyttää soijalle eikä maapähkinälle yliherkkien potilaiden hoidossa.

Propofolia ei saa käyttää 16-vuotiaiden eikä sitä nuorempien tehohoitopotilaiden sedaatioon (ks. kohta 4.4).

### **4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

Propofolia saa antaa vain anestesian käyttöön koulutuksen saanut henkilö (tai kun asianmukaista, potilaiden tehohoitoon koulutuksen saanut lääkäri).

Potilaita on seurattava jatkuvasti ja anestesian aikana on varmistettava jatkuva ja välitön valmius ilmateiden pitämiseen auki, mekaaniseen ventilaatioon, hapella rikastetun ilman käyttöön ja muihin elvytystoimenpiteisiin. Sama henkilö, joka suorittaa diagnostiset tai kirurgiset toimenpiteet, ei saa antaa propofolia.

Pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa tapahtuvaan propofolin väärinkäytöö ja riippuvuutta propofolista on raportoitu. Kuten muidenkin yleisanesteettien annon yhteydessä, propofolin antaminen huolehtimatta ilmateiden pysymisestä auki saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavia hengityskomplikaatioita.

Annettaessa propofolia kohtalaiseen sedaatioon kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden vuoksi potilasta on seurattava jatkuvasti hypotension varhaisten merkkien, hengitystieobstruktion ja happidesaturaation varalta.

Kun propofolia käytetään sedaatioon leikkaustoimenpiteiden aikana, potilas voi liikehtiä tahattomasti. Toimenpiteissä, jotka vaativat liikkumattomuutta, nämä liikkeet voivat olla vaaraksi.

Ennen potilaan kotiuttamista sairaalasta tulee kulua riittävä aika, jotta varmistutaan potilaan täydellisestä propofolin käytön jälkeisestä toipumisesta. Propofolin käyttöön saattaa hyvin harvoin liittyä kirurgisen toimenpiteen jälkeinen tajuttomuuden jakso, johon saattaa liittyä lihastonukseen lisääntyminen. Tätä saattaa mahdollisesti edeltää hereilläolovaike. Potilaan spontaanista toipumisesta huolimatta tajuttomalle potilaalle tulee antaa asianmukaista hoitoa.

Propofolin aiheuttama tilan heikentyminen ei yleensä ole havaittavissa yli 12 tunnin jälkeen. Propofolin vaikutukset, toimenpide, samanaikainen lääkitys, potilaan ikä ja vointi on otettava huomioon kun potilaasta neuvotaan seuraavissa asioissa:

- suositus poistua antipaikalta saattajan kanssa
- taitoa vaativien tai vaarallisten toimintojen kuten autolla ajamisen ajankohta
- muiden mahdollisesti sedaatiota aiheuttavien aineiden (esim. bentsodiatsepiinien, opiaattien ja alkoholin) käyttö.

Viivästyneitä epileptiformisia kohtauksia voi ilmetä myös muilla kuin epilepsiapotilailla, ja viive voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin.

### **Eriyiset potilasryhmät**

*Sydämen toiminnanvajaus, verenkierron toiminnanvajaus, hengitysinsuffisienssi ja nestevajaus*  
Kuten muidenkin laskimoanesteettien käytön yhteydessä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on sydämen, hengityksen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta tai jos kyseessä on heikkokuntoinen tai hypovoleeminen potilas. Propofolin puhdistuma riippuu verenvirtauksesta ja tämän takia samanaikainen, sydämen minuuttiluvutta pienentävä lääkitys voi myös pienentää propofolin puhdistumaa.

Sydämen toiminnanvajaus, verenkierron riittämättömyys, hengitysinsuffisienssi ja nestevajaus on tasapainotettava ennen propofolin antoa.

Propofolia ei pidä antaa potilaille, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta tai muu vaikea sydänsairaus muutoin kuin erityistä varovaisuutta noudattaen ja tarkassa valvonnassa.

Sydämen ja verenkierroon kohdistuvat vaikutukset on otettava huomioon kun hoidetaan vaikeasti ylipainoisia potilaita, joille on annettava tavallista suurempia propofoliannoksia.

Propofolilla ei ole vagolyyttista vaikutusta, ja valmisteen käyttöön on liittynyt ilmoituksia (toisinaan voimakkaasta) bradykardiasta sekä asystolesta. Laskimoon annettavien antikolinergien käyttöä ennen anestesian induktiota tai sen ylläpitovaiheessa on harkittava varsinkin tilanteissa, joissa todennäköisesti vallitsee vagaalinen tonus, tai kum propofolia käytetään yhdessä muiden todennäköisesti bradykardiaa aiheuttavien aineiden kanssa.

#### *Epilepsia*

Kun propofolia annetaan epilepsiapotilaalle, kouristuskohtausten riski on mahdollinen.

Epilepsiapotilailla voi ilmetä viivästyneitä epileptiformisia kohtauksia, ja viive voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin.

Ennen epilepsiapotilaan anestesiaa on tarkistettava, että potilas on saanut epilepsialääkyksen. Vaikka useissa tutkimuksissa onkin osoitettu lääkkeen teho status epilepticuksen hoidossa, propofolin anto epilepsiapotilaalle voi myös lisätä kouristuskohtaksen riskiä.

Propofolin käyttöä ei suositella sähköhoidon yhteydessä.

#### *Potilaat, joilla on rasva-aineenvaihdunnan häiriö*

Asianmukaista varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on rasva-aineenvaihdunnan häiriö tai muu sairaus, jonka vuoksi lipidiemulsoita on käytettävä varoen.

#### *Potilaat, joilla on kohonnut kallonsisäinen paine*

Eritäyistä varovaisuutta on noudattettava hoidettaessa potilaita, joilla on kohonnut kallonsisäinen paine ja matala keskivaltimopaine, koska tällöin on merkitsevä aivoperfuusioaineen laskemisen riski.

#### Pediatriset potilaat

Propofolin käyttöä vastasyntyneille ei suositella, koska käyttöä tässä potilasryhmässä ei ole tutkittu täysin. Farmakokineettisten tietojen (ks. kohta 5.2) perusteella puhdistuma on merkittävästi pienentynyt vastasyntyneillä, ja siinä on hyvin suurta yksilöllistä vaihtelua. Jos käytetään vanhemmille lapsille suositeltuja annoksia, saattaa tapahtua suhteellinen yliannostus, joka voi johtaa vaikeaan verenkiertolamaan.

Propolipid 10 mg/ml -valmistetta ei suositella yleisanestesiaan alle 1 kuukauden ikäisille lapsille.

Alle 2 vuoden ikäisten pediatristen potilaiden hoidossa ei suositella tavoiteohjatun infuusion käyttöä,

koska siitä on saatavissa vain vähän tietoja.

Propolipid 20 mg/ml -valmistetta ei suositella yleisanestesiaan alle 3 vuoden ikäisille lapsille, koska 2-prosenttinen vahvuus on vaikea titrata pienille lapsille tarvittavan annoksen äärimmäisen pienen tilavuuden takia. Propofol 1 % (10 mg/ml) -valmisten käyttämistä on harkittava 1 kuukauden – 3 vuoden ikäisille lapsille, jos annoksen odotetaan olevan esim. alle 100 mg/h.

Propofolia ei saa käyttää 16-vuotiaiden eikä sitä nuorempien tehoitopilaiden sedaatioon, koska propofolin käyttöä tämän ikäryhmän sedaatioon ei ole osoitettu (ks. kohta 4.3).

#### Valmisten käyttö tehoihoidossa

Propofoliemulsion antoon infuusiona tehoitopilaiden sedaatioon on liittynyt joukko aineenvaihduntahäiriötä ja elintoinintojen häiriötä, jotka voivat johtaa kuolemaan. Seuraavien oireiden yhdistelmää on ilmoitettu: metabolinen asidoosi, rabdomyolyysi, hyperkalemia, hepatomegalia, munuaisten vajaatoiminta, hyperlipidemia, sydämen rytmihäiriö, Brugada-tyyppinen EKG (ST-nousu ja kaareutuva T-aalto) ja nopeasti paheneva sydämen vajaatoiminta, johon ei yleensä saada vastetta inotrooppisella tukihoidolla. Näiden tapahtumien yhdistelmää on kutsuttu propofoli-infusio-oireyhtymäksi. Näitä tapahtumia esiintyi eniten potilailla, joilla oli vakavia päävammoja, ja lapsilla, joilla oli hengitystieinfektoita ja joilla annostus oli aikuisten tehoitopilaiden sedaatioon suositeltua annostusta suurempi.

Näiden tapahtumien kehittymisen suurimpia riskitekijöitä ovat ilmeisesti: vähentynyt hapenkuljetus kudoksiin, vakava neurologinen vamma ja/tai sepsis, yhden tai useamman seuraavan lääkkeen suuret annostukset: vasokonstriktorit, steroidit, inotropit ja/tai propofoli (annos yleensä yli 4 mg/kg/h yli 48 tunnin ajan).

Lääkkeen määräjärien on kiinnitettävä huomiota näiden tapahtumien mahdollisuuteen, jos potilaalla on edellä mainittuja riskitekijöitä, ja lopetettava propofolin anto heti, jos edellä mainittuja oireita ilmaantuu. Kaikkien tehoihoidossa käytettävien sedatiivien ja muiden lääkkeiden annostusta on titrattava parhaan mahdollisen hapenkuljetuksen ja hemodynaamisten parametrien ylläpitämiseksi. Potilaille, joilla on kohonnut kallonsisäinen paine, on annettava asianmukaista aivojen läpivirtauspainetta tukeavaa hoitoa näiden hoitomuutosten aikana.

Hoitavia lääkäreitä muistutetaan, ettei annosta 4 mg/kg/h pidä ylittää, jos vain mahdollista.

Asianmukaista varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on rasvametabolian häiriö tai muu sairaus, jonka vuoksi lipidiemulsioita on käytettävä varoen.

Veren lipidipitoisuksien seuranta on suositeltavaa, jos propofolia annetaan potilaalle, joilla oletetaan olevan erityinen rasvaylikuormituksen riski. Jos seurannassa selviää, että rasvan eliminaatio elimistöstä on riittämätöntä, propofolin annostusta pitää muuttaa asianmukaisesti. Jos potilaalle annetaan jotakin muuta rasva-ainehoitoa laskimoon samanaikaisesti, sen määrää pitää vähentää propofolivalmisteesta infusoitava rasva-aineen määrä huomioiden: 1,0 ml Propolipid -valmistetta sisältää noin 0,1 g rasvaa.

#### Muut varotoimet

Hoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on mitokondriauti, koska potilaat voivat olla alttiita sairauden pahentumiselle anestesian, leikkauksen tai tehoihodon aikana. Nämille potilaille suositellaan elimistön normaalilta lämpötilan ylläpitämistä, hiilihydraattien antoa ja hyvää nesteytystä. Mitokondriautin pahenemisen ja propofoli-infusio-oireyhtymän varhaiset merkit voivat muistuttaa toisiaan.

Propolipid-valmiste ei sisällä mikrobeja tuhoavia sälöntääaineita ja edistää mikro-organismien kasvua.

Propofolia aspiroitaessa se on vedettävä aseptisesti steriliin ruiskuun tai annostelulaitteeseen välittömästi ampullin avaamisen tai injektiopullen sinetin murtamisen jälkeen. Lääkkeenanto on aloitettava viipyttämällä. Propofolin ja infuusiovälineen aseptinen tila on säilytettävä koko infuusioajan. Propofoliletkustoon lisättävät infuusionesteet on annettava lähellä kanyylikohtaa. Propofolia ei saa antaa mikrobiologisen suodattimen läpi.

Propofoli ja kaikki propofolia sisältävät ruiskut ovat vain potilaskohtaista kertakäyttöä varten. Muiden lipidiemulsioiden vakiintuneiden ohjeiden mukaisesti propofolin kertainfuusio ei saa kestää yli 12:ta tuntia. Toimenpiteen päätyttyä tai 12 tunnin kuluttua, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin, sekä propofolisäiliö että infuusioletkusto on hävitettävä ja vaihdettava uuteen tarpeen mukaan.

#### Injektiokohdan kipu

Kivun lievittämiseksi injektiokohdassa Propolipid-anestesian induktion aikana lidokaiini-injektion voi antaa ennen propofoliemulsion antamista (ks. kohta 4.2).

Lidokaiinia ei saa antaa laskimonsisäisesti potilaille, joilla on perinnöllinen, akuutti porfyria.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia / 100 ml, eli se ei käytännössä sisällä natriumia.

#### **4.5. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Propofolia on käytetty selkäydim- ja epiduraalipuudutuksen ja yleisesti käytettävien esilääkitysten yhteydessä sekä lihasrelaksanttien, inhalaatioaineiden ja kipulääkkeiden kanssa, eikä farmakologista yhteensovittamattomuutta ole havaittu. Propofoliannosten pienentäminen saattaa olla välttämätöntä, kun yleisanestesiaa tai sedaatiota käytetään johtopuudutusmenetelmien lisänä. Merkittävä hypotensiota on raportoitu propofolilla tapahtuvan anestesian induktion jälkeen rifampisiinihoitoa saavilla potilailla.

Bentsodiatsepiinien, parasympatolyyttien tai inhalaatioanesteettien samanaikaisen käytön on raportoitu pitkittävän anestesiaa ja hidastavan hengitystaajuutta.

Midatsolaamia käyttävien potilaiden on havaittu tarvitsevan pienempiä propofoliannoksia. Propofolin ja midatsolaamin samanaikainen anto todennäköisesti syventää sedaatiota ja aiheuttaa hengityslaman. Samanaikaisen käytön yhteydessä pitää harkita propofoliannoksen pienentämistä.

Jos lisälääkityksenä annetaan opioideja, propofolin sedatiivinen vaikutus voi voimistua ja pitkittyä sekä apneaa voi esiintyä useammin ja se voi pitkittyä.

On otettava huomioon, että samanaikainen propofolin ja esilääkityksen, inhalaatioanesteetin tai analgeetin käyttö voi voimistaa anestesiaa ja kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia.

Keskushermosta lamaavien aineiden (esim. alkoholin, yleisanestesia-aineen tai narkoottisen analgeetin) yhteiskäyttö voi voimistaa niiden sedativista vaikutusta. Jos Propolipid-valmistetta käytetään yhdessä parenteraalisten, keskushermosta lamaavien lääkkeiden kanssa, seurauksena voi olla vahkea hengitys- ja kardiovaskulaaridepressio.

Fentanylin annon jälkeen veren propofolipitoisuus voi hetkellisesti suurentua ja lisätä apnean ilmenemistä.

Suksametonin tai neostigmiinin antamisen jälkeen voi ilmetä bradykardiaa tai sydänpysähdyksiä.

Siklosporiinia saavilla potilailla on ilmennyt leukoenkefalopatiaa rasvaemulsioiden, kuten propofolin annon yhteydessä.

Valproaattia ottavilla potilailla on havaittu tarvetta propofoliannosten pienentämiseen. Kun lääkeaineita käytetään samanaikaisesti, voidaan harkita propofoliannostuksen pienentämistä.

#### **4.6. He delmällisyys, raskaus ja imetyks**

##### Raskaus

Propofolin käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole osoitettu. Propofolia ei saa antaa raskaana oleville naisille ellei se ole ehdottoman tarpeellista. Propofoli läpäisee istukan ja voi aiheuttaa vastasyntyneen lamaantuneisuutta. Propofolia voidaan kuitenkin käyttää abortin yhteydessä.

Suuria annoksia (yli 2,5 mg/kg anestesian induktiossa ja 6 mg/kg/h anestesian ylläpidossa) on välttävä.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3).

##### Imetyks

Imettävillä äideillä tehdyt tutkimukset osoittivat, että pieniä määriä propofolia erittyy ihmisen rintamaitoon. Tämän vuoksi naisten ei pidä imettää 24 tunnin ajan propofolin annon jälkeen. Tänä aikana tuotettu rintamaito pitää hävittää.

#### **4.7. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn**

Potilaille on kerrottava, että kyky suoriutua taitoa edellyttävästä toimita, kuten ajamisesta tai koneiden käyttämisestä, voi huonontua joksikin aikaa propofolin käytön jälkeen.

Propolipid-anestesian jälkeen potilaasta on seurattava riittävän pitkään. Potilaasta on kehotettava olemaan ajamatta autoa, käyttämättä koneita tai ryhtymättä mahdollisesti vaarallisiiin töihin. Potilaasta ei saa päästää kotiin ilman saattajaa ja häntä on kehotettava välittämään alkoholin käyttöä.

Propofolin aiheuttama kykyjen huonontuminen ei yleensä ole havaittavissa yli 12 tunnin jälkeen (ks. kohta 4.4).

#### **4.8. Haimavaikutukset**

Anestesian tai sedaation induktio tai ylläpito propofolin avulla on yleensä sujuvaa, ja eksitaatiota esiintyy vain vähän. Yleisimmin raportoituja haimavaikutuksia ovat anesteettien / sedatiivisten aineiden farmakologisesti odotettavissa olevat haimavaikutukset, esim. hypotensio. Propofolia saaneilla potilailla havaittujen haimavaikutusten luonne, voimakkuus ja ilmaantuvuus saattavat liittyä potilaan voitiin ja käytettyihin toimenpiteisiin tai hoitotoimiin.

##### Haimavaikutustaulukko

Elinjärjestelmäluokka	Yleisyyys	Haimavaikutukset
Immunijärjestelmä	Hyvin harvinainen (< 1/10 000)	Anafylaksia – johon saattaa liittyä angioedeema, bronkospasmi, eryteema ja hypotensio
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	Yleisyyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Metabolinen asidoosi <sup>(5)</sup> , hyperkalemia <sup>(5)</sup> , hyperlipidemia <sup>(5)</sup>

<i>Psyykkiset häiriöt</i>	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Euforinen mieliala, seksuaalinen estottomuus Lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkeriippuvuus <sup>(8)</sup>
<i>Hermosto</i>	Yleinen (> 1/100, < 1/10)	Päänsärky heräämisvaiheen aikana
	Harvinainen (> 1/10 000, < 1/1000)	Epileptiformiset liikkeet, mukaan lukien kouristukset ja opistotonus induktio-, ylläpito- ja heräämisvaiheen aikana Huimaus, vilunväreet ja viluisuus heräämisvaiheen aikana
	Hyvin harvinainen <td>Postoperatiivinen tajuttomuus</td>	Postoperatiivinen tajuttomuus
	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Tahattomat liikkeet
<i>Sydän</i>	Yleinen (> 1/100, < 1/10)	Bradykardia <sup>(1)</sup> ja takykardia induktion aikana
	Hyvin harvinainen <td>Keuhkopöhö</td>	Keuhkopöhö
	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Sydämen rytmihäiriö <sup>(5)</sup> , sydämen vajaatoiminta <sup>(5), (7)</sup>
<i>Verisuonisto</i>	Yleinen (> 1/100, < 1/10)	Hypotensio <sup>(2)</sup>
	Melko harvinainen <td>Tromboosi ja laskimotulehdus</td>	Tromboosi ja laskimotulehdus
<i>Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina</i>	Yleinen (> 1/100, < 1/10)	Ohimenevä apnea, yskä ja nikottelu induktion aikana
	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Hengityslama (annosriippuvainen)
<i>Ruoansulatuselimistö</i>	Yleinen (> 1/100, < 1/10)	Pahoinvointi ja oksentelu heräämisvaiheen aikana
	Hyvin harvinainen <td>Pankreatiitti</td>	Pankreatiitti
<i>Maksa ja sappi</i>	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Hepatomegalia <sup>(5)</sup> Hepatiitti <sup>(11)</sup> , maksan akuutti vajaatoiminta <sup>(11)</sup>
<i>Luusto, lihakset ja sidekudos</i>	Yleisyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Rabdomolyysi <sup>(3), (5)</sup>
<i>Sukkuvoielimet ja rinnat</i>	Yleisyys tuntematon	Priapismi
<i>Munuaiset ja virtsatiet</i>	Hyvin harvinainen <td>Virtsan värijääntyminen pitkittyneen annon jälkeen</td>	Virtsan värijääntyminen pitkittyneen annon jälkeen

	Yleisyyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Munuaisten vajaatoiminta <sup>(5)</sup>
<i>Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat</i>	Hyvin yleinen (> 1/10)	Paikallinen kipu induktion yhteydessä <sup>(4)</sup>
	Hyvin harvinainen <td>Kudosnekroosi <sup>(10)</sup> vahingossa tapahtuneen ekstravaskulaarisen annon jälkeen</td>	Kudosnekroosi <sup>(10)</sup> vahingossa tapahtuneen ekstravaskulaarisen annon jälkeen
	Yleisyyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Paikallinen kipu ja turvotus vahingossa tapahtuneen ekstravaskulaarisen annon jälkeen
<i>Tutkimukset</i>	Yleisyyys tuntematon <sup>(9)</sup>	Brugada-tyyppinen EKG <sup>(5), (6)</sup>
<i>Vammat ja myrkytykset</i>	Hyvin harvinainen <td>Postoperatiivinen kuume</td>	Postoperatiivinen kuume

<sup>(1)</sup> Vakava bradykardia on harvinaista. Asystoleen etenemistä on ilmoitettu yksittäisissä raporteissa.

<sup>(2)</sup> Hypotensio voi joskus vaatia IV-nesteytystä ja propofolin antonopeuden pienentämistä.

<sup>(3)</sup> Rabdomolyysia on ilmoitettu hyvin harvoin tapauksissa, joissa propofolia on annettu yli 4 mg/kg/h annoksina tehoitoitilaan sedaatioon.

<sup>(4)</sup> Voidaan minimoida käytäväällä kyynärvarren ja kyynärtaipeen suurempia laskimoita. Propolipid -valmistetta käytettäessä paikallista kipua voidaan vähentää myös antamalla samanaikaisesti lidokaiinia.

<sup>(5)</sup> Näiden tapahtumien yhdistelmiä, joita on ilmoitettu "propofoli-infusio-oireyhtymänä", saatetaan todeta vakavasti sairailla potilailla, joilla usein on monia riskitekijöitä näiden tapahtumien kehittymiselle (ks. kohta 4.4).

<sup>(6)</sup> Brugada-tyyppinen EKG – ST -nousu ja kaareutuva T-aalto EKG:ssä.

<sup>(7)</sup> Nopeasti etenevä (joissakin tapauksissa kuolemaan johtava) sydämen vajaatoiminta aikuisilla. Näissä tapauksissa inotrooppisella tukioidolla ei yleensä saavutettu vastetta sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

<sup>(8)</sup> Propofolin väärinkäyttö ja propofoliriippuvuus, lähinnä terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa.

<sup>(9)</sup> Tuntematon, koska saatavissa oleva kliininen tutkimustieto ei riitä arviointiin.

<sup>(10)</sup> Nekrosia on raportoitu, kun kudoksen elinkelpoisuus on heikentynyt.

<sup>(11)</sup> Sekä pitkäkestoisesta että lyhytaikaisesta hoidon jälkeen ja potilailla, joilla ei ole riskitekijöitä taustalla.

#### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

#### **4.9. Yliannostus**

Vahingossa annettu yliannos todennäköisesti aiheuttaa sydän- ja hengitysdepression.

Hengitysdepressiota on hoidettava mekaanisella happiventilaatiolla. Kardiovaskulaarinen lama voi edellyttää potilaan pääpuolen laskemista ja vaikeissa tapauksissa plasmavolyymin lisääjien ja vasopressorien antoa.

### **5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET**

## **5.1. Farmakodynamiikka**

Farmakoterapeutinen ryhmä: Anestesia-aineet, muut yleisanestesia-aineet.  
ATC-koodi: N01AX10.

### Vaikutusmekanismi/Farmakodynaamiset vaikutukset

Propofoli (2,6-di-isopropyylifenoli) on lyhytvaikuttainen yleisanesteetti, jonka vaikutus alkaa nopeasti. Injektionopeudesta riippuen anestesian induktio alkaa 30 - 40 sekunnin kuluessa annosta. Anestesian kesto yhden bolusinjektion jälkeen on lyhyt ja kestää metaboliasta ja eliminaatiosta riippuen 4-6 minuuttia.

### Kliininen teho ja turvallisuus

Tavallisen ylläpitoannoksen aikana ei ole havaittu merkitsevä kumuloitumista infuusiota tai toistuvia injektilöytöitä käytettäessä. Potilaat heräävät anestesiasta nopeasti.

Bradykardia ja verenpaineen lasku, joita on raportoitu anestesian induktion yhteydessä, voivat johtua kohonneesta sentraalisesta vagaalisesta tonuksesta tai sympaattisen vaikutuksen inhibitiosta. Hemodynamiikka yleensä palautuu normaaliksi anestesian ylläpidon aikana.

### Pediatriset potilaat

Piennessä määrässä tutkimuksia, joissa tutkittiin propofolianestesian kestoja lapsilla, propofoli osoitettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi enintään 4 tuntia kestävässä anestesiassa. Kirjallisuudesta on löydetty vissä tietoa pitempiaikaisesta käytöstä lapsille ilman turvallisuuden ja tehon muutosta.

## **5.2. Farmakokinetiikka**

### Imeystyminen

Propofolista 98 % sitoutuu plasman proteiineihin. Laskimoon annon jälkeen propofolin farmakokinetiikkaa voi kuvata 3-tilamallin avulla.

### Jakautuminen/Biotransformaatio/Eliminaatio

Propofoli jakautuu laajasti ja poistuu nopeasti elimistöstä (kokonaispuhdistuma on 1,5-2 l/min). Eliminaatio tapahtuu metaboloitumalla, lähiinä maksassa, ja on **riippuvaista vereenvirtauksesta**. Metaboliasprosesseissa muodostuu propofolin inaktiivisia konjugaatteja ja vastaavaa kinolimetabolittia, jotka erittyvät virtsaan.

Laskimoon annetun 3 mg/kg kerta-annoksen jälkeen propofolin puhdistuma/kg suurenii iän mukana seuraavasti: mediaanipuhdistuma oli merkittävästi pienempi alle kuukauden ikäisillä vastasyntyneillä (n=25) (20 ml/kg/min) verrattuna vanhempiin lapsiin (n=36, ikäjakama 4 kk – 7 vuotta). Lisäksi vastasyntyneillä yksilöiden välinen vaihtelu oli huomattavan suurta (vaihteli välillä 3,7–78 ml/kg/min). Näiden vähäisten koetulosten perusteella, jotka osoittavat suurta vaihtelua, annossuosituksia ei voida antaa tälle ikäryhmälle.

Propofolin mediaanipuhdistumat vanhemmillä lapsilla yhden 3 mg/kg kerta-annoksen jälkeen olivat 37,5 ml/min/kg (4-24 kk, n=8), 38,7 ml/min/kg (11–43 kk, n=6), 48 ml/min/kg (1-3-vuotiaat, n=12), 28,2 ml/min/kg (4-7-vuotiaat, n=10) verrattuna aikuisiin 23,6 ml/min/kg (n=6).

Alle 2 vuoden ikäisten pediatristen potilaiden hoidossa ei suositella tavoiteohjatun infuusion käyttöä, koska siitä on saatavissa vain vähän tietoja.

## **5.3. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta**

Prekliiniset tiedot, jotka perustuvat tavanomaisiin kokeisiin, joissa on tutkittu toksisuutta toistuvilla

annoksilla tai genotoksisuutta, eivät ole osoittaneet erityistä vaaraa ihmisille. Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. Teratogenisyytä vaikuttuksia ei ole havaittu. Tutkittaessa paikallista siedettävyyttä aiheutti lihaksensisäinen injektio kudosvaurion injektiokohdan ympärillä. Injektiot suonen ulkopuolelle ja ihon alle aiheuttivat histologisia reaktioita, jotka ilmenivät tulehdusinfiltraattein ja paikallisina fibrooseina.

Eläimillä (myös kädellisillä) tehdyt julkaistut tutkimukset, joissa käytetyt annokset saivat aikaan lievän tai kohtalaisen anestesian, osoittavat anestesia-aineiden käytön aivojen nopean kehittymisen tai synaptogeneesin aikana aiheuttavan kehittyvissä aivoissa solukatoa, joka voi olla yhteydessä pitkäkestoisiin kognitiivisiin puutoksiihin. Näiden prekliimisten havaintojen klinistä merkitystä ei tiedetä.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1. Apuaineet**

Sojaöljy, puhdistettu  
Keskipitkäketjuiset triglyseridit  
Puhdistetut munafosfatidit  
Glyseroli  
Öljyhappo  
Natriumhydroksidi  
Injektionesteisiin käytettävä vesi

### **6.2. Yhteensopimattomuudet**

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin kohdassa 6.6 mainittujen lääkevalmisteiden kanssa.

Propolipid 20 mg/ml -valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

### **6.3. Kestoaika**

Lääkevalmisteen kestoaiaka alkuperäispakkauksessa: 2 vuotta.

Kestoaika pakkauksen avaamisen jälkeen: käytettävä välittömästi.

Laimentamattoman Propolipid-valmisteen antoon käytettävä laitteisto tulee vaihtaa 12 tunnin kuluttua.

Kestoaika laimentamisen jälkeen: Valmiste on käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen. Antamisen tulee tapahtua 6 tunnin kuluessa laimentamisesta.

### **6.4. Säilytys**

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätynä.

### **6.5. Pakkaustyyppi ja pakkauskoot**

10 mg/ml

10 ml tai 20 ml esityytetty ruisku (tyypin I lasia), bromobutyylikorkki, bromobutyylimäntä jossa polypropyleenivarsi.

10 ml tai 20 ml esityytetty ruisku (syklo-olefinikopolymeeri), bromobutyylikorkki, bromobutyylimäntä jossa polypropyleenivarsi.

50 ml esitetytty ruisku (syklo-olefinikopolymeeri), bromobutyylikorkki, bromobutylimäntä jossa polypropyleenivarsi.

Pakkaus sisältää 5 lasista ruiskua, á 10 ml.

Pakkaus sisältää 6 muoviruiskua, á 10 ml.

Pakkaus sisältää 5 lasista ruiskua, á 20 ml.

Pakkaus sisältää 6 muoviruiskua, á 20 ml.

Pakkaus sisältää 1 muoviruiskun, á 50 ml.

#### 20 mg/ml

50 ml esitetytty ruisku (syklo-olefinikopolymeeri), bromobutyylikorkki, bromobutylimäntä jossa polypropyleenivarsi.

Pakkaus sisältää 1 muoviruiskun, á 50 ml.

### **6.6. Erityiset varotoimet hävittämiseelle ja muut käyttöohjeet**

Propolipid 10 mg/ml -valmistetta ei saa sekoittaa ennen antamista muiden injektil- tai infuusionesteiden kanssa, paitsi 50 mg/ml (5 %) glukoosi -injektionesteen, 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi -injektionesteen tai säilytysaineettoman 10 mg/ml (1 %) lidokaiimiliuoksen kanssa. Laimennus saa olla enintään 1 osa Propolipid 10 mg/ml infuusionestettä ja 4 osaa

50 mg/ml (5 %) glukoosi -injektionestettä tai 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi -injektionestettä (lopullinen propofolipitoisuus ei saa olla alle 2 mg/ml). Laimennus on tehtävä aseptisesti (kontrolloiduissa ja validoiduissa olosuhteissa) välittömästi ennen antamista ja antamisen tulee tapahtua 6 tunnin kuluessa valmistamisesta.

50 mg/ml (5 %) glukoosi -, 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi – tai 40 mg/ml (4 %) glukoosi- / 1,8 mg/ml (0,18 %) natriumkloridi -injektioneste voidaan antaa samanaikaisesti Propolipid-valmisten kanssa lähelle injektiokohtaa Y-kappaleen avulla.

Propolipid 20 mg/ml -valmistetta ei saa sekoittaa muihin infuusio- tai injektionesteisiin.

### **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Fresenius Kabi AB  
S-751 74 Uppsala  
Ruotsi

### **8. MYYNTILUVAN NUMERO**

10 mg/ml: 30192

20 mg/ml: 30193

### **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/ UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 10.6.2013

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 1.3.2018

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

31.7.2024

## **PRODUKTRESUMÉ**

### **1. LÄKEMEDELETS NAMN**

Propolipid 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta  
Propolipid 20 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta

### **2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

#### 10 mg/ml

1 ml emulsion innehåller 10 mg propofol.  
Varje 10 ml spruta innehåller 100 mg propofol.  
Varje 20 ml spruta innehåller 200 mg propofol.  
Varje 50 ml spruta innehåller 500 mg propofol.

#### 20 mg/ml

1 ml emulsion innehåller 20 mg propofol.  
Varje 50 ml spruta innehåller 1000 mg propofol.

Hjälpämnen med känd effekt:

1 ml emulsion innehåller:  
sojaolja, raffinerad                    50 mg  
natrium                                  max 0,06 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

### **3. LÄKEMEDELSFORM**

Injektions-/infusionsvätska, emulsion i förfylld spruta

Vit olja-i-vatten-emulsion  
Emulsionens pH: 7,5–8,5  
Emulsionens osmolalitet: 270–330 mosmol/kg

### **4. KLINISKA UPPGIFTER**

#### **4.1 Terapeutiska indikationer**

Propolipid 10 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för:

- induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad
- sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 1 månad
- sedering av ventilerade patienter > 16 år i intensivvård.

Propolipid 20 mg/ml är ett kortverkande, intravenöst allmänanestetikum för:

- induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 3 år

- sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi hos vuxna, ungdomar och barn > 3 år
- sedering av ventilerade patienter > 16 år i intensivvård.

## **4.2 Dosing och administreringssätt**

Propolipid får endast ges på sjukhus eller adekvat utrustade öppenvårdsenheter av läkare som är utbildade i anestesi eller intensivvård.

Blodcirkulationen och andningsfunktionen ska övervakas löpande (t.ex. EKG, pulsoximeter) och utrustning för att säkerställa fria luftvägar, för artificiell ventilation och för återupplivning ska hela tiden finnas omedelbart tillgänglig.

Vid sedering under kirurgiska och diagnostiska ingrepp ska administrering av Propolipid ej skötas av samma person som utför det diagnostiska/kirurgiska ingreppet.

Dosen av Propolipid ska anpassas individuellt och baseras på patientsvar och premedicinering.

Vanligen behöver analgetika ges som supplement till Propolipid.

### **Dosering**

#### **Allmän anestesi hos vuxna**

##### Induktion av anestesi

Vid induktion av anestesi ska Propolipid titreras (cirka 20–40 mg propofol var 10:e sekund) i förhållande till patientens svar, till dess att kliniska tecken på anestesi observeras.

De flesta vuxna patienter som är yngre än 55 år behöver vanligen 1,5-2,5 mg propofol/kg kroppsvikt.

Patienter över 55 år liksom patienter i ASA-klass III och IV, särskilt de med nedsatt hjärtfunktion, behöver oftast en lägre dos och i dessa fall kan totaldosen Propolipid reduceras till en minimidos om 1 mg propofol/kg kroppsvikt. Tillförseln av Propolipid bör hos dessa patienter ske långsammare (ca 2 ml av Propolipid 10 mg/ml eller 1 ml av Propolipid 20 mg/ml (20 mg propofol) var 10:e sekund).

##### Underhåll av anestesi

Med Propolipid 10 mg/ml underhålls anestesin genom kontinuerlig infusion eller upprepade bolusinjektioner.

Med Propolipid 20 mg/ml underhålls anestesin genom kontinuerlig infusion.

För underhåll av anestesi bör i allmänhet doser på 4–12 mg propofol/kg kroppsvikt/timme ges. En reducerad underhållsdos på ca 4 mg propofol/kg kroppsvikt/timme kan vara tillräcklig under mindre ingrepp såsom minimal invasiv kirurgi.

Till äldre patienter, patienter med instabilt allmäntillstånd, patienter med nedsatt hjärtfunktion samt till hypovolemska patienter eller patienter i ASA-klass III och IV kan dosen av Propolipid reduceras ytterligare beroende på patientens tillstånd samt vilken sövningsteknik som tillämpas.

Med Propolipid 10 mg/ml kan anestesin underhållas genom upprepade bolusinjektioner i doser om 25–50 mg propofol (= 2,5–5,0 ml Propolipid 10 mg/ml) i enlighet med det kliniska svaret.

Snabb administrering av enstaka eller upprepade bolusdoser med Propolipid 10 mg/ml ska inte ges till äldre patienter eftersom det kan leda till kardiopulmonal depression.

### Allmän anestesi hos barn över 1 månads ålder

#### Induktion av anestesi

Vid induktion av anestesi ska Propolipid 10 mg/ml titreras långsamt till dess att kliniska tecken på anestesi observeras.

Dosen ska justeras i förhållande till ålder och/eller kroppsvekt. De flesta patienter över 8 år behöver cirka 2,5 mg propofol/kg kroppsvekt för induktion av anestesi. Det kan krävas högre doser (2,5–4 mg/kg kroppsvekt) för yngre barn, speciellt mellan 1 månads och 3 års ålder.

#### Underhåll av allmän anestesi

Ett tillfredsställande anestesidjup kan upprätthållas genom administrering av Propolipid 10 mg/ml som infusion eller upprepade bolusinjektioner. Den doseringshastighet som krävs varierar betydligt mellan olika patienter men en hastighet omkring 9–15 mg/kg/timme ger vanligtvis en tillfredsställande anestesi. Det kan krävas högre doser för yngre barn, speciellt mellan 1 månads och 3 års ålder.

För patienter i ASA-klass III och IV rekommenderas en lägre dosering (se även avsnitt 4.4).

### Allmän anestesi hos barn över 3 års ålder

#### Induktion av anestesi

Vid induktion av anestesi ska Propolipid 10 mg/ml eller Propolipid 20 mg/ml titreras långsamt till dess att kliniska tecken på anestesi observeras.

Dosen ska justeras i förhållande till ålder och/eller kroppsvekt. De flesta patienter över 8 år behöver cirka 2,5 mg propofol/kg kroppsvekt för induktion av anestesi. Det kan krävas högre doser hos yngre barn (2,5–4 mg/kg kroppsvekt).

#### Underhåll av allmän anestesi

Ett tillfredsställande anestesidjup kan upprätthållas genom administrering av Propolipid 10 mg/ml som infusion eller upprepade bolusinjektioner eller 20 mg/ml som infusion. Den doseringshastighet som krävs varierar betydligt mellan olika patienter men en hastighet omkring 9–15 mg/kg/timme ger vanligtvis en tillfredsställande anestesi. Det kan krävas högre doser för yngre barn.

För patienter i ASA-klass III och IV rekommenderas en lägre dosering (se även avsnitt 4.4).

### **Sedering av vuxna patienter i samband med diagnostiska och kirurgiska ingrepp**

För att ge sedering under kirurgiska och diagnostiska ingrepp ska dosen och doseringshastigheten anpassas till det kliniska svaret. För de flesta patienter krävs 0,5–1 mg propofol/kg kroppsvekt under 1–5 minuter för tillslag av sedering. Underhåll av sedering kan utföras genom titrering av Propolipid

infusion till önskat sederingsdjup. De flesta patienter kräver 1,5–4,5 mg propofol/kg kroppsvikt per timme. Infusionen kan kompletteras med en bolusadministrering av 10–20 mg propofol (1–2 ml Propolipid 10 mg/ml eller 0,5–1 ml Propolipid 20 mg/ml) om en snabb ökning av sederingsdjupet krävs.

För patienter över 55 år liksom patienter i ASA-klass III och IV kan det vara nödvändigt med lägre doser av Propolipid och administreringshastigheten kan behöva sänkas.

### **Sedering vid diagnostiska/kirurgiska ingrepp hos barn över 1 månads ålder**

Dos och administreringshastighet ska justeras utifrån det önskade sederingsdjupet och det kliniska svaret. För de flesta pediatriska patienter krävs 1–2 mg propofol/kg kroppsvikt för tillslag av sedering. Underhåll av sedering kan utföras genom titrering av infusion med Propolipid till önskat sederingsdjup. De flesta patienter kräver 1,5–9 mg propofol/kg/timme. Med Propolipid 10 mg/ml kan infusionen kompletteras med en bolusadministrering på upp till 1 mg/kg/kroppsvikt om en snabb ökning av sederingsdjupet krävs.

För patienter i ASA-klass III och IV kan det vara nödvändigt med en lägre dos.

### **Sedering vid diagnostiska/kirurgiska ingrepp hos barn över 3 års ålder**

Dos och administreringshastighet ska justeras utifrån det önskade sederingsdjupet och det kliniska svaret. För de flesta pediatriska patienter krävs 1–2 mg propofol/kg kroppsvikt för tillslag av sedering. Underhåll av sedering kan utföras genom titrering av infusion med Propolipid till önskat sederingsdjup. De flesta patienter kräver 1,5–9 mg propofol/kg/timme. Med Propolipid 10 mg/ml kan infusionen kompletteras med en bolusadministrering på upp till 1 mg/kg/kroppsvikt om en snabb ökning av sederingsdjupet krävs.

För patienter i ASA-klass III och IV kan det vara nödvändigt med en lägre dos.

### **Sedering av patienter över 16 års ålder vid intensivvård**

Vid sedering av ventilerade patienter i samband med intensivvård rekommenderas att Propolipid ges i form av kontinuerlig infusion. Dosen ska justeras efter behov av sederingsdjup. Tillfredsställande sedering uppnås vanligen med en infusionstakt på 0,3–4,0 mg propofol/kg kroppsvikt/timme. Infusionshastigheter överstigande 4,0 mg propofol/kg kroppsvikt/timme rekommenderas inte (se avsnitt 4.4).

Målstyrd infusion (TCI) av propofol rekommenderas inte vid sedering i samband med intensivvård.

#### Administreringens längd

Propolipid får inte administreras längre än 7 dagar.

#### **Administreringssätt**

För intravenös användning.

Endast för engångsbruk. Oanvänt emulsion ska kasseras.

Förfyllda sprutor ska skakas före användning.

Om två skikt kan ses efter skakning ska emulsionen inte användas.

Använd endast homogena emulsioner och oskadade förfyllda sprutor.

Propolipid 10 mg/ml kan ges som infusion outspädd eller utspädd (se avsnitt 6.6).

Propolipid 20 mg/ml administreras outspädd intravenöst genom kontinuerlig infusion.

Propolipid 20 mg/ml ska inte ges som upprepad bolusinjektion för underhåll av anestesi.

När Propolipid ges som infusion ska byrett, droppräknare, sprutpump (inklusive målstyrd infusionsutrustning) eller volumetrisk infusionspump alltid används för att kontrollera infusionshastigheten.

Propolipid är en lipidemulsion utan antimikrobiella konserveringsmedel vilket medför ökad risk för snabb tillväxt av mikroorganismer.

Emulsionen måste dras upp aseptiskt i ett infusionsset omedelbart efter det att sprutan öppnats.  
Tillförsel måste påbörjas utan dröjsmål.

Hantering av Propolipid och infusionsutrustning måste ske aseptiskt under hela infusionsperioden.  
Samtidig tillförsel av andra läkemedel eller injektionsvätskor måste ske nära kanylens placering med hjälp av en Y-koppling eller trevägskran. För instruktioner om samtidig administrering av läkemedel, se avsnitt 6.6.

Propolipid får inte administreras via ett mikrobiologiskt filter.

Propolipid och allt förbrukningsmaterial som används i samband med infusionen är avsett för **engångsbruk** till en **enskild** patient. Efter användning måste all kvarvarande Propolipid kasseras.

#### Infusion av outspädd Propolipid

I likhet med andra fettemulsioner får infusion av outspädd Propolipid via ett och samma infusionsystem pågå i högst 12 timmar. Efter 12 timmar ska infusionsaggregat och överbliven emulsion kasseras eller vid behov bytas ut.

#### Infusion av utspädd Propolipid 10 mg/ml

När Propolipid 10 mg/ml ges utspädd ska byrett, droppräknare eller infusionspump alltid användas för att kontrollera infusionshastigheten och undvika risk för oavsiktlig, okontrollerad infusion av stora volymer utspädd Propolipid 10 mg/ml. Denna risk för överdosering måste beaktas när man beslutar om den maximala utspänningen i byretten.

För att minska smärtan vid injektionsstället kan lidokain injiceras omedelbart före administrering av Propolipid (se avsnitt 4.4). Alternativt kan Propolipid 10 mg/ml blandas, omedelbart innan användning, med 1 % lidokain för injektion utan konserveringsmedel (20 delar Propolipid 10 mg/ml med upp till 1 del lidokain för injektion, 1 %) under kontrollerade och validerade, aseptiska förhållanden. Blandningen måste administreras inom 6 timmar.

Muskelavslappnande medel som atrakurium och mivakurium får inte ges via samma infusionsställe som Propolipid utan föregående spolning.

Propolipid kommer att injiceras in i en ven antingen manuellt eller med en elektrisk pump. Om elektrisk pump används ska kompatibilitet säkerställas.

10 ml och 20 ml sprutor av glas och 10 ml sprutor av plast är endast lämpliga för manuell administrering och får inte användas tillsammans med pump.

10 ml och 20 ml sprutor av glas får inte heller användas med nälfria anslutningar, med undantag för standardslangar och trevägskranar, för att undvika att anslutningen täpps till eller går sönder.

Om skador eller tillämpning observeras måste den förfyllda sprutan kasseras och en ny användas.

#### **Administrering med förfyllda sprutor (för förmonte rade sprutor kan ste g 2 utelämnas):**

Sterilitet måste säkerställas. Utsidan av sprutan och kolvstången är inte sterila!

- 1) Ta ut sprutan från förpackningen och skaka den.
- 2) Anslut kolvstången genom att skruva in den med sols i sprutan.
- 3) Ta bort skyddet på sprutspetsen och anslut infusionsslangen, nålen eller kanylen till sprutan. Avlägsna gasbubblor (en liten bubbla kan få vara kvar) och den bruksfördiga sprutan kan installeras i pumpen eller ges manuellt

#### **Målstyrd infusion – administrering av Propolipid med pump (endast för 20 ml plastspruta och 50 ml plastspruta):**

Tillförsel av Propolipid med ett målstyrt infusionssystem (TCI - Target Controlled Infusion) får endast användas för induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna. Metoden rekommenderas ej för sedering inom intensivvård eller vid sedering i samband med kirurgiska eller diagnostiska ingrepp.

Propolipid kan administreras med ett målstyrt infusionssystem med lämplig mjukvara. Användaren måste vara förtrogen med infusionspumpens bruksanvisning och med målstyrd infusion av Propolipid.

Systemet tillåter anestesiolog eller intensivvårdsläkare att uppnå och kontrollera önskad induktionshastighet och anestesidjup genom att specificera och justera en förutbestämd målkonzentration i plasma och/eller på målstället för effekt av propofol.

Hänsyn ska tas till skillnad i konfigurering mellan olika pumpsystem, t.ex. kan systemet förutsätta att den initiala propofolkonzcentrationen är noll. Hos patienter som redan har fått propofol kan det därför vara nödvändigt att välja en lägre initial målkonzentration vid inledande av målstyrd infusion. Det är inte heller rekommenderat att omedelbart återuppta målstyrd infusion ifall pumpen har varit avstängd.

Vägledning rörande målkonzentration av propofol ges nedan. På grund av farmakodynamiska och farmakokinetiska olikheter hos både premedicinerade och icke premedicinerade patienter måste behandlingssvaret på den valda målkonzcentrationen av propofol kontinuerligt utvärderas för att uppnå det avsedda anestesidjupet.

#### *Induktion och underhåll av allmän anestesi med målstyrd infusion*

Hos vuxna patienter under 55 år induceras allmän anestesi vanligen med en målkonzentration av propofol i blod på cirka 4–8 mikrogram/ml. En initial målkonzentration av 4 mikrogram/ml rekommenderas för premedicinerade och 6 mikrogram/ml för icke premedicinerade patienter.

Induktionsiden med dessa nivåer är vanligen 60–120 sekunder. Högre nivåer ger en snabbare induktion av anestesi men ger också mer påtaglig hemodynamisk och respiratorisk påverkan.

En lägre initial induktionsnivå ska användas hos patienter över 55 år och hos patienter med ASA-klass III och IV. Målkonzcentrationen i blodet kan sedan ökas gradvis med 0,5–1,0 mikrogram/ml och 1 minuts intervall för att erhålla en gradvis induktion av anestesin.

Tillägg av smärtstillande behandling behövs i regel och möjligheten att reducera målkoncentrationen vid underhåll av anestesi påverkas av omfattningen av samtidigt given analgetika. En målkonzentration av propofol på cirka 3–6 mikrogram/ml ger vanligtvis tillfredsställande underhåll av anestesi.

Blodkoncentrationen av propofol är vid uppvaknandet vanligen cirka 1,0–2,0 mikrogram/ml och påverkas av den mängd smärtstillande behandling som givits i underhållfasen.

#### *Sedering vid intensivvård (målstyrd infusion rekommenderas inte)*

En målkonzentration i blodet på 0,2–2,0 mikrogram/ml krävs i allmänhet. Tillförseln ska starta med en låg målkonzentration för att sedan titreras efter patientsvaret till önskat sederingsdjup.

### **4.3 Kontraindikationer**

Propofol är kontraindicerat till patienter med känd överkänslighet mot propofol eller mot något hjälpmämne som anges i avsnitt 6.1.

Propolipid innehåller sojaolja och ska därför inte användas till patienter som är överkänsliga mot jordnötter eller soja.

Propofol får inte användas för sedering i samband med intensivvård till patienter som är 16 år eller yngre (se avsnitt 4.4).

### **4.4 Varningar och försiktighet**

Propofol ska ges av personer med utbildning inom anestesi (eller, där så är lämpligt, läkare med utbildning i vård av patienter inom intensivvård).

Patienterna ska övervakas konstant och utrustning för upprätthållande av öppen luftväg, artificiell ventilation, oxygenberikning och annan återupplivningsutrustning ska alltid finnas lätt tillgänglig. Propofol får inte administreras av den person som utför det diagnostiska eller kirurgiska ingreppet.

Missbruk och beroende av propofol har rapporterats, främst hos sjukvårdspersonal. Som för andra allmänanestetika kan administrering av propofol, utan att fria luftvägar säkerställs, resultera i fatale luftvägskomplikationer.

När propofol administreras för vaken sedering vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp ska patienterna övervakas kontinuerligt med avseende på tidiga tecken på hypotoni, luftvägsobstruktion och sänkt syrgasmätnad.

Ofrivilliga rörelser kan förekomma när propofol används för sedering vid kirurgiska ingrepp. Vid ingrepp som kräver att patienten är helt stilla kan dessa rörelser utgöra en risk.

Efter användning av propofol måste man låta det gå tillräckligt lång tid för att patienten ska återhämta sig helt innan han/hon skrivs ut. I mycket sällsynta fall kan användning av propofol ge upphov till en period av postoperativ medvetslöshet, som kan vara förenad med en förhöjd muskeltonus. Detta kan förekomma med eller utan en föregående vakenhetsperiod. Även om uppvaknandet sker spontant måste man ge lämplig behandling för en medvetslös patient.

Propofolinducerad försämring kan i allmänhet inte påvisas efter 12 timmar. Man måste ta hänsyn både till effekterna av propofol, själva ingreppet, andra samtidiga läkemedel samt patientens ålder och tillstånd när man ger råd till patienterna angående:

- Det lämpliga i att patienten har sällskap när han/hon lämnar den plats där administreringen skett
- Valet av tidpunkt för att återuppta arbetsuppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet eller är riskfyllda, t.ex. bilkörning
- Användning av andra medel som kan ha sederande effekt (t.ex. bensodiazepiner, opiater, alkohol)

Födröjda epileptiforma attacker kan inträffa även hos icke-epileptiker. Födröjningsperioden kan variera från ett par timmar till flera dagar.

#### Särskilda patientgrupper

##### *Hjärtinsufficiens, cirkulationssvikt, pulmonell insufficiens och hypovolemi*

I likhet med andra anestetika för intravenöst bruk ska försiktighet iakttas hos patienter med nedsatt hjärt-, lung-, njur- eller leverfunktion, hos hypovolemiska patienter eller hos försvagade patienter. Clearance för propofol är beroende av blodflödet och därför kommer samtidig behandling med läkemedel som reducerar hjärtminutvolymen även att reducera clearance för propofol.

Cirkulatorisk insufficiens, hjärt-lunginsufficiens och patienter som är hypovolemiska ska kompenseras före administrering av propofol.

Propofol bör inte ges vid svår hjärtinsufficiens eller andra svåra hjärtsjukdomar utan med yttersta försiktighet och under noggrann övervakning.

Starkt överväktiga patienter kräver en högre dos varför risken för hemodynamiska effekter på det kardiovaskulära systemet måste beaktas.

Propofol saknar vagolytisk effekt och har rapporterats ge bradykardi (ibland svår) och även asystoli. Man bör överväga intravenös administrering av ett antikolinergikum före induktion eller under underhåll av anestesi, särskilt i situationer där man kan vänta sig vaguspåslag eller när propofol används tillsammans med andra läkemedel som kan ge upphov till bradykardi.

##### *Epilepsi*

När propofol administreras till en patient med epilepsi kan det finnas en risk för krampanfall.

Födröjda epileptiforma attacker kan inträffa hos epileptiker. Födröjningsperioden kan variera från ett par timmar till flera dagar.

Innan anestesi induceras hos patienter med epilepsi ska det kontrolleras att patienten har fått antiepileptisk behandling. Trots att flera studier visat effekt av behandling med propofol vid status epilepticus kan också administrering av propofol till epileptiska patienter öka risken för krampanfall.

Användning av propofol rekommenderas ej i samband med elektrokonvulsiv behandling.

##### *Patienter med rubbningar i fettmetabolismen*

Lämplig försiktighet måste iakttas hos patienter med rubbningar i fettmetabolismen och vid andra tillstånd där lipidemulsioner måste användas med försiktighet.

#### *Patienter med högt intrakraniellt tryck*

Särskild försiktighet ska iakttas hos patienter med högt intrakraniellt tryck och lågt medelartärtryck då det finns risk för en uttalad sänkning av det intracerebrale perfusionstrycket.

#### Pediatrisk population

Användning av propofol rekommenderas ej till nyfödda barn, eftersom denna patientpopulation ej har studerats fullständigt. Farmakokinetiska data (se avsnitt 5.2) indikerar att clearance är avsevärt nedsatt hos nyfödda med en mycket hög interindividuell variabilitet. En relativ överdosering skulle kunna uppträda efter administrering av de doser som rekommenderas för äldre barn och leda till svår kardiovaskulär depression.

Propolipid 10 mg/ml rekommenderas inte för allmän anestesi hos barn yngre än 1 månad.

Målstyrd infusion rekommenderas inte för barn under 2 års ålder då endast begränsade data finns tillgängliga.

Propolipid 20 mg/ml rekommenderas inte för allmän anestesi hos barn under 3 års ålder eftersom det är svårt att ställa in korrekt dos av styrkan 20 mg/ml då behandling av små barn kräver extremt små volymer. För barn mellan 1 månad och 3 år, då lägre dos än 100 mg/timme behövs, rekommenderas istället Propolipid 10 mg/ml.

Propofol får inte ges för sedering vid intensivvård till patienter som är 16 år eller yngre, eftersom användning för propofol för sedering i denna åldersgrupp inte har visats (se avsnitt 4.3).

#### Råd angående vård på intensivvårdsavdelning

Vid användning av infusionser med propofolemulsion för IVA-sedering har metabola störningar och händelser av organsvikt, som kan leda till döden, förekommit. Rapporter har inkommit om patienter som drabbats av kombinationer av metabolisk acidosis, rabdomyolys, hyperkalemi, hepatomegali, njursvikt, hyperlipidemi, hjärtarytm, EKG av Brugada-typ (förhöjt ST-segment och inverterad T-våg) och snabbt tilltagande hjärtsvikt som vanligen inte svarar på inotrop understödjande behandling. Kombinationer av dessa biverkningar har benämnts som ”propofolinfusionssyndromet”. Dessa händelser sågs främst hos patienter med allvarliga skallskador och barn med luftvägsinfektioner som fick doser som översteg dem som rekommenderas till vuxna för sedering på intensivvårdsavdelning.

Följande förefaller vara de främsta riskfaktorerna för utveckling av dessa biverkningar: nedsatt syretillförsel till vävnaderna; allvarlig neurologisk skada och/eller sepsis; höga doser av ett eller flera av följande läkemedel: vasokonstriktor, steroider, inotropa medel och/eller propofol (vanligen vid doseringshastigheter över 4 mg/kg/h under mer än 48 timmar).

Förskrivare bör vara uppmärksamma på dessa möjliga biverkningar hos patienter med ovan nämnda riskfaktorer och genast avbryta propofolbehandlingen när ovan nämnda tecken utvecklas. Alla sederande och terapeutiska medel som används på intensivvårdsavdelningen (IVA) måste titreras så att man upprätthåller optimala parametrar för syretillförsel och hemodynamik. Patienter med förhöjt intrakraniellt tryck bör ges lämplig behandling för att kontrollera det cerebrale perfusionstrycket om behandlingen ändras.

Behandlande läkare påminns att om möjligt ej överskrida en dosering på 4 mg/kg/h.

Lämplig försiktighet måste iakttas hos patienter med rubbningar i fettmetabolismen och vid andra tillstånd där lipidemulsioner måste användas med försiktighet.

Det rekommenderas att man monitorerar blodlipidnivåerna om propofol ges till patienter som tros löpa särskild risk för fettoverbelastning. Administreringen av propofol måste justeras på lämpligt sätt om monitoreringen indikerar att fett inte elimineras på ett adekvat sätt från kroppen. Om patienten behandlas med annan intravenös lipid samtidigt, måste man minska mängden av denna för att ta hänsyn till den mängd lipid som infunderas som en del av propofolberedningen; 1,0 ml Propolipid innehåller cirka 0,1 g fett.

#### Ytterligare försiktighetsåtgärder

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med mitokondriell sjukdom. Dessa patienter kan ha en benägenhet för exacerbationer av sin sjukdom när de genomgår anestesi, kirurgi och IVA-vård. För sådana patienter rekommenderas att man upprätthåller normotermi, tillför kolhydrater och hydrerar patienten väl. De tidiga manifestationerna vid exacerbation av mitokondriell sjukdom kan likna dem vid ”propofolinfusionssyndromet”.

Propolipid innehåller inte antibakteriella konserveringsmedel, vilket kan underlätta växt av mikroorganismer.

När propofol ska aspireras måste det dras upp aseptiskt i en steril spruta eller ett infusionsset omedelbart efter det att man öppnat sprutan. Administreringen måste påbörjas omedelbart. Aseptisk måste upprätthållas för både propofol och infusionsutrustningen under hela infusionsperioden. Alla eventuella infusionsvätskor som tillsätts till propofolledningen måste administreras nära kanylstället. Propofol får ej administreras via ett mikrobiologiskt filter.

Propofol och injektionssprutor med propofol är avsedda för engångsbruk på en enskild patient. I enlighet med fastställda riktlinjer för andra lipidemulsioner får en enskild infusion av propofol ej pågå längre än 12 timmar. I slutet av proceduren, eller efter 12 timmar, beroende på vilket som inträffar först, måste både propofolreservoaren och infusionsledningen kasseras och vid behov ersättas.

#### Smärta vid injektionsstället

För att minska smärtan vid injektionsstället under induktion av anestesi med Propolipid kan lidokain injiceras före propofolemulsionen (se avsnitt 4.2).

Lidokain får inte ges intravenöst till patienter med ärflig, akut porfyri.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

#### **4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

Propofol har använts i kombination med spinal- och epiduralanestesi och med vanligt förekommande premedicineringar, neuromuskulärt blockerande läkemedel, inhalationsanestetika och analgetika; ingen farmakologisk inkompatibilitet har iakttagits. Lägre doser av propofol kan krävas i fall där man använder allmän anestesi eller sedering som komplement till tekniker med regional anestesi.

Uttalad hypotoni har rapporterats efter narkosinduktion med propofol hos patienter som behandlades med rifampicin.

Samtidig användning av bensodiazepiner, parasympatikolytiska medel eller inhalationsanestetika har rapporterats förlänga anestesin och sänka andningsfrekvensen.

Ett behov av lägre propofoldoser har observerats hos patienter som tar midazolam. Samtidig administrering av propofol och midazolam resulterar sannolikt i förstärkt sedering och andningsdepression. Vid samtidig användning, bör en minskad dos av propofol övervägas.

Efter supplerande medicinering med opioider kan den sederande effekten av propofol förstärkas och förlängas och apné inträffa i stigande frekvens och över en förlängd period.

Det bör observeras att samtidig användning av propofol och läkemedel för premedicinering, inhalationsanestetika eller analgetika kan förstärka anestesin och kardiovaskulära biverkningar.

Samtidig användning av centraldepressiva medel (t.ex. alkohol, allmänanestetika, narkotiska analgetika) förstärker deras sedativa effekter. Propolipid kan i kombination med parenterala centraldämpande läkemedel ge svår dämpning av respiratoriska och kardiovaskulära funktioner.

Efter administrering av fentanyl kan koncentrationen av propofol i blodet tillfälligt stiga vilket medför en ökad apnéfrekvens.

Bradykardi och hjärtstillestånd kan uppträda efter behandling med suxameton och neostigmin.

Leukoencefalopati har rapporterats i samband med administrering av lipidemulsioner, såsom Propolipid, till patienter som får ciklosporin.

Behov av lägre propofoldoser har observerats hos patienter som tar valproat. När läkemedlen används samtidigt bör en minskning av dosen propofol övervägas.

#### **4.6 Fertilitet, graviditet och amning**

##### Graviditet

Säkerheten av propofol under graviditet har inte visats. Propofol ska ej ges till gravida kvinnor utom när det är absolut nödvändigt. Propofol passrar över placental och kan förorsaka neonatal depression. Propofol kan dock användas under en framkallad abort.

Höga doser (mer än 2,5 mg/kg för induktion eller 6 mg/kg/timme för underhåll av anestesi) ska undvikas.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

##### Amning

Studier på ammande mödrar visade att små mängder av propofol utsöndras i bröstmjölk. Kvinnor ska därför inte amma under 24 timmar efter administrering av propofol. Mjölk som produceras under denna period ska kasseras.

#### **4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Patienten ska informeras om att förmågan att utföra arbetsuppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom bilkörning eller användning av maskiner, kan vara nedsatt en tid efter användning av propofol.

Efter administrering av Propolipid ska patienten hållas under noggrann uppsikt under en rimlig tidsperiod. Patienten bör uppmanas att ej köra motorfordon, använda maskiner eller utföra riskfyllda arbeten. Patienten bör inte få gå hem utan medföljande och ska informeras om att undvika intag av alkohol.

Propofolinducerad nedsättning kan i allmänhet inte påvisas efter 12 timmar (se avsnitt 4.4).

#### 4.8 Biverkningar

Induktion och underhåll av anestesi eller sedering med propofol sker vanligen smidigt med minimala tecken på excitation. De vanligaste rapporterade biverkningarna är farmakologiskt förutsägbara biverkningar av ett anestetikum/sedativum, såsom hypotoni. Karaktären, svårighetsgraden och incidensen för de biverkningarna som observeras hos patienter som behandlas med propofol kan vara kopplade till patientens tillstånd och till de kirurgiska och terapeutiska procedurer som utförs.

Tabell över biverkningar

Organsystemklass	Frekvens	Biverkningar
<i>Immunsystemet</i>	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Anafylaxi – kan inbegripa angioödem, bronkospasm, erytem och hypotoni
<i>Metabolism och nutrition</i>	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Metabolisk acidos <sup>(5)</sup> , hyperkalemi <sup>(5)</sup> , hyperlipidemi <sup>(5)</sup>
<i>Psykiska störningar</i>	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Euforisk sinnesstämning, sexuell hämningslöshet Läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende <sup>(8)</sup>
<i>Centrala och perifera nervsystemet</i>	Vanliga ( $\geq 1/100, < 1/10$ )	Huvudvärk under återhämtningsfasen
	Sällsynta ( $\geq 1/10 000, < 1/1000$ )	Epileptiforma rörelser, inklusive kramper och opistotonus under induktion, underhåll och återhämtning Yrsel, frossbryningar och köldkänsla under återhämtningsfasen
	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Postoperativ medvetslöshet
	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Ofrivilliga rörelser
<i>Hjärtat</i>	Vanliga ( $> 1/100, < 1/10$ )	Bradykardi <sup>(1)</sup> och takykardi under induktion
	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Lungödem
	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Hjärtarytm (5), hjärtsvikt <sup>(5), (7)</sup>

<i>Blodkärl</i>	Vanliga (> 1/100, <1/10)	Hypotoni <sup>(2)</sup>
	Mindre vanliga (>1/1000, <1/100)	Trombos och flebit
<i>Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum</i>	Vanliga (>1/100, <1/10)	Övergående apné, hosta och hicka under induktion
	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Andningsdepression (dosberoende)
<i>Magtarmkanalen</i>	Vanliga (> 1/100, <1/10)	Illamående och kräkningar under återhämtningsfasen
	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Pankreatit
<i>Lever och gallvägar</i>	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Hepatomegalii <sup>(5)</sup> Hepatit <sup>(11)</sup> , akut leversvikt <sup>(11)</sup>
<i>Muskuloskeletala systemet och bindväv</i>	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Rabdomyolys <sup>(3), (5)</sup>
<i>Reproduktionsorgan och bröstkörtel</i>	Ingen känd frekvens	Priapism
<i>Njurar och urinvägar</i>	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Missfärgning av urinen efter långvarig administrering
	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Njursvikt <sup>(5)</sup>
<i>Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället</i>	Mycket vanliga (≥ 1/10)	Lokal smärta efter induktion <sup>(4)</sup>
	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Vävnadsnekros <sup>(10)</sup> efter oavsiktlig extravaskulär administrering
	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	Lokal smärta och svullnad efter oavsiktlig extravaskulär administrering
<i>Undersökningar</i>	Ingen känd frekvens <sup>(9)</sup>	EKG av Brugada-typ <sup>(5), (6)</sup>
<i>Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer</i>	Mycket sällsynta (< 1/10 000)	Postoperativ feber

(1) Allvarlig bradykardi är sällsynt. Det har förekommit isolerade rapporter om progression till asystoli.

(2) Ibland kan hypotonin kräva användning av intravenösa vätskor och sänkning av administreringshastigheten av propofol.

(3) Mycket sällsynta rapporter om rabdomyolys har mottagits i fall där propofol har givits i doser över 4 mg/kg/h för sedering på IVA.

(4) Kan minimeras genom injektion i större arterier på underarmen eller i armbågsvecket. Den lokala smärtan kan också minimeras genom samtidig tillförsel av lidokain.

(5) Kombinationer av dessa biverkningar, rapporterade som ”propofolinfusionssyndrom”, kan ses hos allvarligt sjuka patienter som ofta har multipla riskfaktorer för utveckling av dessa biverkningar; se avsnitt 4.4.

(6) EKG av Brugada-typ – förhöjt ST-segment och inverterad T-våg i EKG.

(7) Snabbt progredierande hjärtsvikt (i vissa fall med fatal utgång) hos vuxna. Hjärtsvikten i sådana fall svarade vanligen inte på inotrop understödjande behandling.

(8) Missbruk och beroende av propofol, främst hos sjukvårdspersonal.

(9) Ingen känd frekvens, eftersom den inte kan beräknas från tillgängliga data från kliniska studier.

(10) Nekros har rapporterats i fall där vävnadsviabiliteten har varit nedsatt.

(11) Efter både lång- och kortvarig behandling och hos patienter utan underliggande riskfaktorer.

### Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nyttå-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## 4.9 Överdosering

Oavsiktlig överdosering orsakar sannolikt kardiorespiratorisk depression. Andningsdepression bör behandlas med artificiell ventilering med syre. Vid kardiovaskulär depression kan patientens huvud behöva sänkas och, om allvarligt, plasmaexpanders samt vasopressiva medel ges.

## 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

### 5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Anestetika, övriga allmänanestetika.

ATC-kod: N01AX10.

#### Verkningsmekanism/Farmakodynamisk effekt

Propofol (2,6-diisopropylfenol) är en kortverkande allmänanestetisk substans med ett snabbt tillslag.

Beroende på injektionshastigheten, är tiden till induktion av anestesi 30–40 sekunder. Efter injektion av en bolusdos är effekten kortvarig och varar cirka 4–6 minuter beroende på metabolism och elimination.

#### Klinisk effekt och säkerhet

Vid vanlig underhållsanestesi har inte någon signifikant ackumulering konstaterats varje sig vid upprepade injektioner eller vid infusionser med propofol. Patienten återfår snabbt medvetandet.

De fall av bradykardi och hypotension som rapporterats under induktion av anestesi kan ha orsakats av central vagoton effekt eller sympathikushämning. Vanligtvis normaliseras hemodynamiken vid underhåll av anestesi.

#### Pediatrisk population

Ett begränsat antal studier avseende duration av propofol vid anestesi av barn indikerar att säkerhet och effekt är oförändrat vid upp till 4 timmars användningstid. Litteraturreferenser avseende användning till barn påvisar användning under längre ingrepp utan förändring av säkerhet och effekt.

### 5.2 Farmakokinetiska egenskaper

#### Absorption

Proteinbindningsgraden för propofol är 98 %. Farmakokinetiken för propofol efter intravenös infusion beskrivs bäst som en trekompartmentsmodell.

#### Distribution/Metabolism/Eliminering

Propofol har en omfattande distribution och en snabb eliminationsfas (totalt clearance 1,5–2 liter per minut). Clearance sker genom metabolism. Metabolism sker i huvudsak i levern **där metabolismen är beroende av blodflödet**. Inaktiva konjugat av propofol och motsvarande kinol bildas som utsöndras i urinen.

Efter en singeldos på 3 mg/kg intravenöst, ökar propofolclearance/kg kroppsvikt med ålder enligt följande: medianen av clearance var betydligt lägre hos nyfödda < 1 månads ålder (n=25) (20 ml/kg/minut) jämfört med äldre barn (n=36, ålder 4 månader–7 år). Dessutom var den interindividuella variationen stor hos nyfödda (3,7–78 ml/kg/minut). Beroende på att denna begränsade information från kliniska försök tyder på en stor variation kan inga dosrekommendationer ges för denna åldersgrupp.

Medianen för clearance av propofol för äldre barn efter en singelbolusdos på 3 mg/kg var 37,5 ml/minut/kg (4–24 månader) (n=8), 38,7 ml/min/kg (11–43 månader) (n=6), 48 ml/minut/kg (1–3 år) (n=12), 28,2 ml/minut/kg (4–7 år) (n=10) att jämföra med 23,6 ml/minut/kg hos vuxna (n=6).

Administrering med TCI-system (Target Controled Infusion) rekommenderas inte för barn under 2 års ålder då endast begränsade data finns tillgängligt.

### **5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter**

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för mänskliga. Karcinogenitetsstudier har ej utförts. Teratogena effekter har inte observerats. Vid toleransstudier avseende lokal administrering sågs vävnadsskada kring injektionsstället efter intramuskulär injektion. Paravenös och subkutan injektion inducerade histologiska reaktioner vilka utmärktes av inflammatorisk infiltration och fokal fibros.

Publicerade djurstudier (inklusive studier i primater) med doser som resulterar i lätt till måttlig anestesi visar att användandet av anestesimedel under perioden då hjärnan har snabb tillväxt, eller under synaptogenes, resulterar i cellförlust under hjärnans utvecklingsperiod vilket kan associeras med långvariga kognitiva brister. Den kliniska betydelsen av dessa prekliniska fynd är inte klarlagd.

## **6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1 Förteckning över hjälpmän**

Sojaolja, raffinerad  
Medellångkedjiga triglycerider  
Renade äggfosfolipider  
Glycerol  
Oljesyra  
Natriumhydroxid  
Vatten för injektionsvätskor

### **6.2 Inkompatibiliteter**

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

Propolipid 20 mg/ml får inte blandas med andra läkemedel.

### **6.3 Hållbarhet**

Hållbarheten i obruten förpackning är 2 år.

Hållbarhet efter öppnandet: Efter öppnande måste produkten användas omedelbart.

Infusionssystem för administrering av outspädd Propolipid ska bytas ut efter 12 timmar.

Hållbarhet efter spädning: Produkten måste användas omedelbart efter spädning. Administreringen ska vara slutförd inom 6 timmar efter spädning.

### **6.4 Särskilda förvaringsanvisningar**

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

### **6.5 Förpackningstyp och innehåll**

#### **10 mg/ml**

10 eller 20 ml förfylld spruta (typ I-glas) med bromobutylhätta, bromobutylkolv och kolvstång av polypropen.

10 ml eller 20 ml förfylld spruta (cyklo-olefin-sampolymer) med bromobutylhätta, bromobutylkolv och kolvstång av polypropen.

50 ml förfylld spruta (cyklo-olefin-sampolymer) med bromobutylhätta, bromobutylkolv och kolvstång av polypropen.

Förpackning innehållande 5 glassprutor med 10 ml emulsion

Förpackning innehållande 6 plastsprutor med 10 ml emulsion

Förpackning innehållande 5 glassprutor med 20 ml emulsion

Förpackning innehållande 6 plastsprutor med 20 ml emulsion

Förpackning innehållande 1 plastspruta med 50 ml emulsion

#### **20 mg/ml**

50 ml förfylld spruta (cyklo-olefin-sampolymer) med bromobutylhätta, bromobutylkolv och kolvstång av polypropen.

Förpackning innehållande 1 plastspruta med 50 ml emulsion

### **6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering**

Propolipid 10 mg/ml ska inte blandas före administrering med andra injektions- eller infusionslösningar än glukos 50 mg/ml (5 %), natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) eller okonserverad lidokain 10 mg/ml (1 %), injektionslösning. Den maximala utspädningen får inte överstiga 1 del Propolipid 10 mg/ml med 4 delar glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (slutlig propofolkoncentration får inte underskrida 2 mg/ml). Blandningen ska beredas aseptiskt

(kontrollerade och validerade förhållanden) omedelbart före administrering och måste ges inom 6 timmar efter beredning.

Samtidig administrering av glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller natriumklorid 1,8 mg/ml (0,18 %) injektionsvätska, lösning och glukos 40 mg/ml (4 %) injektionsvätska, lösning med Propolipid kan ske via en Y-koppling nära injektionsstället.

Propolipid 20 mg/ml får inte blandas med andra lösningar för infusion eller injektion.

## **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Fresenius Kabi AB  
SE-751 74 Uppsala  
Sverige

## **8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

10 mg/ml: 30192  
20 mg/ml: 30193

## **9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

Datum för det första godkännandet: 10.6.2013  
Datum för den senaste förnyelsen: 1.3.2018

## **10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

31.7.2024