

PAKKAUSSELOSTE

Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio naudalle ja lampaalle

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstr. 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville

Ranska

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio, naudalle ja lampaalle
Deltametriini

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio on luonnonvalkoinen tai vaalean ruskea kertavalelususpensio.
1 ml suspensiota sisältää:

Vaikuttava aine:

Deltametriini 7,50 mg

Säilöntäaine:

Formaldehydiliuos 35 % 0,18 mg

4. KÄYTTÖAIHEET

Nauta:

Seuraavien ulkoloisten aiheuttamien tartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy:

- Täi (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*)
- Väive (*Bovicola bovis*)

Seuraavien kärpästen vähentäminen eläimissä:

- *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.
- *Musca* spp., *Hippobosca* spp.

Lammas:

Seuraavien ulkoloisten aiheuttamien tartuntojen hoito ja ennaltaehkäisy:

- Täi (*Linognathus ovillus*)

- Väive (*Bovicola ovis*)
- Lampaan täikärpänen (*Melophagus ovinus*)

Resistenssin välttämiseksi Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensiota tulisi käyttää ainoastaan, mikäli paikallisten kärpäslajien herkkyys vaikuttavalle aineelle on varmistettu.

5. VASTA-AIHEET

Resistenssi (vastustuskyky) pyretroideille.

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineille.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Deltametriini on paikallisesti ärsyttävä silmille ja limakalvoille.

Ihon ärsytystä (kuten punoitus ja kutina) ja siihen liittyvää levottomuutta, hyperaktiivisuutta, ahdistuneisuutta tai yliherkkyyttä sekä pään ravistelua ja hännällä huitomista on havaittu hyvin harvoin annostelun jälkeen.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta, lammas.

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Kertavaleluun. Ravista hyvin ennen käyttöä.

Annostele valmiste tasaisesti selkärankaan pitkin niskasta hännäntyveen asti.

Kärpäset:

Nauta

100 elopainokiloa asti:	10 ml Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensiota
100 - 300 elopainokiloa:	20 ml Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensiota
Yli 300 elopainokiloa:	30 ml Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensiota

Täit ja väiveet sekä lampaan täikärpänen:

Nauta, Lammas

10 ml Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensiota / eläin

Lampaita käsiteltäessä tulee ottaa huomioon:

- käsittele pian keritsemisen jälkeen (eläimet lyhyessä villassa)

- pidä kerityt eläimet erossa keritsemättömistä
- keritse ja käsittele uuhet 4-6 viikkoa ennen synnytystä

Valmiste annostellaan kertahoitona.

Käsittely kärpäsiä vastaan voidaan kuitenkin uusaa joka 6-10 viikko, riippuen tartunnan asteesta.

Karkotevaikutuksen kesto kärpäsiä (*Musca* spp.) vastaan vaihtelee.

Sääolosuhteiden vaikutusta valmisteen tehon keston ei ole tutkittu.

9. ANNOSTUSOHJEET

Valmistetta ei tulisi levittää silmien tai limakalvojen läheisyyteen.

10. VAROAIKA

Nauta:

Teurastus: 18 vrk

Maito: nolla vrk

Lammas:

Teurastus: 1 vrk

Maito: 12 tuntia

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kesto aika: 30 viikkoa.

Ei saa käyttää etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Älä säilytä kylmässä, ei saa jäätyä. Suojeltava kylmyydeltä.

12. ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Eläimiä ei tulisi hoitaa helleaaltojen aikana (eläimet saattavat nuolla valmistetta pois).

Samaan ryhmään kuuluvien ulkoloislääkkeiden liian tiheää, toistuvaa ja pitkäaikaista käyttöä tulisi välttää, koska se lisää resistenssin kehittymisriskiä, jonka seurauksena saattaa olla hoidon tehon menettäminen.

Butox vet 7,6 mg/ml kertavaleluspensio on kärpäskarkote, joka vähentää kärpästen määrää eläimillä, mutta se ei vähennä kärpäsiä maatilalla

Resistenssiä deltametriinille on raportoitu nautojen kärpäksillä ja lampaiden täillä. Valmisteen käytön tulisi sen takia perustua paikalliseen (alueelliseen ja tilatason) epidemiologiseen tietoon kärpästen herkkyydestä.

Resistenssi *Musca*-suvun kärpäksissä on mahdollinen. Butox vet 7,5 mg/ml kertavaleluspensiota tulisi käyttää kärpästen torjuntaan ensisijaisten toimenpiteiden, kuten hygienian parantamisen ja ei-kemiallisten aineiden käytön, kanssa. Tämän lisäksi tulisi harkita eri ryhmien vaikuttavia aineita sisältävien hyönteismyrkkyjen vuorottaista käyttöä hävittämisohjelman perustana. Vaikuttavan aineen valinnan tulisi ihannetilanteessa pohjautua herkkyysmäärittelyyn. Kysy lisätietoja eläinlääkäriltäsi.

Butox vet 7,5 mg/ml kertavaleluspensiota tulisi annostella ainoastaan terveelle iholle, koska laajojen ihovaurioiden alueella tapahtuva imeytyminen voi johtaa myrkytysoireisiin. Hoidon jälkeistä

paikallisärsytyistä voi esiintyä, koska iho voi olla jo loistartunnan vaurioittama.
Eri ulkoloisten aiheuttaman sekartartunnan olemassaolo on selvitettävä ennen hoitoa.
Deltametriini on myrkyllistä mehiläisille. Sitä ei saa joutua vesistöihin, koska se on myrkyllistä myös kaloille ja muille vesieläimille.
Käyttöaiheisiin kuulumattomien ulkoloisten aiheuttaman sekartartunnan mahdollisuus tulee selvittää ennen hoitoa.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Ärsytys- ja herkistymisoireita sekä hermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia voi esiintyä.
Vältä iho- ja limakalvokontaktia sekä valmisteen joutumista silmiin tai suuhun.
Käytä suojakäsineitä.
Vaihda valmisteen likaamat vaatteet ja pese ne ennen uutta käyttöä.
Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpension käytön aikana ei saa syödä, juoda, eikä tupakoida.
Vahingossa iholle joutunut liuos tulee pestä välittömästi pois vedellä ja saippualla.
Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä.
Henkilöiden jotka ovat yliherkkiä Butox vet 7,5 mg/ml -valmisteele tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.
Jos tunnet pahoinvointia Butox vet 7,5 mg/ml käytön jälkeen, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Deltametriini on erittäin myrkyllistä lannassa eläville hyönteisille. Mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset on siksi otettava huomioon peräkkäisissä annosteluissa, esim. vain yksi hoitokerta laidunta kohden samana vuotena.

Tiineys:

Voidaan käyttää tiineyden aikana.

Laktaatio:

Voidaan käyttää laktation aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Deltametriinin myrkyllisyys lisääntyy yhteiskäytössä organofosfaattien kanssa. Tästä syystä Butox vet kertavalelususpensiota ei tulisi käyttää yhdessä niitä sisältävien valmisteiden kanssa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Deltametriinillä on hyvin alhainen myrkyllisyys, kun sitä annostellaan ulkoisesti vesisuspensiona. Tästä syystä akuuttia myrkyllisyyttä ei ole odotettavissa ihon läpi tapahtuvan imeytymisen kautta.
Haittavaikutuksia naudalla ei ole havaittu käytettäessä kolminkertaista ohjeannosta. Suun kautta tapahtuva suuri vahinkoaltistus tai laajojen ihovaurioiden olemassaolo annosteluhetkellä voi aiheuttaa myrkytysoireita, kuten lisääntynyt syljeneritys, kiihtymystila, kouristukset ja tuntohäiriöt. Myrkytyksen hoito on oireenmukaista.

Yhteensopimattomuudet:

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle. Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja ja vesistöjen muita vesieläviä.


14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

29.1.2015


15. MUUT TIEDOT

Pakkauskoot: 250 ml, 1000 ml pullo, johon on yhdistetty annossäiliö ja kierrettävä annostelukärki ja 2500 ml pullo, pakattu letkulla pulloon yhdistettävän automaattiruiskun kanssa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Annostelijan käyttö (koskee ainoastaan 250 ml ja 1000 ml pakkausta):



- 1) Irrota annossäiliön korkki nro 2 Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio pullosta. Pidä korkki nro 1 suljettuna koko ajan.



2) Kierrä annostelukärki annossäiliöön.



3) Täytä annossäiliö painamalla pulloa.




4) Pidä pullosta kiinni annostelukärjen puoleiselta sivulta. Käännettyäsi pullon ylösalaisin ja annostelun aikana varmistu, että annostelukärki pysyy annossäiliön alapuolella (katso ylläoleva kuva). Annostele valmiste eläimen selkärankaa pitkin niskasta hännäntyveen asti painamalla kevyesti pullosta. (Toista toimenpide karpästen torjuntaan eläimille, jotka painavat enemmän kuin 100 kg jotka tarvitsevat suuremman kuin 10 ml annoksen).

Alue, jolle Butox vet 7,5 mg/ml suspensio levitetään



5) Varmistu, että täysi annos on levitetty eläimen selkään.



6) Kun kaikki eläimet on hoidettu, irrota annostelukärki ennen pullon sulkemista korkilla.

BIPACKSEDEL
Butox vet 7,5 mg/ml pour-on suspension

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstr. 35
5831 AN Boxmeer
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Butox vet 7,5 mg/ml, pour-on, suspension för nötkreatur och får
Deltametrin

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Butox vet 7,5 mg/ml är en benvit till blekbrun pour-on, suspension.
1 ml suspension innehåller:

Aktiv substans:
Deltametrin 7,50 mg

Konserveringsmedel:
Formaldehydlösning 35% 0,18 mg

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)

Nötkreatur:

För behandling och förebyggande av angrepp av följande ektoparasiter:

- sugande löss (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*)
- bitande löss (*Bovicola bovis*)

För kontroll av:

- stickflugor (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.), husflugor (*Musca* spp.) och lusflugor *Hippobosca* spp.)

Får:

För behandling och förebyggande av angrepp av följande ektoparasiter:

- sugande löss (*Linognathus ovillus*)
- bitande löss (*Bovicola ovis*)
- fårlöss (*Melophagus ovinus*)

För att undvika resistens, skall Butox vet 7,5 mg/ml pour-on användas endast ifall känsligheten för den aktiva substansen på de lokala flugarterna har försäkrats.

5. KONTRAINDIKATIONER

Resistens mot pyretroider.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

6. BIVERKNINGAR

Deltametrin är lokalt irriterande för ögon och slemhinnor.

Hudirritation (såsom erytem eller klåda) tillsammans med rastlöshet, hyperaktivitet, ångest eller överkänslighet och huvudskakning samt svansviftning har observerats i mycket sällsynta fall efter behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)
- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)
- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nötkreatur och får.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För pour-on användning. Skaka väl före användning.

Håll läkemedlet jämnt längs djurets ryggrad, från nackbasen till svansen.

Flugor:

Nötkreatur

Upp till 100 kg kroppsvikt	10 ml Butox vet 7,5 mg/ml pour-on
100 till 300 kg kroppsvikt	20 ml Butox vet 7,5 mg/ml pour-on
Mer än 300 kg kroppsvikt	30 ml Butox vet 7,5 mg/ml pour-on

Stickande och bitande loss samt fårlöss

Nötkreatur och får

10 ml Butox vet 7,5 mg/ml pour-on per djur

Följande punkter skall beaktas före behandling av får:

- behandla kort efter klippning (djur med kort ull)

- håll klippta djur avskilda från icke-klippta djur
- klipp och behandla tackor 4-6 veckor före förlossning

Detta veterinärmedicinska läkemedel ges som engångsdos. Dock, kan behandling mot flugor upprepas var 6:e till var 10:e vecka beroende på graden av angrepp. Varaktigheten för kontroll av *Musca* spp kan variera.

Vädrets påverkan på effektens varaktighet har inte undersökts.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Får ej användas på eller vid djurets ögon eller slemhinnor.

10. KARENSTID

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter:	18 dagar
Mjolk:	Noll dagar

Får:

Kött och slaktbiprodukter:	1 dag
Mjolk:	12 timmar

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 30 veckor

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter ”Exp”.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Skyddas mot frost.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Djur skall inte behandlas under värmeböljor (p.g.a. risken för att djuren slickar bort produkten).

Försiktighet skall iakttas för att undvika alltför frekvent och upprepad användning av insektsmedel ur samma klass över en längre period; eftersom det kan öka risken för att utveckla resistens och därmed leda till att behandlingen blir ineffektiv.

Butox är ett medel för att kontrollera flugor och som minskar antalet flugor som sitter på djuret, men det kan inte förväntas få alla flugor på en gård att försvinna.

Fall av resistens mot deltametrin har rapporterats hos stickflugor och husflugor hos nötkreatur och hos löss hos får. Därför skall denna produkt användas baserat på lokal (regional, besättning) epidemiologisk information om känslighet hos stickflugor och husflugor.

Resistens hos husflugor (*Musca* spp.) är möjlig. Butox vet 7,5 mg/ml pour-on bör användas i sammanhang där förbättring av hygien och användning av icke-kemikaliska medel är de huvudsakliga metoderna för flugbekämpning. När man planerar behandlingen, bör man dessutom tänka på att använda insektsmedel som innehåller aktiva substanser ur olika grupper växelvis. Valet av den aktiva substansen bör i idealfall basera sig på känslighetstester. Kontakta din veterinär för mer information.

Butox vet 7,5 mg/ml pour-on skall bara användas på oskadad hud eftersom toxicitet är möjligt vid absorption från stora hudskador. Dock kan tecken på lokal irritation förekomma efter behandling eftersom huden redan kan vara påverkad av insektsangreppet. Förekomst av blandat insektsangrepp skall fastställas före användning.

Deltametrin är toxiskt för bin och får inte komma i kontakt med grundvatten eftersom det är toxiskt för fisk och andra vattenlevande organismer.

Förekomst av blandat angrepp av insekter, som inte omfattas av användningsområdet för detta läkemedel, skall fastställas före behandling.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

Irritation, ökad känslighet och biverkningar på nervsystemet kan förekomma. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor samt upptag via munnen.

Använd skyddshandskar.

Byt svårt kontaminerade kläder och tvätta dem före återanvändning.

Ät, drick eller rök inte under tiden som Butox vet 7,5 mg/ml pour-on används.

Vid oavsiktligt spill på huden tvätta de exponerade delarna med rikligt med tvål och vatten.

Vid oavsiktlig kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Personer som är överkänsliga för Butox vet. 7,5 mg/ml pour-on skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Om du känner dig dålig efter att ha använt Butox vet 7,5 mg/ml pour-on, uppsök omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Deltametrin är mycket toxisk för dyngbaggar. Potentiella långtidseffekter skall övervägas vid upprepade behandlingar t.ex. begränsning till engångsbehandling på samma betesmark varje säsong.

Dräktighet:

Kan användas under dräktighet.

Laktation:

Kan användas under laktation.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Toxiciteten hos deltametrin ökar vid kombination med organiska fosforsubstanser. Därför rekommenderas att inte använda sådana produkter tillsammans med Butox vet 7,5 mg/ml pour-on.

Överdoser (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Deltametrin har mycket låg toxicitet när det appliceras lokalt på huden som vattensuspension. Därför förväntas inte akut toxicitet genom upptag via huden uppträda.

Överdoser på tre gånger den rekommenderade dosen framkallade inga biverkningar hos nötkreatur.

Ett oavsiktligt oralt intag av en större mängd eller förekomst av utbredda hudskador kan leda till tecken på toxicitet såsom salivering, upphetsning, rytmiska muskelryckningar och parestesi. Veterinär bör då konsulteras. Behandlingen är symptomatisk och understödande.

Blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Butox vet 7,5 mg/ml pour-on får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

29.1.2015


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

250 ml och 1000 ml HDPE-flaska med en anslutningsbar applikator.

2500 ml HDPE-flaska förpackad med en doseringspistol som kopplas till flaskan med en slang.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Användning av doseringssystemet (endast för 250 ml och 1000 ml förpackningar)




1) Tag bort lock nummer 2 från doseringsbehållaren på Butox vet 7,5 mg/ml pour-on flaskan. Lock nummer 1 skall vara påskruvat hela tiden.



2) Fäst applikatoren på dosbehållaren.



3) Fyll dosbehållaren genom att klämma åt flaskan.




4) Håll om flaskan på applikatornsida. Säkerställ att applikatorn är under doseringsbehållaren efter att flaskan vänts upp och ner samt under applicering (se bild ovan). Applicera dosen genom att hålla den längs djurets ryggrad, från nackbasen till svansen, genom att försiktigt trycka lätt på flaskan. (Upprepa proceduren för att behandla flugor på djur som väger över 100 kg och som behöver mer än en 10 ml dos.)

Appliceringsområde för Butox vet 7,5 mg/ml pour-on.



5) Säkerställ att hela dosen har applicerats på djurets rygg.



6) När alla djur har behandlats tag av applikatorn och skruva tillbaka locket på flaskan.