

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE

Furovet vet 20 mg ja 40 mg tabletit

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Lelypharma B.V.

Zuiveringsweg 42

8243 PZ Lelystad

Alankomaat

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Furovet vet 20 mg ja 40 mg tabletit

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi 20 mg tabletti sisältää 20 mg furosemidia ja 180 mg apuaineita. Yksi 40 mg tabletti sisältää 40 mg furosemidia ja 160 mg apuaineita. Tablettiin on painettu merkintä ”4”.

4. KÄYTTÖAIHEET

Valmisteen sisältämä furosemidi on diureetti eli lääke, jota käytetään nesteen poistamiseen koiran elimistöstä. Tavallisin käyttötarkoitus on sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminnan vuoksi elimistöön kertyvän nesteen poistaminen.

5. VASTA-AIHEET

Jos koirallasi on munuaisaltaan tulehdus, virtsaamattomuutta, kaliumin tai natriumin vaje tai vaikea maksavika, lääkkeen käyttöä ei suositella. Käyttöä tulee välttää, jos koira on yliherkkä furosemidille tai sulfonamidi-bakteerilääkkeille. Valmistetta ei tule antaa alle 4 kg koirille, koska tabletin vahvuuden vuoksi riittävän tarkka annostelu ei ole enää mahdollista.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Pitkäaikaiskäyttö tai liian suuri annos saattavat aiheuttaa neste- ja suolatasapainon häiriöitä. Niiden oireita ovat lihasheikkous, oksentelu, halvausoireet, ummetus, ilmavaivat, sairaalloinen ruokahalu tai jano sekä sydämen rytmihäiriöt.

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi

7. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira.

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Tabletit annetaan suun kautta syvälle koiran nieluun tai murskattuna ruuan joukossa. Tabletti on tarvittaessa helppo jakaa neljään osaan. Tabletti jakautuu neljään osaan, kun asetat sen jakourre alaspäin kovaa pintaa vasten ja painat keskeltä sormella kevyesti.

9. ANNOSTUSOHJEET

Aloitusannos on yleensä 1-5 mg/kg 1-2 kertaa päivässä. Eläinlääkäri säätää jatkohoitoannoksen sopivalle tasolle koirasi oireiden ja mahdollisen muun lääkityksen mukaan. Usein riittävä jatkohoitoannos on 1-2 mg/kg 1-2 kertaa päivässä. Valmistetta ei tule antaa alle 4 kg koirille, koska tabletin vahvuuden vuoksi riittävän tarkka annostelu ei ole enää mahdollista.

10. VAROAIKA (VAROAJAT)

Ei oleellinen.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa valolta suojassa.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu pahvikotelossa ja läppäpainopakkauksessa merkinnän EXP jälkeen.

12. ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Riittävä kaliumin saanti tulee turvata antamalla kaliumpitoista ruokaa.

Pidä huoli siitä, että eläinlääkärisi on selvillä kaikista koiran lääkityksistä. Furosemidin pitkäaikaiskäyttö vähentää kaliumin ja magnesiumin pitoisuuksia elimistössä. Tällöin joidenkin sydänlääkkeiden, esimerkiksi digitaalisen myrkyllisyys lisääntyy. Kaliumhukka saattaa pahentua, jos koira saa furosemidilääkityksen aikana ummetuslääkettä tai kortikosteroideja. Jos koirasi saa muuta lääkitystä sydämen vajaatoimintaan, eläinlääkäri määrää furosemidiannoksen muuhun lääkitykseen sopivaksi. Älä muuta lääkkeiden annoksia tai aloita uutta lääkitystä keskustelematta ensin eläinlääkäriin kanssa. Tulehduskipulääkkeet voivat heikentää furosemidin tehoa. Sulfonamidi-bakteerilääkkeille yliherkät koirat voivat saada allergiaoireita furosemidista.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Pese kädet lääkkeen annostelun jälkeen.

Tiineys ja imetys:

Valmistetta ei suositella käytettäväksi kantavilla eikä imettävillä nartuilla.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.9.2020

15. MUUT TIEDOT

Lisätietoja tästä valmisteesta saa myyntiluvanhaltijan paikalliselta edustajalta

Vetcare Oy
PL 99
24101 SALO

BIPACKSEDEL

Furovet vet 20 mg och 40 mg tabletter

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetcare Oy, PB 99, 24101 Salo

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:

Lelypharma B.V.
Zuiveringsweg 42
8243 PZ Lelystad
Nederländerna

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Furovet vet 20 mg och 40 mg tabletter

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En 20 mg tablett innehåller 20 mg furosemid och 180 mg hjälpämnen.

En 40 mg tablett innehåller 40 mg furosemid och 160 mg hjälpämnen. På 40 mg tabletten har tryckts märkning ”4”.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)

Furosemid, som preparatet innehåller, är ett diuretikum, med andra ord en medicin som används för att avlägsna vätska från hundens kropp. Den vanligaste orsaken för användning är att avlägsna den vätska som har samlats i kroppen på grund av hjärt-, lever- eller njursvikt.

5. KONTRAINDIKATIONER

Om din hund har njurbäckensinflammation, ingen urinavsöndring, brist på kalium eller natrium eller svår leversvikt rekommenderas inte användning av medicinen. Användning bör undvikas om hunden är överkänslig mot furosemid eller sulfonamid-bakteriemediciner. Åt hundar som väger under 4 kg bör preparatet inte användas, eftersom tillräckligt noggrann dosering inte längre är möjlig på grund av tablettens styrka.

6. BIVERKNINGAR

Långvarig användning eller för stor dos kan förorsaka rubbningar i vätske- och saltbalansen. Symptom på detta är muskelsvaghet, kräkningar, förlamningssymptom, förstoppning, luftbesvär, onormal matlust eller törst samt störningar i hjärtrytmen.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÅG(AR)

Tabletterna ges via munnen djupt ned i hundens svalg eller krossade utblandat i mat.

Tabletterna är lätta att vid behov dela i fyra delar. Tabletten faller i fyra delar då man placerar den på ett hårt underlag med den kryssformade brytskåran nedåt och trycker lätt på tablettens mitt med ett finger.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Initialdosen är i allmänhet 1-5 mg/kg 1-2 gånger om dagen. Veterinären justerar den fortsatta dosen till en lämplig nivå för din hund i enlighet med hundens symptom eller möjlig övrig medicinering. Ofta är en tillräcklig fortsatt dos 1-2 mg/kg 1-2 gånger i dagen. Åt hundar som väger under 4 kg bör preparatet inte användas, eftersom tillräckligt noggrann dosering inte längre är möjlig på grund av tablettens styrka.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara tabletterna i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och pappkartongen efter EXP

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Tillräcklig tillförsel av kalium bör säkras genom att utfodra med kaliumhaltigt foder.

Se till att din veterinär känner till alla mediciner som hunden ordinerats. Långvarig användning av furosemid minskar på kroppens kalium- och magnesiumhalter. Härvid kan vissa hjärtmedicinerna t.ex. digitalis giftiga verkan öka. Kaliumförlusten kan bli värre om hunden under furosemidmedicineringen får mediciner mot förstoppning eller kortikosteroider. Om din hund får någon annan medicinering mot hjärtsvikt bestämmer veterinären doseringen för furosemid så att den passar ihop med den övriga medicineringen. Ändra inte på medicinernas dosering eller påbörja en ny medicinering innan du har diskuterat med din veterinär. Inflammations- och smärtstillande mediciner kan hämma furosemidets verkan. Hundar som är överkänsliga mot sulfonamid-bakteriemediciner kan få allergiska symptom av furosemid.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Tvätta händerna efter medicinens dosering.

Dräktighet och digivning:

Preparatet rekommenderas inte att användas på dräktiga och digivande hondjur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

10.9.2020

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

Vetcare Oy
PB 99
24101 SALO