

Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

Omnic Ocas 0,4 mg depottabletti
tamsulosiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Omnic Ocas on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Omnic Ocas -valmistetta
3. Miten Omnic Ocas -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Omnic Ocas -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Omnic Ocas on ja mielin sitä käytetään

Omnic Ocas-valmisteen vaikuttava aine on alfa₁-reseptorisalpaaja, joka vähentää eturauhasen ja virtsaputken lihasten supistumista. Tällöin virtsan kulku virtsaputken läpi ja virtsaaminen helpottuvat.

Omnic Ocas -depottabletteja käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon.

Tamsulosiinia, jota Omnic Ocas sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkikenkilökunnalta tai multa terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Omnic Ocas -valmistetta

Älä käytä valmisteita

- jos olet allerginen tamsulosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkyys voi ilmetä äkillisenä pehmytkudosten (esim. nielun tai kielen) turvotuksena, hengitysvaikeuksina ja/tai kutinana ja ihottumana (angioedeema).
- jos sinulla on ilmennyt verenpaineen alenemisesta johtuvaa huimausta esim. makuulta istumaan tai seisomaan noustaessa
- jos sinulla on todettu vaikea maksan vajaatoiminta
- jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä, jotka saattavat heikentää tamsulosiinin poistumista elimistöstä (esim. ketokonatsoli). Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkikenkilökunnalta.

Varoitukset ja varotoimet

- Säännölliset lääkärintarkastukset ovat tarpeen hoidon tehon toteamiseksi
- Omnic Ocas -valmisteen, kuten muidenkin tämäntyyppisten valmisteiden, käyttö saattaa harvoin aiheuttaa pyörtymisen. Huimaus- tai heikotusoireiden ilmetessä on hyvä käydä istumaan tai makuulle, kunnes oireet helpottavat.
- Kerro lääkärsille, jos sinulla on todettu vaikea munuaisten vajaatoiminta.
- Jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän linssin samentuman (kaihi) tai kohonneen silmänpaineen (glaukooma) vuoksi, kerro silmälääkärsille, jos parhaillaan käytät tai olet käytänyt Omnic Ocas -valmistetta. Lääkäriasi ottaa tämän huomioon lääkityksessäsi ja

käytettävässä leikkaustekniikassa. Kysy lääkäriltäsi, onko lääkehoidon keskeyttäminen leikkauksen ajaksi tarpeen.

Lapset

Älä anna täta valmistetta alle 18-vuotiaille lapsille, sillä se ei tehoa tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Omnic Ocas

Muut lääkevalmisteet saattavat muuttaa Omnic Ocasin käyttäytymistä elimistössäsi. Kerro lääkärille, jos käytät

- muita samaan lääkeryhmään kuuluvia valmisteita (alfa₁-reseptorisalpaajat). Näitä lääkkeitä käytetään yleensä kohonneen verenpaineen tai suurentuneen eturauhasen hoitoon.
- erektohäiriölääkeitä (sildenafili, tadalafili ja vardenafili)
- kihdin tai kivun hoitoon tarkoitettuja lääkeitä (diklofenaakki)
- veren hyytymistä ehkäiseviä lääkeitä (varfariini)
- erytromysiiniä tai klaritromysiiniä (antibiootteja)
- sienilääkeitä (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli)

Kerro lääkärille tai apteekkichenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkeitä.

Raskaus, imetyks ja sувунјаткамисkyky

Omnic Ocas -valmistetta ei ole tarkoitettu naisille.

Miehillä on todettu epänormaalia siemensyöksyä (ejakulaatiohäiriö), retrogradista siemensyöksyä (siemenneste ei poistu elimistöstä virsaputken kautta vaan kulkeutuu virtsarakkoon) ja puuttuvaa siemensyöksyä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Tähän mennessä ei ole tietoa valmisten vaikutuksesta autolla-ajo- tai koneiden käyttökykyyn. Mahdollisesta huimauksesta on syttä kuitenkin olla tietoinen.

3. Miten Omnic Ocas -valmistetta käytetään

Käytä täta lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkichenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tabletti päivässä, ja se voidaan ottaa ennen ateriaa tai sen jälkeen. Tabletti tulee niellä kokonaisena eikä sitä saa rikkoa tai pureskella.

Valmistetta ei tule antaa lapsille.

Jos otat enemmän valmistetta kuin sinun pitäisi

Valmisten yliannostus saattaa aiheuttaa verenpaineen laskua, sykkeen nopeutumista ja pyörtymisen tunnetta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohtdat ottaa Omnic Ocas -annoksen

Mikäli lääke on jänyt ottamatta, sen voi ottaa myöhemmin samana päivänä. Annos jätetään väliin, mikäli unohtaminen havaitaan vasta seuraavana päivänä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkichenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan näetä saa.

Lopeta Omnic Ocasin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin heti, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

Harvinaiset (yli yhdellä 10 000:sta mutta alle yhdellä 1 000 potilaasta):

- allergisesta reaktiosta (angioedeema) johtuen äkillistä käsienv, jalkojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta aiheuttaen hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa

Hyvin harvinaiset (vähemmän kuin yksi 10 000:ta tapausta kohti):

- priapismi (kivulias pitkittynyt erektilio)
- laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukkuolielinten alueella (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviontiin):

- vaikea ihottuma tai ihoauro, jossa esiintyy vaaleanpunaisia / punaisia, kalpeita, kutavia, hilseileviä tai nestetäytteisiä läiskiä ja joka tunnetaan monimuotoisena punavihoittumana (erythema multiforme)

Muutt haittavaikutukset

Yleiset (yli yhdellä 100:sta mutta alle yhdellä 10 potilaasta):

- huimaus
- epänormaali siemensyöksy mukaan lukien siemensyöksy virtsarakkoon (retrogradinen ejakulaatio) ja puuttuva siemensyöksy

Melko harvinaiset (yli yhdellä 1000:sta mutta alle yhdellä 100 potilaasta):

- päänsärky
- sydämentykytys
- huimaus varsinkin makuulta istumaan tai seisomaan noustaessa
- nuha
- ruoansulatuskanavan oireet (ummetus, ripuli, pahoinvoindi, oksentelu)
- allergiset ihoreaktiot (ihottuma, kutina, nokkosrokko)
- heikkouden tunne

Harvinaiset (yli yhdellä 10 000:sta mutta alle yhdellä 1 000 potilaasta):

- pyörtyminen

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviontiin):

- näön hämärtyminen
- näön heikkeneminen
- nenäverenvuoto (epistaksis)
- suun kuivuminen
- kesivä ihotulehdus exfolatiivinen dermatiitti)
- epätavallinen sydämen sykkeen epäsäännöllisyys (eteisväriä, rytmihäiriö, takykardia)
- hengenahdistus (dyspnea)

Jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän linssin samentuman (kaihi) tai kohonneen silmänpaineen (glaukooma) vuoksi ja parhaillaan käytät tai olet aiemmin käyttänyt tamsulosiinihydrokloridia, silmän mustuainen saattaa laajentua vain heikosti ja iiris (silmän värikalvo) saattaa muuttua veltoksi toimenpiteen aikana (ks. Varoitukset ja varotoimet).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
FI-00034 Fimea

5. Omnic Ocas-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tästä lääkettää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Omnic Ocas sisältää

- Vaikuttava aine on tamsulosiinihydrokloridi. Yksi depottabletti sisältää 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia.
- Muut aineet ovat makrogoli 7 000 000 (sisältää butyylhydroksitolueenia ja vedetöntä kolloidista piidioksidia), makrogoli 8000, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisten kuvauksia ja pakkauskoot

Omnic Ocas 0,4 mg depottabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, keltaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on n. 9 mm ja joissa on koodi "04".

Pakkauskoot: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 depottabettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Astellas Pharma a/s

Arne Jacobsens Allé 15

2300 Kööpenhamina S

Tanska

Valmistaja:

Delpharm Meppel B.V.

Hogemaat 2

7942 JG Meppel

Hollanti

Suomessa markkinoi:

Astellas Pharma

Puh. (09) 85606000

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 01.04.2024

Bipacksedel: Information till användaren

Omnic Ocas 0,4 mg de pottablett tamsulosinhydroklorid

Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Omnic Ocas är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Omnic Ocas
3. Hur du tar Omnic Ocas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Omnic Ocas ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Omnic Ocas är och vad det används för

Den verksamma substansen i Omnic Ocas är en alfa₁-receptorkrämare som relaxerar glatt muskulatur i prostata och urinrör. Därigenom kan urinen lättare passera varvid urineringen underlättas.

Omnic Ocas används för behandling av urineringsymtom orsakade av godartad förstoring av prostata.

Tamsulosin som finns i Omnic Ocas kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följd alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Omnic Ocas

Använd inte Omnic Ocas

- om du är allergisk mot tamsulosin eller något annat innehållsmätt i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Överkänsligheten kan framkomma som akut svullnad av mjuk vävnaden (t.ex. svalg eller tunga), som andningssvårigheter och/eller klåda och utslag (angioödem).
- om du lider av yrsel som orsakas av tillfälligt lågt blodtryck, t.ex. då du sätter dig eller stiger upp.
- om du lider av allvarlig leverinsufficiens.
- om du samtidigt använder läkemedel som fördröjer eliminering av tamsulosin från kroppen (t.ex. ketokonazol). Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Varningar och försiktighet

- Regelbundna medicinska kontroller bör göras under behandlingen för att kontrollera effekten av behandlingen.
- Användningen av Omnic Ocas kan sällan förorsaka yrsel, liksom med andra läkemedel av denna typ. Vid yrsel och förvirring är det rekommendabelt att sitta eller lägga sig.
- Berätta för läkaren om du lider av allvarlig njurinsufficiens.
- Om du ska genomgå ögonoperation på grund av grumling av linsen (katarakt) eller högt ögontryck (glaukom) bör du berätta för läkaren att du använder eller har använt Omnic Ocas, så att läkaren kan beakta det i medicineringen och i operationsteknik. Rådfråga läkaren om du borde avbryta tamsulosinbehandlingen under operation.

Barn

Ge inte denna medicin åt barn eller unga under 18 år, för den verkar inte på dessa.

Andra läkemedel och Omnic Ocas

Andra läkemedel kan påverka Omnic Ocas uppsträdande i kroppen. Tala om för din läkare, om du använder

- andra läkemedel som tillhör samma grupp (alfa₁-receptorblockerare); används vanligtvis för behandling av högt blodtryck eller förstorad prostata
- läkemedel som används för att uppnå eller underhålla erektil (sildenafil, tadalafil, vardenafil)
- läkemedel för behandling av gikt eller smärta (diklofenak)
- blodförtunningsmedel (warfarin)
- erytromycin eller klaritromycin (antibiotika)
- läkemedel för behandling av svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Omnic Ocas är inte avsedd för behandling av kvinnor.

Hos män har onormal sädesutstömnings (ejakulationsstörning), retrograd ejakulation (sädesvätskan lämnar inte kroppen via urinröret utan går istället in i urinblåsan) och avsaknad av ejakulation rapporterats.

Körförmåga och användning av maskiner

För närvarande finns ingenting som tyder på att Omnic Ocas påverkar vare sig bilkörsning eller annan verksamhet som kräver uppmärksamhet. Man bör dock vara medveten om att yrsel kan uppstå.

3. Hur du tar Omnic Ocas

Använd alltid Omnic Ocas enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett dagligen före eller efter måltiden. Tableten sväljs hel och får ej tuggas.

Om du har tagit för stor mängd av Omnic Ocas

Överdosen kan framkalla blodtrycksfall, hjärtklappning och yrsel.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av missstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Omnic Ocas

Om du glömt att ta Omnic Ocas tabletten, kan du ta den senare samma dag. Om du först nästa dag märker att du glömt att ta medicinen, fortsätter du behandlingen enligt den normala doseringsanvisningen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Omnic Ocas och kontakta omedelbart läkare ifall någon av följande biverkningar uppkommer:

Sällsynta (flera än en av 10 000 patienter och färre än en av 1 000 patienter):

- allergisk reaktion (angiödem) med svullnad av fötter, händer, läppar eller tunga och andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag

Mycket sällsynta (färre än en av 10 000 patienter):

- priapism (förlängd och smärtsam erekktion)
- hudutslag på stora områden med blåsor och avskalad hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsdelarna (Stevens-Johnson syndrom)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- svåra hudutslag eller hudskador i vilka det förekommer ljusröda/röda, bleka, kliande, fjällande eller vätskefylda fläckar som är kända under namnet mångskiftande hudrodnad (erythema multiforme)

Andra biverkningar

Vanliga (flera än en av 100 patienter och färre än en av 10 patienter):

- yrsel
- förändrad sädestömning inklusive sadesuttömning i urinblåsan (retrograd ejakulation) och avsaknad av ejakulation.

Mindre vanliga (flera än en av 1000 patienter och färre än en av 100 patienter):

- huvudvärk
- hjärtklappning
- yrsel när du sätter dig eller stiger upp
- snuva
- symptom i matsmältningskanalen (förstopning, diarré, illamående, kräkningar)
- allergiska hudreaktioner (hudutslag, klåda, nässelutslag)
- dåsighet

Sällsynta (flera än en av 10 000 patienter och färre än en av 1000 patienter):

- svimning

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- dimsyn
- nedsatt synförmåga
- näsblod (epistaxis)
- muntorrhet
- fjällande hudinflammation (exfoliativ dermatit)
- onormal oregehbunden puls (förmaksflimmer, hjärtrytmrubbning, takykardi)
- andnöd (dyspné)

Om du ska genomgå en ögonoperation på grund av grumling av linsen (katarrakt) eller högt ögontryck (glaukom) och redan tar eller tidigare har tagit tamsulosinhydroklorid, kan pupillen utvidgas dåligt och iris (den färgade delen av ögat) bli slapp under operationen (se även avsnitt 2, Varningar och försiktighet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur ska Omnic Ocas förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens inne håll och övriga upplysningar

Inne hållsde klaration

- Den aktiva substansen är tamsulosinhydroklorid. En depottablett innehåller 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är makrogol 7 000 000 (innehåller butylhydroxitoluen och vattenfri kolloidal kiseldioxid), makrogol 8000, magnesiumstearat, hypromellos, gul järnoxid (E172).

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Omnic Ocas 0,4 mg är rund, bikonvex, gul, filmdragerad tablett med ”04”; diameter ca 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 200 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Astellas Pharma a/s

Arne Jacobsens Allé 15

2300 Köpenhamn S

Danmark

Tillverkare:

Delpharm Meppel B.V.

Hogemaat 2

7942 JG Meppel

Holland

Marknadsförs i Finland av:

Astellas Pharma

Tel. (09) 85606000

Denna bipacksedel ändrade s senast 01.04.2024.