

Pakkausselostekirja: Tietoa potilaalle

XATRAL® CR 10 mg depottabletit

alfutsosiinhydrokloridi

Lue tämä pakkausselostekirja huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausselostekirja. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkienkilokunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilokunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostekirjassa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselostekirjassa kerrotaan:

1. Mitä Xatral CR on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xatral CR -depottabletteja
3. Miten Xatral CR -depottabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Xatral CR -depottablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Xatral CR on ja mihin sitä käytetään

Valmiste kuuluu alfa₁-reseptoreiden salpaajiin.

Valmistetta käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun toiminnallisten oireiden hoitoon sekä lisähoitona virtsarakon katetroinnin yhteydessä eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvässä virtsaamiskyvyttömyydessä (akuutti virtsaumi). Alfasalpaajat rentouttavat eturauhasen, virtsarakon ja virtsaputken lihaksia, jolloin virtsa pääsee virtaamaan rakosta helpommin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xatral CR -depottabletteja

Älä käytä Xatral CR -depottabletteja, jos

- olet allerginen alfutsosiimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- sinulla on maksan vajaatoiminta
- sinulla on taipumusta matalaan verenpaineeseen, joka ilmenee nostessassa seisomaan. Tällöin nouseminen seisomaan tai istumaan liian nopeasti voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymisen.
- käytät samanaikaisesti muita ns. alfasalpaajia

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilokunnan kanssa ennen kuin käytät Xatral CR -depottabletteja, jos

- sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
- sinulla on sydämen vajaatoiminta
- sinulla on rintakipua (angina pectoris)
- sinulla on ns. pitkä QT -oireyhtymä (poikkeama sydänsähkökäyrässä, EKG:ssa)

Joillakin potilailla, etenkin niillä, jotka käyttävät samanaikaisesti myös kohonneeseen verenpaineeseen tai rintakipun tarkoitettua lääkettä, voi ilmetä huimausta, heikotusta ja hikoilua muutaman tunnin kuluessa annoksen ottamisesta. Jos näin käy, pysy makuulla, kunnes oireet ovat hävinneet kokonaan. Kerro tapahtuneesta lääkärille, koska hän voi joutua muuttamaan annostasi.

Xatral CR -hoidon aikana voi ilmaantua pitkittyneitä, kivuliaita, seksuaaliseen aktiviteettiin liittymättömiä erektilioita (priapismia). Jos erektiliosi kestää yli 4 tuntia, ota heti yhteys lääkäriin. Jos priapismia ei hoideta, et jatkossa välttämättä kykene saavuttamaan erektiliota.

Muut lääkevalmisteet ja Xatral CR

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Xatral CR-depottabletteja jos käytät samanaikaisesti

- muita alfasalpaajia, kuten doksatsosiiinia, indoramiinia, pratsosiiinia, teratsosiiinia, tamsulosiiinia tai fenoksibentsamiinia

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, ennen kuin otat tästä lääkettä, jos

- alfasalpaajan (myös alfutsosiiinin) aiempi käyttö on alentanut verenpainettasi voimakkaasti. Esimerkkejä muista alfasalpaajista on lueteltu edeltävässä kappaleessa.
- käytät kohonneeseen verenpaineeseen tarkoitettua lääkettä, koska sinulla voi ilmetä huimausta, heikotusta tai hikoilua muutaman tunnin kuluessa tämän lääkkeen ottamisesta. Jos näin käy, pysy makuulla, kunnes oireet ovat hävinneet kokonaan. Kerro tapahtuneesta lääkärille, sillä hän voi joutua muuttamaan annostasi.
- käytät rintakipulääkettä (angina pectorikseen)
- käytät sienilääkettä (esim. itrakonatsolia)
- käytät HIV-lääkettä (esim. ritonaviria)
- käytät bakteerilääkettä (esim. klaritromysiiniä, telitromysiiniä)
- käytät masennuslääkettä (esim. nefatsodonia).
- käytät ketokonatsolitabletteja (käytetään Cushingin oireyhtymän eli liiallisien kortisolin tuotannon hoitoon).
-

Leikkaukset Xatral CR -hoidon aikana

- Jos sinulle suunnitellaan nukutuksen edellyttävä leikkausta, kerro lääkärille ennen leikkausta Xatral CR -hoidostasi. Tieto on tärkeä, koska verenpaineesi voi laskea leikkauksessa vaarallisella tavalla.
- Jos olet menossa kaihileikkaukseen (silmän mykiön samentuneisuuden vuoksi), kerro silmälääkärille ennen leikkausta tämänhetkisestä tai aiemmasta Xatral CR -hoidostasi. Tieto on tärkeä, koska Xatral CR voi aiheuttaa leikkauksessa ongelmia, jotka ovat kuitenkin hoidettavissa, kunhan silmäkirurgi on niihin ennalta varautunut.

Xatral CR ruoan ja juoman kanssa

Valmiste on otettava aterian jälkeen.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Tietoja valmisten vaikutuksesta ajokykyyn ei ole. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja heikotusta, voi ilmetä pääasiassa hoidon alussa. Tämä on syytä ottaa huomioon ajettaessa autolla ja käytettäessä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Xatral CR sisältää hydrattua risiiniöljyä

Valmiste sisältää hydrattua risiiniöljyä, joka voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

3. Miten Xatral CR -depottabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määritellyt tai apteekkienhenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Tavanomainen annos on yksi Xatral CR -depottabletti kerran päivässä aterian jälkeen.

Akuutti virtsaumpi

Lääkäri määräe sinulle Xatral CR -valmistetta siitä päivästä alkaen, kun katetri on asetettu. Sinun on jatkettava Xatral CR -depottablettien ottamista kerran päivässä aterian jälkeen lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö lapsille

Xatral CR -depottabletteja ei saa antaa lapsille.

Tabletit on nieltävä kokonaисina runsaan veden kanssa. Tabletteja ei saa purra rikki, murskata, hienontaa tai hakata jauheeksi.

Jos otat enemmän Xatral CR -depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800-147) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Xatral CR -annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Xatral CR -depottablettien käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käytöötä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä haittavaikutuksia (enintään 1 potilaalla 10:stä):

heikotus/heitehuimaus, päänsärky, ruoansulatuskanavan häiriöt, kuten pahoinvoimi, vatsakipu ja oksentelu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (enintään 1 potilaalla 100:sta):

verenpaineen lasku pystyn noustaessa, punastelu, sydämentykytys, rintakipu, kiertohuimaus, pyörtyminen, turvotus, ripuli, ihottuma, kutina ja nuha.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

nokkosihottuma, kasvojen, hulten, kielen ja nielun turvotus (angioedeema), rasitusrintakipu potilailla, joilla on sepelvaltimotauti, sekä pitkittynyt kivulias erektilio.

Maksahaittoja, eteisvärinää, tiettyjen verisolujen vähennemistä ja pupillin hermotusongelmia harmaakaihileikkauksen yhteydessä on raportoitu. Näiden haittojen yleisyyttä ei tunneta.

Haiittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Xatral CR -depottablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Xatral CR sisältää

- Vaikuttava aine on alfutsosiinihydrokloridi 10 mg/tabletti.
- Muut aineet ovat etyyliselluloosa, hydrattu risiumöljy, hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E 172), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, hydratoitu kolloidinen piidioksiidi ja mannitoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Xatral CR on pyöreä, kaksoiskupera ja kolmikerroksinen depottabletti, jossa on kahden keltaisen kerroksen välissä valkoinen kerros. Tabletin halkaisija on 8 mm.

Pakkauskoot: 10, 30 tai 90 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija

Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja

Sanofi Winthrop Industrie, BP 0166, Avenue Gustave Eiffel, 37001 Tours, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.7.2019

Bipackse del: Information till patienten

XATRAL® CR 10 mg depottabletter

alfuzosinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipackse del innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Xatral CR är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xatral CR
3. Hur du använder Xatral CR
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xatral CR ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xatral CR är och vad det används för

Preparatet är en alfa₁-receptorblockerare.

Preparatet används vid behandling av funktionella symptom på godartad prostataförstoring samt som komplement till kateter vid totalt stopp av urinflödet (akut urinretention) som beror på förstorad prostata. Alfablockerarna slappnar av musklerna i prostatan, urinblåsan och urinröret vilket underlättar urinflödet från blåsan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Xatral CR

Använd inte Xatral CR depottabletter om

- du är allergisk mot alfuzosin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- du har leversvikt
du får eller tidigare har fått blodtrycksfall när du ställer dig upp från sittande eller liggande ställning.
Tillståndet kan göra att du känner dig yr, svimfärdig eller svimmar när du reser dig upp eller sätter dig upp snabbt.
- du använder samtidigt andra s.k. alfablockerare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xatral CR om

- du har allvarlig njursvikt
- du har hjärtsvikt
- du har bröstmärter (angina pectoris)
- du har så kallad långt QT-syndrom (onormala avviker vid EKG)
-

Vissa patienter, särskilt de som även tar medel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstmärter (kärlkramp), kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter intag av dosen. Om

denna inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.

Förlängda och smärtsamma erektoner som inte är förknippade med sexuell aktivitet (priapism) kan förekomma under behandling med Xatral CR. Kontakta omedelbart läkare om du får en erekton som varar längre än 4 timmar. Om priapism inte behandlas är det möjligt att du inte kan få en erekton i fortsättningen.

Andra läkemedel och Xatral CR

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Xatral CR-depottabletter om du tar:

- andra alfablockerare, såsom doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin eller fenoxybenzamin.

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel om:

- du tidigare har drabbats av en kraftig sänkning av blodtrycket när du tagit andra alfa-blockerare (detta kan inkludera tidigare användning av alfuzosin). Se avsnittet direkt ovanför detta för exempel på andra alfa-blockerare.
- du tar något blodtryckssänkande läkemedel, eftersom du kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit detta läkemedel. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Tala med din läkare då dosen av ditt läkemedel kan behöva ändras.
- du tar läkemedel mot bröstmärter (kärlkramp)
- du tar läkemedel mot svampinfektioner (såsom itrakonazol)
- du tar läkemedel mot HIV (såsom ritonavir)
- du tar läkemedel mot bakteriella infektioner (såsom klaritromycin, telitromycin)
- du tar läkemedel för behandling av depression (såsom nefazodon).
- du använder ketokonazoltablett (används för behandling av Cushings syndrom, dvs. ökad kortisolproduktion).

Användningen av vissa andra läkemedel kräver uppmärksamhet då de används samtidigt med Xatral CR. Sådana läkemedel är:

- blodtrycksmediciner
- nitrater (används för behandling av bröstmärta)
- anestetika (bedövnings- eller narkosmedel). Samtidig användning av dessa med Xatral CR kan leda till förändringar i blodtrycket.

Operationer medan du tar Xatral CR

- Om du ska genomgå en operation som kräver narkos, tala om för läkaren att du tar Xatral CR före operationen. Detta beror på att det annars kan vara farligt eftersom detta läkemedel kan sänka ditt blodtryck.
- Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonläkare före operationen om att du tar eller har tagit Xatral CR. Detta för att användningen av Xatral CR kan orsaka komplikationer under operation vilka kan hanteras om ögonkirurgen är förberedd.

Xatral CR med mat och dryck

Preparatet ska tas efter måltid.

Körförstående och användning av maskiner

Det finns ingen information om läkemedlets verkan på förmågan att köra bil. Biverkningar, såsom yrsel och svaghet, kan förekomma särskilt i början av behandlingen. Detta bör beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Xatral CR innehåller hydrerad ricinolja

Preparatet innehåller hydrerad ricinolja som kan orsaka magbesvär och diarré.

3. Hur du använder Xatral CR

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Godartad prostataförstoring

Vanlig dos är en Xatral CR depottablett en gång om dagen efter måltid.

Akut urinstopp

Läkaren ordinarerar dig Xatral CR från den dag kataterna har placerats. Du bör fortsätta ta Xatral CR depottabletterna en gång om dagen efter måltid enligt läkarens ordination.

Användning för barn

Xatral CR depottabletter ska inte ges åt barn.

Tabletterna ska sväljas hela med en riklig mängd vatten. Tabletterna får inte tuggas sönder, krossas, finfördelas eller pulveriseras.

Om du har tagit för stor mängd av Xatral CR

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.0800-147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Xatral CR

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Xatral CR

Tala om för läkaren innan du slutar att använda Xatral CR.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter):

svaghet/svindel, huvudvärk, störningar i matsmältningskanalen, såsom illamående, magsmärter och kräkning.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):
blodtrycksfall när man reser sig upp till stående ställning, hudrodnad, hjärtklappling, bröstmärter, svindel, svimning, svullnad, diarré, hudutslag, klåda och snuva.

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter):
nässelutslag, svullet ansikte, svullna läppar, tunga och svalg (angioödem), belastningsutlöst bröstmärta hos patienter med kranskärlssjukdom, och långvarig smärtsam erekton.

Leverbiverkningar, förmaksflimmer, minskning av vissa blodkroppar och nervproblem i pupillen i samband med gråstarroperation har rapporterats. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

5. Hur Xatral CR ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på blisterskivan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kartongen och bipacksedeln kan återvinnas.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid 10 mg/tablett.
- Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hydrerad ricinolja, hypromellos, gul järnoxid (E 172), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, povidon, hydrerad kolloidal kiseldioxid och manitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xatral CR är en rund, bikonvex depottablett med tre skikt; ett vitt skikt mellan två gula skikt. Tablettens diameter är 8 mm.

Förpackningsstorlekar: 10, 30 eller 90 tablettar i blisterförpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi Oy, Norrskensgränden 1, 02100 Esbo

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie, BP 0166, Avenue Gustave Eiffel, 37001 Tours, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 9.7.2019

