

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

**Nimi, vahvuus ja lääkemuoto**

## **Loratadin HEXAL 10 mg tabletti**

Yksi tabletti sisältää:

**Vaikuttava aine:** Loratadiini 10 mg

**Apuaineet:** Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti

Loratadin HEXAL on valkoinen, soikea tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkintä LT 10 (LT |10).

**Myyntiluvan haltija:**

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

<b>Valmistaja:</b>	HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Tanska tai Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Saksa
--------------------	--

### **1. Mitä Loratadin HEXAL on ja mihin sitä käytetään**

Loratadin HEXAL on antihistamiini, jolla ei ole väsyttävää vaikutusta. Antihistamiinit lievittävät allergiaoireita, jotka johtuvat histamiinin vapautumisesta elimistään.

Loratadin HEXALia käytetään lievittämään allergiaoireita kuten aivastelua, nenän vuotamista tai kutinaa sekä silmien kirvelyä tai kutinaa.

Loratadin HEXALia käytetään myös nokkosihottuman (kroonisen urtikarian) oireiden hoitoon.

### **2. Ennen kuin käytät Loratadin HEXALia**

**Älä käytä Loratadin HEXALia**

- Jos olet allerginen loratadiinille tai jollekin valmisteen aineosalle.

**Ole erityisen varovainen Loratadin HEXALin suhteen**

- Jos sinulla on vaikeita maksavaivoja.

- Loratadin HEXAL -hoito on lopetettava vähintään 48 tuntia ennen allergiatestejä (ihotestit), koska antihistamiinit saattavat vaikuttaa ihotestien tuloksiin.

Kerro näistä seikoista lääkärillesi ennen Loratadin HEXAL -hoidon aloittamista.

### **Raskaus**

Älä käytä Loratadin HEXALia, jos olet raskaana. Kokemusta on rajallisesti – kysy neuvoa lääkäriltäsi. Jos tulet raskaaksi Loratadin HEXAL -hoidon aikana, lopeta lääkkeen käyttäminen ja ota yhteys lääkäriisi.

### **Imetys**

Älä käytä Loratadin HEXALia, jos imetät. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Loratadin HEXALilla ei ole mitään tai juuri mitään vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. On kuitenkin otettava huomioon, että hoidon aikana voi esiintyä huimausta.

### **Tärkeää tietoa joistakin Loratadin HEXALin aineista**

Jos lääkäri on todennut sinulla jonkin sokeri-intoleranssin, ota yhteys lääkäriisi ennen kuin käytät tätä lääkevalmistetta.

### **Muiden lääkkeiden käyttö**

Loratadin HEXALin ja muiden lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä ei ole ilmoitettu esiintyneen haittavaikutuksia. Ota kuitenkin yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät muita lääkkeitä – itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja rohdosvalmisteet mukaan lukien – samanaikaisesti tämän lääkkeen kanssa.

## **3. Miten Loratadin HEXALia käytetään**

### **AIKUISET JA YLI 12-VUOTIAAT LAPSET:**

1 tabletti (10 mg) kerran päivässä.

### **2–12-VUOTIAAT LAPSET:**

Lapsen paino yli 30 kg: 1 tabletti (10 mg) kerran päivässä.

Lapsen paino alle 30 kg: 10 mg tabletti ei sovi lapsille, jotka painavat alle 30 kg.

### **ALLE 2-VUOTIAAT LAPSET:**

Valmisteen käyttöä alle 2-vuotiaille lapsille ei suositella.

### **VAIKEA MAKSAN VAJAATOIMINTA:**

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen.

Juo lääkkeen kanssa lasillinen vettä. Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

### **Jos otat liikaa Loratadin HEXALia**

Jos epäilet ottaneesi liikaa Loratadin HEXALia, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

### **Jos unohdat ottaa Loratadin HEXALia**

Jos unohdat ottaa Loratadin HEXALia, jatka hoitoa normaaliannostuksen mukaisesti. – *Älä* ota kaksinkertaista annosta.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikilla lääkkeillä, Loratadin HEXALilla voi olla haittavaikutuksia.

*Yleiset (> 1/100, < 1/10):*

Väsymys, päänsärky, hermostuneisuus, uneliaisuus.

*Melko harvinaiset (> 1/1 000, < 1/100):*

Ruokahalun lisääntyminen, unettomuus.

*Erittäin harvinaiset (< 1/10 000):*

Äkillinen voimakas yliherkkyysreaktio, huimaus, sydämen nopealyöntisyys, pahoinvointi, suun kuivuminen, mahatulehdus, epänormaali maksan toiminta, ihottuma, hiustenlähtö.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

#### **5. Loratadin HEXALin säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville.

Älä käytä Loratadin HEXALia pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Tarkistettu viimeksi 27.09.2011

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

**Namn, styrka och läkemedelsform**

## **Loratadin HEXAL**

### **10 mg tablett**

En tablett innehåller:

**Det aktiva innehållsämnet är:** Loratadin 10 mg

**Hjälpämnen är:** Laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseloxid, magnesiumstearat

Loratadin HEXAL är en vit, avlång tablett med en brytskåra och koden LT 10 på ena sidan (LT | 10).

**Innehavare av försäljningstillstånd:**

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

<i>Tillverkare:</i>	HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark eller Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland
---------------------	---

## **1. Vad är Loratadin HEXAL och vad används det för?**

Loratadin HEXAL tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-sederande antihistaminer. Antihistaminer verkar genom att lindra allergiska symptom, vilka orsakas av att histaminer frigörs i kroppen.

Loratadin HEXAL används för lindring av allergiska symptom såsom nysningar, rinnande eller kliande näsa samt svidande och kliande ögon.

Loratadin HEXAL används också för behandling av symptom på nässelutslag (kronisk urtikaria).

## **2. Innan du använder Loratadin HEXAL**

**Använd inte Loratadin HEXAL**

- Om du är allergisk för loratadin eller något av de övriga innehållsämnen i preparatet.

### **Var särskilt försiktig med Loratadin HEXAL**

- Om du har allvarliga leverproblem.
- Behandlingen med Loratadin HEXAL ska avbrytas minst 48 timmar före hudtest, eftersom antihistaminer kan påverka resultaten av hudtesten.

Du ska meddela din läkare om detta innan behandlingen med Loratadin HEXAL inleds.

### **Graviditet**

Använd inte Loratadin HEXAL, om du är gravid. Det finns begränsad erfarenhet – rådfråga din läkare. Om du blir gravid under behandlingen med Loratadin HEXAL, ska du sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare.

### **Amning**

Använd inte Loratadin HEXAL, om du ammar. Rådfråga din läkare.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Loratadin HEXAL har ingen eller en liten effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Man ska dock beakta att yrsel kan förekomma under behandlingen.

### **Viktig information om några av innehållsämnen i Loratadin HEXAL**

Om din läkare har talat om för dig att du är överkänslig för en del socker, ska du kontakta din läkare innan du börjar använda detta läkemedel.

### **Användning av andra läkemedel**

Det finns inga rapporter om att biverkningar har inträffat när Loratadin HEXAL har tagits samtidigt med andra läkemedel. Du ska dock rådfråga din läkare innan du tar andra läkemedel – även receptfria sådana inklusive naturprodukter och naturmedel – tillsammans med detta läkemedel.

## **3. Hur du använder Loratadin HEXAL**

### **VUXNA OCH BARN ÖVER 12 ÅR:**

1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

### **BARN MELLAN 2 OCH 12 ÅR:**

Kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

Kroppsvikt under 30 kg: 10 mg tabletter lämpar sig inte för barn med en kroppsvikt under 30 kg.

### **BARN UNDER 2 ÅR:**

Användning hos barn under 2 år rekommenderas inte.

### **ALLVARLIG LEVERSVIKT:**

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Drick ett glas vatten tillsammans med din medicin. Tablettorna kan tas med eller utan mat.

### **Om du tar mer Loratadin HEXAL än vad du borde**

Om du har tagit för hög dos av Loratadin HEXAL, ska du kontakta din läkare eller sjukhuset.

### **Om du har glömt att ta Loratadin HEXAL**

Om du glömmet att ta Loratadin HEXAL, ska du bara fortsätta med din vanliga dos, ta *inte* en dubbel dos.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan Loratadin HEXAL ha biverkningar:

*Vanliga (> 1/100, < 1/10):*

Trötthet, huvudvärk, nervositet, sömnhet.

*Mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100):*

Ökad aptit, sömnlöshet.

*Mycket sällsynta (< 1/10 000):*

En akut stark överkänslighetsreaktion, yrsel, snabb puls, hjärklappningar, illamående, muntorrhet, magkatarr, onormal leverfunktion, utslag, håravfall.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.

## **5. Förvaring av Loratadin HEXAL**

Förvara Loratadin HEXAL utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Loratadin HEXAL efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Senast reviderad 27.09.2011