

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle

Moviprep Appelsiini, jauhe oraaliliuosta varten

makrogoli 3350, natriumsulfaatti (vedetön), natriumkloridi, kaliumkloridi, askorbiinihappo, natriumaskorbaatti

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Moviprep Appelsiini on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Moviprep Appelsiini -valmistetta
3. Miten Moviprep Appelsiini -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Moviprep Appelsiini -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Moviprep Appelsiini on ja mielin sitä käytetään

Moviprep Appelsiini on appelsiininmakuinen ulostuslääke, joka on pakattu neljään annospussiin. Näistä kaksi on isoja annospusseja (annospussi A) ja kaksi on pieniä annospusseja (annospussi B). Yhden hoitokerran aikana käytetään pakkauksen kaikki annospussit.

Moviprep Appelsiini on tarkoitettu aikuisille suoliston tyhjentämiseen valmistauduttaessa tutkimustoiimenpiteeseen.

Moviprep Appelsiini vaikuttaa tyhjentämällä suolen sisällön, joten ulosteesi muuttuu vetiseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Moviprep Appelsiini -valmisteita

Älä ota Moviprep Appelsiini -valmisteita:

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on suolentukkeuma
- jos suolesi seinämässä on reikä
- jos mahasi tyhjentymisen on häiriintynyt
- jos suolesi toiminta on lamaantunut (voi ilmetä usein vatsaontelon leikkauksen jälkeen)
- jos sinulla on fenyylketonuria, joka on perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei kykene pilkkomaan tiettyjä aminohappoja. Moviprep Appelsiini sisältää fenyylialaniinin lähteen.
- jos elimistösi ei tuota riittävästi glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasia
- jos sinulla on toksinen megakoolon (vakava paksusuolen tulehdus).

Varoitukset ja varotoimet

Sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota kohdassa 4 lueteltuihin haittavaikutuksiin, jos terveytesi on heikko tai sinulla on vakava sairaus. Jos asia huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Keskustele lääkärin tai apteekkien henkilökunnan kanssa ennen kuin otat Moviprep Appelsiini -valmistetta:

- jos nieltä juoma tai ruoka tai mahahapot pyrkivät nousemaan mahalaukusta ruokatorveen tai jos sinulla on nielemisvaikeuksia (katso myös Moviprep Appelsiini ruuan ja juoman kanssa)
- jos sinulla on munuaissairaus
- jos sinulla on sydämen vajaatoiminta tai sydänsairaus, mukaan lukien korkea verenpaine, epäsäännöllinen sydämensyke tai sydämentykytystä
- jos sinulla on kilpirauhassairaus
- jos sinulla on nestehukka
- jos sinulla on tulehdusellisen suolistosairauden (Crohnin taudin tai haavaisen kolitiitin) äkillinen pahaneminen

Moviprep Appelsiini -valmistetta ei pidä antaa ilman lääkärin valvontaa potilaalle, jonka tajunnantaso on alentunut.

Jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Moviprep Appelsiini-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Moviprep Appelsiini -valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Moviprep Appelsiini

Kerro lääkärille tai apteekkien henkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät suun kautta muita lääkkeitä (esim. ehkäisytabletteja), niitä ei pidä ottaa tuntia ennen Moviprep Appelsiini -valmisteen ottamista, sen ottamisen aikana tai tunti sen ottamisen jälkeen, koska ne voivat muutoin huuhtoutua pois ruoansulatuskanavasta eikä niiden vaikutus ole tällöin riittävä.

Moviprep Appelsiini ruuan ja juoman kanssa

Älä syö kiinteää ruokaa hoidon aloittamisen jälkeen ennen kuin toimenpide on tehty.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niillä niitä turvallisesti, on huomattava, että Moviprep Appelsiini -valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Juo runsaasti nesteitä, kun käytät Moviprep Appelsiini -valmistetta. Moviprep Appelsiini -liuos ei täytä normaalina nesteen tarvetta.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Moviprep Appelsiini -valmisteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tietoa, minkä vuoksi sitä tulee käyttää tällaisessa tilanteessa vain, jos lääkäri katsoo sen välttämättömäksi.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekrista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Moviprep Appelsiini ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Moviprep Appelsiini sisältää natriumia, kaliumia, fenyylialaniinin lähteet ja sokeria

Tämä lääkevalmiste sisältää 8,4 g natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per hoitokerta (hoitokerta käsittää 2 litraa Moviprep Appelsiini -valmistetta). Tämä vastaa 420 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausianksesta aikuiselle. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, on otettava tämä huomioon. Vain osa natriumista (enintään 2,6 g per hoitokerta) imeytyy.

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia 1,1 g per hoitokerta (hoitokerta käsittää 2 litraa Moviprep Appelsiini -valmistetta). Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

Moviprep Appelsiini sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyylketonuria.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Moviprep Appelsiini -valmiste tta otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienhenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 2 litraa liuosta, joka on valmistettu käyttövalmiiksi seuraavasti:

Pakaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, jotka sisältävät kaksi annospussiparia: annospussit A ja B. Yhden annospussiparin (A ja B) jauheet liuotetaan veteen niin, että saadaan yksi litra liuosta. Pakaus riittää kahteen litraan Moviprep Appelsiini -liuosta.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen Moviprep Appelsiini -valmisteen ottamista. Sinun tulee tietää:

- milloin Moviprep Appelsiini -valmiste otetaan
- miten Moviprep Appelsiini -liuos valmistetaan
- miten Moviprep Appelsiini -valmiste otetaan
- millaisia vaikuttuksia voi odottaa hoidosta

Milloin Moviprep Appelsiini -valmiste otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Moviprep Appelsiini -hoito on otettava kokonaisuudessaan ennen tutkimusta.

Tämä hoito voidaan toteuttaa joko jaettuina annoksina tai kerta-annoksenä seuraavasti:

Toimenpiteet, joissa sinut nukutetaan (käytetään yleisaneesiaa):

1. Jaetut annokset: yksi litra Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimusta edeltäväänä iltana ja yksi litra Moviprep Appelsiini -liuosta varhain tutkimuspäivän aamuna. Moviprep Appelsiini -liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta.
2. Kerta-annos: kaksi litraa Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimusta edeltäväänä iltana tai kaksi litraa Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimuspäivän aamuna. Moviprep Appelsiini -liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta.


Toimenpiteet, joissa sinua ei nukuteta (ei käytetä yleisaneesiaa):

- Jaetut annokset: yksi litra Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimusta edeltävänä iltana ja yksi litra Moviprep Appelsiini -liuosta varhain tutkimuspäivän aamuna. Moviprep Appelsiini -liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään yksi tunti ennen tutkimuksen aloitusta.
- Kerta-annos: kaksi litraa Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimusta edeltävänä iltana tai kaksi litraa Moviprep Appelsiini -liuosta tutkimuspäivän aamuna. Moviprep Appelsiini -liuos on oltava juotuina vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta. Kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään yksi tunti ennen tutkimuksen aloitusta.

Tärkeää! Älä syö kiinteää ruokaa Moviprep Appelsiini -valmisteen käytön aloittamisen jälkeen ennen kuin toimenpide on tehty.

Miten Moviprep Appelsiini -liuos valmistetaan

- Avaa toinen läpinäkyvä pussi ja ota siitä annospussit A ja B.
- Kaada sekä annospussi A:n että annospussi B:n sisältö litran vetoiseen mitta-astiaan.
- Lisää vettä mitta-astiaan yhden litran merkkiin asti ja sekoita, kunnes jauhe on liuennut kokonaan ja Moviprep Appelsiini -liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Tämä vie korkeintaan 5 minuuttia.



Miten Moviprep Appelsiini -valmisteetta otetaan

Juo ensimmäinen litra Moviprep Appelsiini -valmisteetta 1–2 tunnin kuluessa. Yritä juoda lasillinen liuosta aina 10–15 minuutin välein.

Kun litra liuosta on juotu, valmista ja juo toinen litra jäljellä olevista annospusseista A ja B valmistettua Moviprep Appelsiini -liuosta.

Hoidon aikana suositellaan juotavaksi lisäksi litra kirkasta nestettä voimakkaan janon ja nestehukan välttämiseksi. Sopivia juomia ovat vesi, kirkas keitto, hedelmämehu (*ilman hedelmälihaa*), virvoitusjuomat, tee tai kahvi (*ilman maitoa*). Näitä juomia voit juoda, kunnes tutkimukseen on vähintään kaksi tuntia, jos sinut nukutetaan, tai vähintään yksi tunti, jos sinua ei nukuteta.

Millaisia vaikutuksia voit odottaa hoidosta

Kun aloitat Moviprep Appelsiini -liuoksen juomisen, on tärkeää, että olet WC:n läheisyydessä. Ulosteesi muuttuvat jossakin vaiheessa vetisiksi. Tämä on täysin normaalista ja osoittaa, että Moviprep Appelsiini -liuos vaikuttaa. Ulostaminen loppuu, kun kaikki liuos on juotu.

Näitä ohjeita noudattamalla suolesi puhdistuu, mikä auttaa toimenpiteen onnistumista. Varaa liuoksen juomisen jälkeen riittävästi aikaa päästääksesi paikkaan, jossa paksusuoli tähystetään.

Jos otat enemmän Moviprep Appelsiini -valmisteetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Moviprep Appelsiini -liuosta kuin sinun pitäisi, sinulla saattaa esiintyä voimakasta ripulia, joka voi johtaa nestehukkaan. Juo runsaita määriä nestettä, etenkin hedelmämehua. Jos asia huolestuttaa sinua, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Moviprep Appelsiini -valmisteetta

Jos unohtdat ottaa Moviprep Appelsiini -liuosta, ota annos niin pian kuin huomaat unohtaneesi ottaa sitä. Jos sinun olisi pitänyt ottaa liuosta jo useita tunteja aiemmin, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Kun otat Moviprep Appelsiini -valmisteen jaettuna annoksina, on tärkeää, että olet juonut koko Moviprep Appelsiini -liuosmäärän vähintään yksi tunti ennen tutkimusta (jos sinua ei nukuteta) tai vähintään kaksi tuntia ennen tutkimusta (jos sinut nukutetaan). Kun otat Moviprep Appelsiini -valmisteen kerta-annoksesta tutkimuspäivän aamuna, on tärkeää, että olet juonut koko Moviprep Appelsiini -liuosmäärän vähintään kaksi tuntia ennen tutkimusta.

Jos sinulla on muita kysymyksiä tämän valmisten käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ripuli on Moviprep Appelsiini -valmisten normaalista vaikutusta.

Lopeta valmisten käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkärin, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

- ihottumaa tai kutinaa
- kasvojen, nilkkojen tai muun kehon osan turvotusta
- sydämentykyystä
- erittäin voimakasta väsymystä
- hengenahdistusta.

Kaikki edellä mainitut oireet ovat merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta.

Jos ulostamistarvetta ei ilmene kuuden tunnin kuluessa Moviprep Appelsiini -valmisten ottamisesta, lopeta liuoksen juominen ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä yli 1 käyttäjällä kymmenestä):
vatsakipu, vatsan pingottuneisuus, väsymys, yleinen huonovointisuus, peräaukon arkuus, pahoinvointi ja kuume.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):
nälän tunne, univaikeudet, huimaus, päänsärky, oksentelu, ruoansulatusvaivat, jano ja vilunväristykset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä sadasta):
epämiellyttävä olo, nielemisvaikeudet ja muutokset maksan toimintakoikeissa.

Seuraavia haittavaikutuksia on joskus havaittu, mutta ei tiedetä, kuinka usein niitä esiintyy, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin: ilmavaivat, tilapäinen verenpaineen kohoaminen, epäsäännöllinen sydämensyke tai sydämentykytys, nestehukka, oksettava olo, hyvin alhaiset, kouristuksia aiheuttavat natriumarvot ja muutokset veren elektrolyytipitoisuksissa: alentunut bikarbonaattipitoisuus, kohonnut tai alentunut kalsiumpitoisuus, kohonnut tai alentunut kloridipitoisuus, alentunut fosfaattipitoisuus. Veren kalium- ja natriumpitoisuudet saattavat myös alentua.

Nämä haittavaikutukset esiintyvät tavallisesti vain Moviprep Appelsiini -hoidon aikana. Jos ne kuitenkin jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

Allergiset reaktiot saattavat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihmisen punoitusta tai nokkosihottumaa, käsienväritystä ja hengenahdistusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Moviprep Appelsiini -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Huomaa, että eri annospusseissa ei välttämättä ole samaa viimeistä käyttöpäivämäärää. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Kun Moviprep Appelsiini -jauhe on liuotettu veteen, liuos voidaan säilyttää (peitettyinä) alle 25 °C. Liuos voidaan myös säilyttää jäällystyslaatikkossa (2–8 °C). Käytövalmis liuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellään suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Moviprep Appelsiini sisältää

Annospussi A:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:

makrogoli (tunnetaan myös polyetyleniglykolina)	3350	100 g
natriumsulfaatti, vedetön		7,500 g
natriumkloridi		2,691 g
kaliumkloridi		1,015 g

Annospussi B:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:

askorbiinihappo	4,700 g
natriumaskorbaatti	5,900 g

Kun kumpikin annospussi on sekoitettu litraan vettä, liuoksen elektrolyyytisältö on seuraava:

natriumia 181,6 mmol/l (josta imeytyy enintään 56,2 mmol)

kloridia	59,8 mmol/l
sulfaattia	52,8 mmol/l
kaliumia	14,2 mmol/l
askorbaattia	56,5 mmol/l

Muut aineet ovat:

appelsiiniaromi (sisältää luonnollisia makuaineita ja – valmisteita, maltodekstriiniä, dekstroosia), sekä makeutusaineina aspartaami (E 951) ja asesulfaamikalium (E 950). Katso lisätietoja kohdasta 2.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, joissa kummassakin on annospussipari: annospussi A ja annospussi B. Annospussipari (yksi annospussi A ja yksi annospussi B) liuotetaan yhteen litraan vettä.

Moviprep Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten -valmiste on saatavilla 1, 10, 40, 80, 160 ja 320 hoitokerran pakkuksina ja 40 hoitokerran sairaalapakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Norgine B.V.
Antonio Vivaldisstraat 150
1083 HP Amsterdam
Alankomaat.

Valmistaja:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Iso-Britannia.
tai
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Ranska.
tai
Norgine B.V., Antonio Vivaldisstraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Maa	Kauppanimi
Itävalta	MOVIPREP Orange
Belgia	MOVIPREP Sinaas/Orange
Tanska	MOVIPREP Appelsin
Suomi	MOVIPREP Appelsiini
Ranska	MOVIPREP Orange
Saksa	MOVIPREP Orange
Irlanti	MOVIPREP Orange
Italia	MOVIPREP Arancio
Luxemburg	MOVIPREP Sinaas/Orange
Alankomaat	MOVIPREP Orange
Espanja	MOVIPREP sabor Naranja
Ruotsi	MOVIPREP APELSIN
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)	MOVIPREP Orange

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2022 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaistille:

Moviprep Appelsiini -valmistetta on annettava varoen heikkokuntoisille potilaille tai potilaille, joilla on vakava kliininen toiminnanvajaus, kuten:

- heikentynyt nielemisheijaste tai vaara mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisällön joutumisesta keuhkoihin (aspiraatio-tai regurgitaatiotaipumus)
- alentunut tajunnantaso
- vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiinipuhdistuma < 30 ml/min.)
- sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka III tai IV)
- rytmihäiriöriski, kuten potilailla, jotka saavat hoitoa sydän- ja verisuonitaudin vuoksi tai joilla on kilpirauhassairaus
- nestehukka
- vaikeaakuutti tulehdusellinen suolistotauti.

Nestehukka ja elektrolyyttitasapainon muutokset on hoidettava ennen Moviprep Appelsiini -valmisteen käyttöä.

Potilaita, joiden tajunnantaso on alentunut, joilla on heikentynyt nielemisheijaste tai joilla mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisältöä voi joutua keuhkoihin, on seurattava tarkoin annon aikana etenkin, jos anto tapahtuu nenä-mahaletkun kautta.

Moviprep Appelsiini -valmistetta ei saa antaa tajuttomille potilaille

Bipackse del: Information till användaren

Moviprep Appelsiini, pulver för oral lösning

makrogol 3350, natriumsulfat (vattenfritt), natriumklorid, kaliumklorid, askorbinsyra, natriumaskorbat

Läs nog i gen o m d e n n a b i p a c k s e d e l i n n a n d u b ö r j a r a n v ä n d a d e t t a l ä k e m e d e l . D e n i n n e h å l l e r i n f o r m a t i o n s o m är v i k t i g f ö r d i g .

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I d e n n a b i p a c k s e d e l f i n n s i n f o r m a t i o n o m f ö l j a n d e :

1. Vad Moviprep Appelsiini är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Moviprep Appelsiini
3. Hur du tar Moviprep Appelsiini
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Moviprep Appelsiini ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Moviprep Appelsiini är och vad det används för

Moviprep Appelsiini är laxermedel med apelsinsmak. Pulvret är fördelat på 4 dospåsar. Två av dessa är stora dospåsar (dospåse A) och två är små dospåsar (dospåse B). Du ska använda alla påsar i förpackningen under en behandling.

Moviprep Appelsiini är ett läkemedel avsett för vuxna som används för tömning av tarmen vid förberedelse inför en undersökning. Moviprep Appelsiini verkar genom att tömma innehåll i tarmarna, och därfor blir din avföring vatnig.

2. Vad du behöver veta innan du tar Moviprep Appelsiini

Använd inte Moviprep Appelsiini:

- om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har tarmstopp
- om du har hål i tarmväggen
- om du har störningar i tömningen av magen
- om din tarmfunktion är förlamad (kan ofta förekomma efter en operation i bukhålan)
- om du har fenykketonuri, som är en ärftlig sjukdom där kroppen inte kan omsätta en speciell aminosyra. Moviprep Appelsiini innehåller en källa till fenykalanin (aspartam)
- om din kropp inte producerar tillräckligt med glukos-6-fosfodehydrogenas
- om du lider av toxisk megakolon (en allvarlig typ av inflammation i tjocktarmen)

Varningar och försiktighet

Du bör fästa särskild uppmärksamhet vid biverkningarna som uppräknas i punkt 4 om din hälsa är svag eller om du lider av någon allvarlig sjukdom. Kontakta läkare eller apotekspersonal om saken bekymrar dig.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Moviprep Appelsiini:

- om nedsvald mat eller dryck eller magsyrorna stiger upp från magsäcken till matstrupen, eller om du har problem att svälja (se också Moviprep Appelsiini med mat och dryck)
- om du har en njursjukdom
- om du har hjärtsvikt eller hjärtsjukdom, inklusive högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappningar
- om du har en sköldkörtelsjukdom
- om du har vätskebrist
- om du har inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) som plötsligt försämras.

Moviprep Appelsiini ska inte ges till en patient, som har nedsatt medvetandegrad, utan övervakning av läkare.

Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Moviprep Appelsiini för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Moviprep Appelsiini.

Andra läkemedel och Moviprep Appelsiini

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder andra läkemedel som tas via munnen (t.ex. p-piller) ska du inte ta dem en timme före eller en timme efter intag av Moviprep Appelsiini eller medan du tar Moviprep Appelsiini, för annars kan de sköljas bort från matsmältningskanalen och då är deras effekt inte tillräcklig.

Moviprep Appelsiini med mat och dryck

Ät inte fast föda efter att behandlingen inletts tills ingreppet är utfört.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Moviprep Appelsiini motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Drick rikligt med vätska när du använder Moviprep Appelsiini. Moviprep Appelsiini -lösningen tillgodosser inte det normala vätskebehovet.

Graviditet, amning och fertilitet

Eftersom information gällande användning av Moviprep Appelsiini under graviditet och amning saknas bör preparatet användas i dessa fall endast om läkaren anser det nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Moviprep Appelsiini påverkar inte körförståndet eller förmågan att använda maskiner.

Moviprep Appelsiini innehåller natrium, kalium, en fenylalaninkälla och socker

Detta läkemedel innehåller 8,4 g natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per behandling (behandlingen består av 2 liter Moviprep Appelsiini). Detta motsvarar 420 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Detta bör beaktas av patienter som står på en kost med kontrollerat natriumintag. Bara en del natrium (högst 2,6 g per behandling) absorberas.

Detta läkemedel innehåller 1,1 g kalium per behandling. (En behandling består av 2 liter Moviprep Appelsiini). Detta bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som står på en kost med kontrollerat kaliumintag.

Moviprep Appelsiini innehåller aspartam som är en källa till fenykalalanin. Kan vara skadligt för personer med fenyktonuri.

Om det har konstaterats att du är intolerant mot vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur du tar Moviprep Appelsiini

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare, apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2 liter lösning som bereds på följande sätt:

Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar som innehåller 2 dospåsar: dospåse A och dospåse B. En uppsättning av ett par dospåsar (A och B) ska lösas upp i vatten för att få en liter lösning. Förpackningen räcker därmed till 2 liter Moviprep Appelsiini-lösning.

Innan du tar Moviprep Appelsiini ska du läsa igenom följande instruktioner. Du ska veta:

- när du ska ta Moviprep Appelsiini
- hur Moviprep Appelsiini-lösningen ska beredas
- hur Moviprep Appelsiini ska intas
- hurdana verkningar du kan vänta dig att behandlingen har.

När ska du ta Moviprep Appelsiini

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker. Behandlingen med Moviprep Appelsiini ska vara avslutad innan undersökningen.

Denna behandling kan ges antingen som uppdelade doser eller som engångsdos på följande sätt:

För ett ingrepp som görs under narkos (under generell anestesi)

1. Uppdelade doser: en liter Moviprep Appelsiini -lösning på kvällen före undersökningen och en liter Moviprep Appelsiini -lösning tidigt på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep Appelsiini -lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas.
2. Engångsdos: två liter Moviprep Appelsiini -lösning på kvällen före undersökningen eller två liter Moviprep Appelsiini -lösning på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep Appelsiini -lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas.


För ett ingrepp som görs utan narkos (utan generell anestesi)

- Uppdelade doser: en liter Moviprep Appelsiini -lösning på kvällen före undersökningen och en liter Moviprep Appelsiini -lösning tidigt på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep Appelsiini -lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst en timme före undersökningen påbörjas.
- Engångsdos: två liter Moviprep Appelsiini -lösning på kvällen före undersökningen eller två liter Moviprep Appelsiini -lösning på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep Appelsiini -lösning ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas. Intaget av vilken som helst klar vätska ska stoppas minst en timme före undersökningen påbörjas.

Obs! Ät ingen fast föda från tidpunkten då du börjar använda Moviprep Appelsiini till dess att undersökningen är avslutad.

Hur Moviprep Appelsiini-lösningen ska beredas

- Öppna den ena genomskinliga påsen och ta ut dospåse A och B.
- Häll ut innehållet i både dospåse A och B i ett kärl som rymmer en liter.
- Tillsätt vatten upp till 1-litersmärket och rör om tills allt pulver har lösts upp och Moviprep Appelsiini-lösningen är klar eller lite grumlig. Detta tar högst 5 minuter.



Hur Moviprep Appelsiini ska intas

Drick den första litern av Moviprep Appelsiini-lösningen inom 1–2 timmar. Försök dricka ett glas lösning med 10-15 minuters mellanrum.

När du har druckit upp den första litern lösning, gör i ordning och drick den andra litern av Moviprep Appelsiini-lösningen som du bereder av innehållet i de återstående dospåsarna A och B.

Under behandlingen ska du dricka ytterligare 1 liter *klar* vätska för att undvika kraftig törst och vätskebrist. Vatten, klar soppa, fruktjuice (*utan fruktkött*), läskedryck, te eller kaffe (*utan mjölk*) är lämpliga drycker. Dessa drycker kan tas senast två timmar före undersökningen om du ska sövas, eller en timme före undersökningen om du inte ska sövas.

Hurdana verkningar du kan vänta dig av behandlingen

När du börjar dricka Moviprep Appelsiini-lösningen är det viktigt att du håller dig i närheten av en toalett. Förr eller senare kommer du att börja få vattnig avföring. Detta är helt normal och visar att Moviprep Appelsiini fungerar. Avföringen kommer att upphöra när du har druckit upp all lösning.

Om du följer dessa instruktioner kommer din tarm att vara ren vilket underlättar undersökningen och gör att den lyckas bättre. Reservera tillräckligt med tid efter att du har druckit lösningen för resan till platsen där undersökningen ska genomföras.

Om du har använt för stor mängd av Moviprep Appelsiini

Om du har fått i dig för stor mängd Moviprep Appelsiini-lösning kan du få svår diarré som kan orsaka vätskebrist. Drick rikliga mängder vätska, särskilt fruktjuice. Om saken bekymrar dig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Moviprep Appelsiini

Om du har glömt att ta Moviprep Appelsiini, ta en dos genast då du märker detta. Om du borde ha tagit lösningen redan för flera timmar sedan, rådfråga läkare eller apotekspersonalen.

När du tar Moviprep Appelsiini som uppdelade doser, är det viktigt att du har druckit hela mängden Moviprep Appelsiini -lösning minst en timme före undersökningen (om det görs utan narkos) eller minst två timmar före undersökningen (om det görs under narkos). När du tar Moviprep Appelsiini som engångsdos på morgonen på undersökningsdagen, är det viktigt att du har druckit hela mängden Moviprep Appelsiini -lösning minst två timmar före undersökningen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Diarré är en normal effekt av Moviprep Appelsiini.

Om du får någon av de följande biverkningarna, sluta använda Moviprep Appelsiini och kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

- hudutslag eller klåda
- svullnad i ansikte, vrister eller andra kroppsdelar
- hjärtklappning
- kraftig trötthet
- andnöd.

Alla ovan nämnda symptom är tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Om du inte får avföringsbehov inom 6 timmar efter att du har intagit Moviprep Appelsiini, sluta dricka lösningen och kontakta omedelbart läkare.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos över 1 av 10 användare): buksmärta, svullen mage, trötthet, allmän sjukdomskänsla, ömhet kring ändtarmen, illamående och feber.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): hungerskänsla, sömnsvårigheter, svindel, huvudvärk, kräkningar, matsmältningsstörningar, törst och frossbrytningar.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): obehagskänsla, sväljningssvårigheter och förändringar i leverfunktionstester.

Följande biverkningar har ibland observerats men det är inte känt hur ofta de inträffar eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data: gasbildning, en tillfällig höjning av blodtrycket, oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappningar, vätskeförlust, kväljande känsla, mycket låga natriumvärdena som orsakar kramper och förändringar i blodets elektrolytkoncentrationer, såsom sänkt bikarbonatnivå, förhöjd eller minskad kalciumnivå, förhöjd eller minskad kloridnivå, minskad fosfatnivå. Minskad kalium- och natriumnivå i blodet kan också förekomma.

Dessa biverkningar förekommer vanligen endast under behandlingen med Moviprep Appelsiini. Om de ändå fortsätter ska du kontakta läkare.

Allergiska reaktioner kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelutslag, svullnad i händer eller vrister, huvudvärk, hjärtklappning och andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Moviprep Appelsiini ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Observera, att de olika dospåsarna inte nödvändigtvis har samma utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara vid högst 25 °C.

När Moviprep Appelsiini pulvret har lösts upp i vatten kan lösningen förvaras övertäckt vid högst 25 °C. Lösningen kan också förvaras i kylskåp (2-8 °C). Färdigberedd lösning ska användas inom 24 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i dospåse A är:

Makrogol (också känd som polyetenglykol) 3350	100 g
Natriumsulfat, vattenfri	7,500 g
Natriumklorid	2,691 g
Kaliumklorid	1,015 g

De aktiva substanserna i dospåse B är:

Askorbinsyra	4,700 g
Natriumaskorbat	5,900 g

När de båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten är lösningens elektrolythalt följande:

Natrium	181,6 mmol/l (av vilket mer än 56,2 mmol är absorberbart)
Klorid	59,8 mmol/l

Sulfat	52,8 mmol/l
Kalium	14,2 mmol/l
Askorbat	56,5 mmol/l

Övriga innehållsämnen är apelsinarom (innehållande naturliga apelsinaromer och -preparat, maltodextrin, dextros) och sötningsmedlen aspartam (E 951) och acesulfamkalium (E 950). Se ytterligare uppgifter i punkt 2.

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar, som båda innehåller ett par dospåsar: dospåse A och dospåse B. En uppsättning av dospåsar (dospåse A och dospåse B) ska lösas upp i 1 liter vatten.

Förpackningstorlekarna för Moviprep Appelsiini, pulver för oral lösning är 1, 10, 40, 80, 160, 320 behandlingar och 40 behandlingars sjukhusförpackning. Alla förpackningsstorlekar finns eventuellt ej på marknaden.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Norgine B.V.
Antonio Vivaldisstraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederlanderna.

Tillverkare:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Storbritannien
eller
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Frankrike.
eller
Norgine B.V., Antonio Vivaldisstraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederlanderna.

Detta läke medel är godkänt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

Land	Namnen
Österrike	MOVIPREP Orange
Belgien	MOVIPREP Sinaas/Orange
Danmark	MOVIPREP Appelsin
Finland	MOVIPREP Appelsiini
Frankrike	MOVIPREP Orange
Tyskland	MOVIPREP Orange
Irland	MOVIPREP Orange
Italien	MOVIPREP Arancio
Luxemburg	MOVIPREP Sinaas/Orange
Nederlanderna	MOVIPREP Orange
Spanien	MOVIPREP sabor Naranja
Sverige	MOVIPREP APELSIN
Förenade kungariket (Nordirland)	MOVIPREP Orange

Denna bipackse del ändrades senast 15.12.2022

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Moviprep Appelsiini ska användas med försiktighet till svaga patienter eller till patienter som har en allvarlig klinisk insufficiens såsom:

- försämrad sväljreflex, eller en risk för att innehållet i magsäcken eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna (tendens till aspiration eller reflux)
- sänkt medvetandegrad
- gravt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min.)
- hjärtinsufficiens (NYHA grad III eller IV)
- risk för rytmrubbningsar, till exempel patienter som får behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar eller som har sköldkörtelsjukdom
- vätskebrist
- svår akut inflammatorisk tarmsjukdom.

Vätskebrist och förändringar i elektrolytbalansen måste skötas innan användning av Moviprep Appelsiini.

Patienter med sänkt medvetandegrad, försämrad sväljreflex eller en risk för att innehållet i magsäcken eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna bör övervakas noga under administreringen, speciellt om administrering sker via näringssond.

Moviprep Appelsiini får inte ges till medvetslösa patienter.