

Pakkaus seloste: Tie to a käyttäjälle

Sugammadex hameln 100 mg/ml injektioneste, liuos sugammadeksille

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti ennen kuin saat tästä lääkeettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny nukutuslääkärin tai muun lääkärin puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä nukutuslääkärille tai muulle lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Sugammadex hameln on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Sugammadex hameln
3. Miten Sugammadex hameln annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Sugammadex hameln säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1 Mitä Sugammadex hameln on ja mihin sitä käytetään

Mitä Sugammadex hameln on

Sugammadex hameln sisältää vaikuttavana aineena sugammadeksia. Sugammadex hameln kuuluu selektiivisten relaksantteja sitovien lääkeaineiden ryhmään, sillä se toimii vain tiettyjen lihasrelaksanttien, rokuronibromidin ja vekuronibromidin, kanssa.

Mihin Sugammadex hameln käytetään

Kun sinulle tehdään jonkin tyypisiä leikkauksia, lihakset on lamattava täysin. Kirurgin on näin helpompi tehdä leikkaus. Sinulle annettava yleisanestesia sisältää tämän vuoksi lihaksia lamaavia lääkkeitä. Nütä kutsutaan lihasrelaksanteiksi, ja niihin kuuluvat esimerkiksi rokuronibromidi ja vekuronibromidi.. Koska nämä lääkkeet lamaavat myös hengityslihakset, sinua on autettava hengittämään (hengityskoneella) leikkauksen aikana ja sen jälkeen, kunnes pystyt jälleen hengittämään itse.

Sugammadex hameln annetaan nopeuttamaan palautumista lihasrelaksantin vaikutuksesta leikkauksen lopussa, jotta voit nopeammin hengittää jälleen itse. Se saa tämän aikaan yhdistymällä elimistössäsi olevaan rokuronibromidiin tai vekuronibromidiin. Sitä voidaan käyttää aikuisille, kun on käytetty rokuronibromidia tai vekuronibromidia, sekä lapsille ja nuorille (2 – 17-vuotiaille), kun rokuronibromidia on käytetty kohtalaiseen lihasrelaksaatioon.

Sugammadex, jota Sugammadex hameln sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkikenkilön kunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2 Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Sugammadex hameln

Sinulle ei saa antaa Sugammadex hameln

- jos olet allerginen sugammadeksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Kerro nukutuslääkärille, jos tämä koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele nukutuslääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Sugammadex hameln

- jos sinulla on tai on aiemmin ollut munuaissairaus. Tämä on tärkeää, koska Sugammadex hameln poistuu elimistöstäsi munuaisten kautta.
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut maksasairaus.
- jos sinulla esiintyy nesteen kertymistä elimistöön (turvotusta).
- jos sinulla on sairauksia, joiden tiedetään lisäävän verenvuodon riskiä (häiriöt veren hyytymisessä) tai veren hyytymisenestolääkitys.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei suositella alle 2-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmis teet ja Sugammadex hame ln

Kerro nukutuslääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Sugammadex hameln saattaa vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai muut lääkkeet saattavat vaikuttaa siihen.

Osa lääkeistä heikentää Sugammadex hame ln vaikutusta

On erityisen tärkeää, että kerrot nukutuslääkärille, jos olet äskettäin ottanut:

- toremifeenia (jota käytetään rintasyövän hoitoon).
- fusidiinihappoa (antibiootti).

Sugammadex hame ln voi vaikuttaa hormonaalisiiin ehkäisyvalmisteisiin

Sugammadex hameln saattaa heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden - myös ehkäisytablettien, ehkäisyrenkaan, implantaatin tai hormonikierukan - tehoa, koska se vähentää saamaasi progestiinihormonimäärää. Progestiinimäärä elimitössäsi pienenee Sugammadex hameln vaikutuksesta suunnilleen saman verran kuin yhden ehkäisytabletin ottamatta jättämisen yhteydessä.

- Jos otat ehkäisytabletin samana päivänä jolloin saat Sugammadex hameln, toimi ehkäisytablettien pakkausselosteessa tabletin unohtamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Jos käytät muita hormonaalisia ehkäisyvalmisteita (esimerkiksi ehkäisyrengasta, implantaattia tai hormonikierukkaa), sinun on käytettävä lisäksi muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää (esimerkiksi kondomia) seuraavien seitsemän päivän ajan ja noudatettava pakkausselosteessa annettuja ohjeita.

Vaikutus verikokeisiin

Sugammadex hameln ei yleisesti ottaen vaikuta laboratoriokoetuloksiin. Se voi kuitenkin vaikuttaa progesteroniksi kutsutun hormonin verikokeiden tuloksiin. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulle on suunniteltu progesteroniarvon mittaus samalle päivälle, kun sinulle annetaan Sugammadex hameln.

Raskaus ja imetys

Kerro nukutuslääkärille, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät. Sinulle voidaan silti antaa Sugammadex hameln, mutta sinun on keskusteltava asiasta ensin.

Ei tiedetä, erityykö sugammadeksi rintamaitoon Nukutuslääkäri auttaa sinua päättämään, lopetetaanko imetys vai pidättääntääkö sugammadeksihoidosta, ottaen huomioon imetyksestä aiheutuvat hyödyt lapselle ja Sugammadex hameln koituvat hyödyt äidille.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Sugammadex hameln ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn..

Sugammadex hame ln sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää jopa 9,7 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per ml. Tämä vastaa 0,5 %:a suosittellusta natriumin enimmäisvuorokausianksesta aikuiselle.

3 Miten Sugammadex hame ln annetaan

Sugammadex hameln antaa sinulle nukutuslääkäri tai se annetaan nukutuslääkärin valvonnassa.

Annos

Nukutuslääkäri määrittelee tarvitsemasi Sugammadex hameln annoksen:

- painosi ja
- vielä vaikuttavan lihasrelaksantin perusteella.

Tavanomainen annos on 2 – 4 mg painokiloa kohden aikuisille ja 2–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosta 16 mg/kg voidaan käyttää aikuisille, jos nopeampi lihasrelaksaation palautuminen on tarpeen.

Miten Sugammadex hameln annetaan

Sugammadex hameln antaa nukutuslääkäri. Se annetaan kertainjektiona laskimolinjan kautta.

Jos saat enemmän Sugammadex hameln kuin sinun pitäisi

Nukutuslääkäri seuraa tilaasi tarkoin. On epätodennäköistä, että saat liikaa Sugammadex hameln. Vaikka niin tapahtuisikin, siitä ei todennäköisesti aiheudu haittaa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny nukutuslääkärin tai muun lääkärin puoleen.

4 Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos tällaisia haittavaikutuksia ilmaantuu anestesian aikana, nukutuslääkäri havaitsee ja hoitaa ne.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä 1 potilaalla 10:stä):

- Yskä
- Hengystieongelmat, joita voivat olla yskiminien tai liikehdintä kuin olisit heräämässä tai vetämässä henkeä
- Kevyt anestesia - saatat alkaa herätä syvästä unesta, jolloin tarvitset lisää anestesia-ainetta. Saatat tämän vuoksi liikehtiä tai yskiä leikkauksen lopussa
- Toimenpiteesi aikaiset komplikaatiot, kuten muutokset sydämen sykkeessä, yskiminien tai liikehdintä
- Leikkauksesta johtuva verenpaineen lasku.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä 1 potilaalla 100:sta)

- Potilailla, jotka ovat aiemmin sairastaneet keuhkosairauksia, on esiintynyt hengitysteiden lihaskouristuksista (keuhkopukien supistumisesta) johtuvaa hengenahdistusta
- Allergiset (lääkeaineyleherkkyyks-) reaktiot, kuten ihottuma, ihmospunoitus, kielen ja/tai nielun turvotus, hengenahdistus, verenpaineen tai sydämen sykkeen muutokset, mikä voi toisinaan johtaa vakavaan verenpaineen alenemiseen. Vaikeat allergiset tai allergiankalaiset reaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Allergisia reaktioita raportoitii yleisemmin terveillä, tajuissaan olevilla vapaaehtoisilla henkilöillä.
- Lihasrelaksaation palautuminen leikkauksen jälkeen.

Esiintyvyys tuntematon (esiintymistihleys ei arvioitavissa saatavilla olevan tiedon perusteella)

- Vakavaa sydämen harvalyöntisyttä ja sydämen sykkeen hidastumista, joka johtaa jopa sydämenpysähdykseen, saattaa ilmaantua Sugammadex hameln annon yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä nukutuslääkäriille tai muulle lääkäriille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5 Sugammadex hameln säilyttäminen

Terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat valmisteen säilyttämisestä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä läkettä ulkopakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämääärän "EXP" jälkeen
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Pakkauksen ensimmäisen avaamisen ja laimentamisen jälkeen säilytä 2 - 8 °C:ssa ja käytä 24 tunnin kuluessa.

6 Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Sugammadex hameln sisältää

- Vaikuttava aine on sugammadeksia.
1 ml injektionestettä sisältää sugammadeksinatriumia vastaten 100 mg:aa sugammadeksia.
2 ml:n injektiopullo sisältää sugammadeksinatriumia vastaten 200 mg:aa sugammadeksia.
5 ml:n injektiopullo sisältää sugammadeksinatriumia vastaten 500 mg:aa sugammadeksia.
- Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo (pH:n säättöön) ja/tai natriumhydroksidi (pH:n säättöön).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukset

Sugammadex hameln on kirkas ja väritön tai hieman kellanruskea injektioneste, liuos, jossa ei näy käytännössä lainkaan hiukkasia.

Sitä on kahta eri pakkaskokoa. Pakkauksissa on joko 5 tai 10 kpl 2 ml:n injektiopulloja tai 5 tai 10 kpl 5 ml:n injektiopulloja.

Kaikkia pakkaukkoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
hameln pharma gmbh
Inselstraße 1
31787 Hameln
Saksa

Valmistaja(t):
Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Alankomaat

Synthon Hispania S.L.
C/Castelló, nº1
Sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona
Espanja

hameln rds s.r.o.
Horna 36

90001 Modra, Bratislava
Slovakia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

AT	Sugammadex hameln 100 mg/ml, oplossing voor injectie
DE	Sugammadex-hameln 100 mg/ml Injektionslösung
DK	Sugammadex hameln
FI	Sugammadex hameln
IS	Sugammadex hameln
NL	Sugammadex hameln 100 mg/ml, oplossing voor injectie
NO	Sugammadex hameln
SE	Sugammadex hameln
UK(NI)	Sugammadex 100 mg/ml, solution for injection

Tämä pakausseoste on tarkistettu viimeksi 28.03.2023.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Katso yksityiskohtaiset tiedot Sugammadex hameln valmisteyhteenvedosta.

Bipacksedel: Information till användare

Sugammadex hameln 100 mg/ml lösning för injektion sugammadex

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din narkosläkare eller läkare.
- Om du får biverkningar, tala med din narkosläkare eller annan läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Sugammadex hameln är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sugammadex hameln
3. Hur Sugammadex hameln ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sugammadex hameln ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sugammadex hameln är och vad det används för

Vad Sugammadex hameln är

Sugammadex hameln innehåller den aktiva substansen sugammadex. Sugammadex hameln anses vara ett *selektivt reverseringsmedel* eftersom det endast fungerar tillsammans med specifika muskelavslappnande medel, rocuroniumbromid och vekuroniumbromid.

Vad Sugammadex hameln används för

När du genomgår vissa typer av operationer, måste musklerna vara helt avslappnade. Detta gör det enklare för kirurgen att operera. Av denna anledning innehåller den generella anestesin som du får läkemedel som gör att musklerna slappnar av. Dessa kallas *muskelavslappnande* och inkluderar t.ex. rocuroniumbromid och vekuroniumbromid. Eftersom dessa läkemedel även får din andningsmuskulatur att slappa av, så behöver du hjälp att andas (artificiell andning) under och efter operationen tills du kan andas själv igen.

Sugammadex hameln används för att påskynda återhämtningen av dina muskler efter en operation för att du snabbare ska kunna andas själv igen. Det gör detta genom att binda sig till rocuroniumbromid eller vekuroniumbromid i din kropp. Det kan användas av vuxna när rocuroniumbromid eller vekuroniumbromid används och av barn och ungdomar (i ålder 2 till 17 år) när rocuroniumbromid används för en måttlig nivå av avslappning.

Sugammadex som finns i Sugammadex hameln kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Sugammadex hameln

Använd inte Sugammadex hameln

- om du är allergisk mot sugammadex eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Berätta för din narkosläkare om detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med narkosläkare innan du använder Sugammadex hameln

- om du har eller har haft en njursjukdom. Detta är viktigt eftersom Sugammadex hameln försvinner från din kropp genom njurarna.
- om du har eller har haft leversjukdom.
- om du har vätskeansamling (ödem).
- om du har någon sjukdom som är känd för att ge en ökad risk för blödningar (koagulationsrubbningar) eller om du får blodförtunnande medel.

Barn och ungdomar

Det här läkemedlet rekommenderas inte för barn under 2 år.

Andra läkemedel och Sugammadex hameln

Tala om för din narkosläkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Sugammadex hameln kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem.

Vissa läkemedel minskar Sugammadex hameln effekt

Det är speciellt viktigt att du talar om för din narkosläkare om du nyligen har tagit:

- toremifen (används för att behandla bröstcancer).
- fusidinsyra (ett antibiotikum).

Sugammadex hameln kan påverka hormonella preventivmedel

Sugammadex hameln kan göra att hormonella preventivmedel – såsom p-piller, vaginalring, implantat eller hormonspiral – blir mindre verksamma, eftersom det reducerar mängden du får av det gestagenas hormonet. Den mängd som du förlorar av gestagenet motsvarar ungefär en glömd tablett.

- Om du tar ett p-pill samma dag som du får Sugammadex hameln, så följ råden som ges för glömd tablett i bipacksedeln för p-pillret.
- Om du använder något annat hormonellt preventivmedel (t.ex. en vaginalring, implantat eller hormonspiral), bör du använda ett ytterligare icke-hormonellt preventivmedel (t.ex. kondom) under de 7 följande dagarna och följa råden som ges i bipacksedeln.

Effekt på blodprover

Generellt sett påverkar inte Sugammadex hameln laboratorietester. Det kan emellertid påverka resultatet av blodprov för ett hormon som kallas gestagen. Tala om för din läkare om dina gestagennivåer behöver kontrolleras samma dag som du får Sugammadex hameln.

Graviditet och amning

Berätta för din narkosläkare om du är eller kan vara gravid eller om du ammar. Du kanske ändå får Sugammadex hameln, men du bör diskutera det först.

Det är okänt om sugammadex utsöndras i bröstmjölk. Din narkosläkare kommer att hjälpa dig att bestämma om du ska avbryta amningen eller avstå från behandling med sugammadex efter att hänsyn tagits till fördelen med amning för barnet och fördelen med Sugammadex hameln för mamman.

Körförmåga och användning av maskiner

Sugammadex hameln har inte någon känd påverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Sugammadex hameln innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 9,7 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per milliliter. Detta motsvarar 0,5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3. Hur Sugammadex hameln ges

Sugammadex hameln kommer att ges av narkosläkare, eller under överinseende av narkosläkare.

Dosen

Din narkosläkare kommer att beräkna den dos Sugammadex hameln du behöver utifrån:

- din vikt.
- hur mycket det muskelavslappnande läkemedlet fortfarande påverkar dig.

Den vanliga dosen är 2 – 4 mg per kg kroppsvikt för vuxna och för barn och ungdomar i åldern 2-17 år. En dos på 16 mg/kg kan användas hos vuxna om en snabbare återhämtning från muskelavslappningen behövs.

Hur Sugammadex hameln ges

Sugammadex kommer att ges till dig av din narkosläkare. Det ges som en engångsinjektion via en intravenös infart.

Om du har använt för stor mängd av Sugammadex hameln

Eftersom din narkosläkare kommer att övervaka ditt tillstånd noga, är det inte troligt att du får för stor mängd Sugammadex hameln. Även om det skulle ske, är det inte troligt att det leder till några problem.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta narkosläkare eller annan läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om dessa biverkningar uppkommer när du är sövd, så kommer de att uppmärksamas och behandlas av din narkosläkare.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Hosta.
- Problem med luftvägarna som kan inkludera hosta eller rörelser som om du vaknar eller tar ett andetag.
- Lätt anestesi – du kan börja vakna upp ur din djupa sömn och behöva mer anestesi. Detta kan få dig att röra dig eller hosta vid slutet av operationen.
- Komplikationer under behandlingen såsom förändringar i hjärtfrekvens, hosta eller rörelser.
- Minskat blodtryck på grund av det kirurgiska ingreppet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- Andfåddhet orsakad av muskelkramp i luftvägarna (bronkospasm), förekom hos patienter med en sjukdomshistoria med lungproblem.
- Allergiska reaktioner (läkemedelsöverkänslighet) – såsom hudutslag, hudrodnad, svullnad av din tunga och/eller svalg, andfåddhet, ändringar av blodtrycket eller hjärtrytm, som ibland leder till en allvarlig sänkning av blodtrycket. Svåra allergiska eller allergiliknande reaktioner som kan vara livshotande. Allergiska reaktioner rapporterades oftare hos friska försökspersoner som var vid medvetande.
- Återkomst av muskelavslappning efter operationen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Allvarlig avmattning av hjärtat och avmattning av hjärtat till hjärtstopp kan förekomma när Sugammadex hameln ges.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din narkosläkare eller annan läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Sugammadex hameln ska förvaras

Förvaringen sköts av sjukvårdspersonalen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Efter första öppning och spädning, förvara vid 2 – 8 °C och använd inom 24 timmar.

6. Förpackningens inne håll och övriga upplysningar

Vad Sugammadex hameln inne håller

- Den aktiva substansen är sugammadex.
 - 1 ml injektionsvätska innehåller sugammadexnatrium motsvarande 100 mg sugammadex.
 - En injektionsflaska á 2 ml innehåller sugammadexnatrium motsvarande 200 mg sugammadex.
 - En injektionsflaska á 5 ml innehåller sugammadexnatrium motsvarande 500 mg sugammadex.
- Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, saltsyra (för pH-justering) och/eller natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugammadex hameln är en klar, färglös till svagt gulbrun injektionsvätska, praktiskt taget fri från partiklar. Den finns i två olika förpackningsstorlekar innehållande antingen 5 eller 10 injektionsflaskor med 2 ml eller 5 ml eller 10 injektionsflaskor med 5 ml lösning för injektion.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte är tillgängliga på marknaden.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

hameln pharma gmbh
Inselstraße 1
31787 Hameln
Tyskland

Tillverkare:

Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nederlanderna

Synthon Hispania S.L.
C/Castelló, nº1
Sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona
Spanien

hameln rds s.r.o.
Horná 36
90001 Modra, Bratislava
Slovakien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetssområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

AT	Sugammadex-hameln 100 mg/ml Injektionslösung
DE	Sugammadex-hameln 100 mg/ml Injektionslösung
DK	Sugammadex hameln
FI	Sugammadex hameln
IS	Sugammadex hameln
NL	Sugammadex hameln 100 mg/ml, oplossing voor injectie
NO	Sugammadex hameln
SE	Sugammadex hameln
UK (NI)	Sugammadex 100 mg/ml, solution for injection

Denna bipacksedel ändrades senast 28.03.2023.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

För detaljerad information hänvisas till produktresumén för Sugammadex hameln.