

Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

Zonic Mint 2 mg pussi suuonteloon nikotiini

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkaus selosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkien henkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkaus seloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkien henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus selosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellet kykene lopettamaan tupakointia 6 kuukauden Zonic Mint -hoidon jälkeen.

Tässä pakkaus selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Zonic Mint on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonic Mint -pussia
3. Miten Zonic Mint -pussia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zonic Mint -pussien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zonic Mint on ja mihin sitä käytetään

Zonic Mint vähentää tupakoinnin lopettamisesta aiheutuvia vieroitusoireita ja nikotiinin ihmooja ja auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, jos tupakoija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin, tai auttaa vähentämään tupakointia, jos tupakoija ei kykene tai halua lopettaa tupakointia kokonaan.

Jos elimistön nikotiinin saanti loppuu äkillisesti, sinulle ilmaantuu erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, joita kutsutaan vieroitusoireiksi. Zonic Mint estää tai ainakin vähentää näitä epämiellyttäviä tuntemuksia vapauttamalla elimistöön lyhytkestoisesti pienen määrän nikotiinia.

Neuvot ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuutta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonic Mint -pussia

Älä käytä Zonic Mint -pussia

- jos olet **allerginen** nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on vaikea **sydänsairaus** (esim. huonossa hoitotasapainossa oleva angina pectoris tai valkeita rytmihäiriöitä)
- jos sinulla on äskettäin (3 kuukauden kuluessa) ollut **sydänkohtaus** (sydäninfarkti) tai **aivohalvaus**.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkien henkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zonic Mint -pussia, jos sinulla on

- **jokin sydän- tai verisuonitauti**
- **hoitamaton korkea verenpaine**
- **vaikea maksasairaus**
- **vaikea munuaisairaus**
- **diabetes** ja käytät insuliinia, ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Zonic Mint

- **mahaava**
- **kilpirauhasen liikatoimintaa**
- **lisämuunuaiskasvain** (feokromosytooma).

Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, Zonic Mint -valmisteen käyttö ei ehkä ole turvallista.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Zonic Mint -valmistetta, ellei lääkäri määräää sitä. Tupakoimattomat henkilöt eivät saa käyttää Zonic Mint -valmistetta.

Aikuisille tarkoitettu annos saattaa aiheuttaa pikkulapsille vakavan myrkytyksen tai jopa kuoleman. Siksi on tärkeää pitää Zonic Mint aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmis teet ja Zonic Mint

Kerro lääkäriille tai apteekkienhenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät **teofylliinia, takriinia, klotsapiinia, ropinirolia, flekainidia, pentatsosiinia tai insuliinia** sisältäviä lääkkeitä.

Zonic Mint ruuan ja juoman kanssa

Älä syö lääkää juo samanaikaisesti, kun käytät Zonic Mint -pussia, koska se saattaa heikentää Zonic Mint -valmisteen vaikutusta.

Happamat juomat (esim. hedelmämehu) vaikuttavat nikotiinin imetyymiseen suuontelosta.

Sinun on välttettävä tällaisia juomia noin 15 minuutin ajan ennen Zonic Mint -valmisteen käyttöä, jotta saisit siitä parhaan mahdollisen vaikutuksen.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tupakoinnin lopettaminen raskauden ajaksi on erittäin tärkeää, koska tupakointi saattaa haitata lapsen kasvua. Se saattaa aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa lapsen syntymisen kuolleena. Mieluiten lopeta tupakointi ilman nikotiinia sisältävien valmisteiden käyttöä. Jos tämä ei onnistuu, käytä Zonic Mint -valmistetta vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut asiasta raskauttasi seuraavan terveydenhuollon ammattilaisten, omalaakärin tai tupakoinnin lopettamiseen tukeva tarjoavan keskuksen lääkärin kanssa.

Zonic Mint -valmisteen käyttöä imetyksen aikana on välttävä, koska nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos lääkäri on suositellut Zonic Mint -valmisteen käyttöä imetyksen aikana, valmistetta käytetään heti imetyksen jälkeen eikä sitä saa käyttää kahteen tuntiin ennen imettämistä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Suositteluna annoksina käytettyä Zonic Mint ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Zonic Mint sisältää aspartaamia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,06 mg aspartaamia per pussi. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilölle, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

3. Miten Zonic Mint -pussia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienhenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Aseta pussi ylähuulen alle ja anna sen olla paikoillaan noin 30 minuutin ajan. Liikuttele pussia ajoittain kielen avulla.

Hoidon alussa käytetään yksi pussi kerran tunnissa tai joka toinen tunti. 8–12 pussia päivässä on useimmissa tapauksissa riittävä annos. Vuorokaudessa saa käyttää enintään 24 pussia.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta se kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Nikotiiniannosta on sen jälkeen pienennettävä vähitellen. Hoito lopetetaan, kun annos on 1–2 pussia vuorokaudessa. Voit kuitenkin käyttää pussin, jos tunnet tarvetta polttaa savukkeen.

Älä käytä Zonic Mint -valmistetta pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkienhenkilöstön kanssa.

Tupakoinnin vähentäminen

Zonic Mint -valmistetta voidaan käyttää tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseksi, jotta tupakointi vähensi mahdollisimman paljon. Jos et ole kyennyt 6 viikon hoidon jälkeen vähentämään päivässä polttamiesi savukkeiden määrää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yritä tupakoinnin lopettamista heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Zonic Mint -valmisteen käytön aloittamisesta. Jos et pysty lopettamaan tupakointia 9 kuukauden kuluessa, käänny terveydenhoitohenkilöstön puoleen.

Älä käytä Zonic Mint -valmistetta pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkienhenkilöstön kanssa.

Nikotiinin vaiketus ilmenee muutaman minuutin kuluttua. Siksi et voi odottaa yhtä nopeaa nikotiinitarpeen tyydyttymistä kuin tupakoinnin yhteydessä. Myrkytyksen vaara on vähäinen, jos vahingossa nielet pussin, koska nikotiini vapautuu tällöin hitaasti ja epätäydellisesti.

Jos käytät enemmän Zonic Mint -valmistetta kuin sinun pitäisi

Nikotiiniyliannos on mahdollinen, jos tupakoit samanaikaisesti Zonic Mint -valmisten käytön aikana. Yliannoksen oireita ovat pahoinvointi, syljenerityksen lisääntyminen, vatsakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus (heikotuksen tunne). Suurten annosten yhteydessä näiden oireiden lisäksi saattaa esiintyä matalaa verenpainetta, sydämen sykkeen heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta väsymystä, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.

Jos lapsi ottaa Zonic Mint -valmistetta tai jos sinä otat liikaa nikotiinia, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienhenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Zonic Mint -valmiste saattaa aiheuttaa samankaltaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa oleva nikotiini. Haittavaikutukset ovat tavallisesti annosriippuvaisia. Ks. myös kohta Jos käytät enemmän Zonic Mint -valmistetta kuin sinun pitäisi.

Yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 käyttäjällä sadasta) ovat suun tai kurkun ärsytyksensä ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat huimaus, päänsärky, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu ja nikotus.

Melko harvinainen haittavaikutuksia (alle 1 käyttäjällä sadasta) ovat sydämentykytys (tunne nopeasta tai epäsäännöllisestä syketihheydestä) ja ihmisen punoitus tai ihottuma.

Harvinainen haittavaikutuksia (alle 1 käyttäjällä tuhannesta) ovat muutokset sydämen sykkeessä (epäsäännöllinen sydämen syke) ja allergiset reaktiot, jotka saattavat olla vakavia.

Jos haittavaikutukset ovat häiritseviä tai eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.

Osaoireista, kuten huimaus, päänsärky ja unihäiriöt, saattavat johtua tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista ja liittyvä vähentyneeseen nikotiinin saantiiin.

Kun lopetat tupakoinnin, sinulle saattaa tulla suun haavaumia. Näiden yhteyksien nikotiinihoitoon on epäselvä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Zonic Mint -pussien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä Zonic Mint -pusseja purkissa/alumiinipussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zonic Mint sisältää

- Vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen pussi sisältää 2 mg nikotiinia.
- Muut aineet ovat selluloosa (mikrokiteinen), minttuaromi, askorbyylipalmiatti (E 304), trinatriumfosfaatti, asesulfaamikalium (E 950), aspartaami (E 951).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko

Zonic Mint -pussi suuonteloon, on suorakaiteen muotoinen jauhetäytteinen pussi.

Pakkuskoot:

Tölkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki, pakattu alumiiniseen suojarupsiin: 20 pussia.

Tölkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki : 20 pussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Niconovum AB

Box 31008

SE-200 49 Malmö

Ruotsi

Valmistaja:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

DK-4230 Skaelskor

Tanska

Apotek, Produktion & Laboratorier (APL)

Celsiusgatan 43

SE-212 14 Malmö

Ruotsi

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 13.12.2021

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Zonic Mint 2 mg munhålepåse nikotin

Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Zonic Mint.

I denna bipackse del finns information om följande:

1. Vad Zonic Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zonic Mint
3. Hur du använder Zonic Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonic Mint skall förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zonic Mint är och vad det används för

Nikotinet i Zonic Mint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonic Mint kan du förhindra eller åtnjutte minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zonic Mint

Använd inte Zonic Mint:

- om du är **allergisk** mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),
- om du lider av svår **hjärtsjukdom** (t.ex. instabil angina pectoris, allvarlig arytmia),
- om du nyligen (inom 3 månader) haft **hjärtinfarkt** eller **slaganfall**.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zonic Mint om du har:

- någon **hjärt- eller kärlsjukdom**,
- obehandlat **högt blodtryck**,
- svår **leversjukdom**,
- svår **njursjukdom**,
- **diabetes** och använder insulin, se även ”Andra läkemedel och Zonic Mint”,
- **magsår**,
- överaktiv **sköldkörtel**,
- en tumor i **binjurarna** (feokromocytom).

Om du har något av dessa tillstånd är det inte säkert att det är lämpligt att du använder Zonic Mint.

Barn och ungdomar

Personer **under 18 år** ska endast använda Zonic Mint efter läkares ordination. Zonic Mint ska inte användas av icke-rökare.

En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Zonic Mint utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Zonic Mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som **innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid, pentazocin eller insulin**.

Zonic Mint med mat och dryck

Du bör inte äta eller dricka med portionspåsen i munnen, eftersom detta kan minska effekten av Zonic Mint.

Syrliga drycker (t ex juice) påverkar upptagets av nikotin i munhålan. För att försäkra dig om bästa effekt, bör du undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Zonic Mint.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditet eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller till och med missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonic Mint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller en läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Zonic Mint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Zonic Mint under amning ska portionspåsen tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Zonic Mint använt i rekommenderade doser påverkar inte förmågan att framföra fordon eller att sköta maskiner.

Zonic Mint innehåller aspartam

Detta läkemedel innehåller 0.06 mg aspartam per portionspåse. Aspartam är en fenylyalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylyketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylyalanin i kroppen.

3. Hur du använder Zonic Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Lägg in en portionspåse under överläppen och låt den ligga där i cirka 30 minuter. Flytta då och då runt påsen med tungan.

I början av behandlingen kan 1 portionspåse tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 portionspåsar per dag tillräckligt. Högst 24 portionspåsar per dag bör användas.

Rökavvänjning

Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet portionspåsar per dag. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 portionspåsar per dag. Du kan dock ta en portionspåse vid tillfället när du är frestad att röka.

Använd inte Zonic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.

Rökreduktion

Zonic Mint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonic Mint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.

Använd inte Zonic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.

Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja ned portionspåsen eftersom nikotinet då löses ut långsamt och ofullständigt.

Om du använt för stor mängd av Zonic Mint

Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonic Mint. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärkor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Zonic Mint kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende. Se även avsnitt 3 ”Om du använt för stor mängd av Zonic Mint”.

De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är irritation i mun och hals under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, obehagskänsla i magen, illamående, kräkningar och hicka.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är hjärtklappning, hudrodnad och hudutslag.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är rubbning av hjärtrytmen och allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga.

Om biverkningarna är besvärliga eller kvarstår kontakta då din läkare.

Vissa symptom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter kan bero på abstinensbesvärs vid rökavvänjning och hör ihop med att du sänker nikotintillförseln.

Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Zonic Mint ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på burken/aluminiumpåsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är nikotin. Varje portionspåse innehåller 2 mg nikotin.
- Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, mintsmakämne, askorbylpalmitat (E 304), trinatriumfosfat, acesulfamkalium (E 950), aspartam (E 951).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zonic Mint munhålepåse är en rektangulär, pulverfyllt portionspåse.

Förpackningsstorlekar:

Burk med skruvlock med barnskyddande förslutning i en aluminiumpåse: 20 portionspåsar.

Burk med skruvlock med barnskyddande förslutning: 20 portionspåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Niconovum AB

Box 31008

SE-200 49 Malmö

Sverige

Tillverkare

Viminco A/S

Lodshusvej 11

DK-4230 Skælskør

Danmark

Apotek, Produktion & Laboratorier (APL)
Celsiusgatan 43
SE-212 14 Malmö
Sverige

Den nna bipacksedel ändrades senast den 13.12.2021