

PAKKAUSSELOSTE

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käännny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määritty sinulle henkilökohtaisesti, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Septocaine, 40 mg/ml + 5 mikrog/ml, injektioneste, liuos
Artikaiinihydrokloridi ja adrenaliinitartraatti

Septocaine forte, 40 mg/ml + 10 mikrog/ml, injektioneste, liuos
Artikaiinihydrokloridi ja adrenaliinitartraatti

- Vaikuttavat aineet: Artikaiinihydrokloridi 40 mg/ml ja adrenaliinitartraatti vastaten adrenaliinia 5 mikrog/ml tai 10 mikrog/ml.
- Apuaineet: Natriumkloridi, natriumedetaatti, natriummetabisulfiitti, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
RANSKA

1. MITÄ SEPTOCAINE JA SEPTOCAINE FORTE OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Paikallispudutteita.

Septocaine ja Septocaine forte sisältävät artikaiinia, joka on amidityyppinen puudute. Artikaiini estää hermoimpulssien välittymistä väliaikaisesti. Valmisteeseen lisätty adrenaliini pidentää puudutuksen kestoa ja vähentää haittavaikutuksien vaaraa.

Septocaine ja Septocaine forte on pakattu sylinterimuotoisiin ampulleihin, joissa on yläosassa kumitulppa ja metallisinetti ja pohjassa liikkuva kumimäntä. Neste on kirkasta ja väritöntä.

Pakkaukset sisältävät 50 x 1,7 ml lasiampullia.

Septocainea käytetään hammasläketieteellisissä puudutuksissa yksinkertaisissa toimenpiteissä.
Septocaine fortea käytetään hammasläketieteellisissä puudutuksissa monimutkaisissa toimenpiteissä.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄ SEPTOCAINEA TAI SEPTOCaine FORTEA

- Älä käytä Septocainea tai Septocaine fortea
 - jos olet yliherkkä (allerginen) artikaiinille tai Septocainen tai Septocaine forten jollekin muulle aineelle.
- Ole erityisen varovainen Septocainen tai Septocaine forten suhteeseen
 - jos sinulla on hoitamaton kohonnut verenpaine tai vakava sydän-verisuonisairaus, erityisesti sellainen, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys
 - jos sinulla on AV-katkos
 - jos sinulla on sairaus, joka johtuu kilpirauhashormonin liikatuotannosta
 - jos sinulla on diabetes
 - kun neula työntyy injektiossa verisuonen sisään, myrkytysoireita saattaa ilmaantua yliannostuksen vuoksi
 - kun Septocainea tai Septocaine fortea ruiskutetaan tulehtuneisiin tai infektoituneisiin kudoksiin
 - jos olet allerginen sulfiiteille, koska nämä valmisteet saattavat aiheuttaa tai pahentaa anafylaktisia reaktioita
 - jos olet urheilija.
- Septocainen tai Septocaine forten käyttö ruoan ja juoman kanssa:
Älä syö, ennen kuin tuntoaisistisi on palautunut, muutoin on olemassa puremisvammojen vaara (huulet, posket, kieli).

Raskaus

Valmisten käytössä raskauden aikana on noudatettava varovaisuutta.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Imettäminen

Tiedot valmisten kulkeutumisesta äidinmaitoon puuttuvat, mutta haittavaikutusten aiheutuminen lapselle on epätodennäköistä, mikäli annostusta on noudatettu.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Artikaiinin ei ole todettu vaikuttavan keskittymiskykyyn, näköhavaintoihin reagoimiseen tai motoriseen koordinaatioon.

Tärkeää tietoa joistakin Septocainen ja Septocaine forten aineista.

Lääkevalmisteet sisältävät natriummetabisulfiittia, joka voi harvoin aiheuttaa vakavia yliherkkyyssreaktioita ja hengitystieoireita.

Muiden lääkkeiden käyttö

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettän käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt.

- Rakenteellisesti paikallispuudutteita muistuttavat valmisteet voivat lisätä myrkyllisiä vaikutuksia.
- Beetasalpaajat (verenpainelääkkeet), inhaloitavat anesteetit, maprotiliini ja ei-selektiiviset monoamiinin takaisinottoa estävät lääkeet (masennuslääkkeet) voivat vaatia annostuksen sovittamista.

3. MITEN SEPTOCAINEA JA SEPTOCAINE FORTEA KÄYTETÄÄN

Vain lääkäri tai hammaslääkäri saa injektoida Septocainea tai Septocaine forteaa, koska hän on saanut koulutuksen paikallispuudutustekniikoista ja perehtynyt komplikaatioiden diagnoosiin ja hoitoon.

Rutiinitoimenpiteissä riittää yleensä 1 ampulli.

Lääkärisi tai hammaslääkärisi voi kuitenkin antaa joko pienemmän tai suuremman puuduteannoksen. Hän sovitaa annostuksen ikäsi, painosi, terveydentilasi ja suoritettavan toimenpiteen mukaan.

Jos sinusta tuntuu, että Septocainen tai Septocaine forten vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri käyttää liikaa Septocainea tai Septocaine forteaa, seuraavia yliannostuksen oireita saattaa ilmaantua:

- Suhteellisessa yliannostuksessa saattaa esiintyä hermostollisia oireita, erityisesti kouristuksia.
- Ehottomassa yliannostuksessa saattaa esiintyä sydämeen ja keskushermestoon liittyviä haittavaikutuksia, joihin kuuluvat näön sumeneminen, sekainen olo, pistelevä tunne, kuulon muutokset, ahdistuneisuus, paineen tunne rinnassa ja otsalla, artikulointivaikeudet ja lihasten nykiminen.

Jos keskushermoston haittavaikutukset eivät poistu, seurauksena voi olla tajuttomuus, kouristuksia ja hengitysteiden tukkeutuminen. Asidoosi (veren liiallinen happamuus) pahentaa myrkyllisiä vaikutuksia.

Jos valmistetta annostellaan nopeasti suonensisäisenä boluksena, valmisteen suuri pitoisuus verenkierrossa johtaa vakavaan sydänlihaksen lamaantumiseen, jonka seurauksena voi olla sydämenpysähdys.

Yliannostuksen hoito:

Potilas asetetaan tarvittaessa makaavaan asentoon.

Suonensisäinen injektilihytvaikutteista barbituurihappoa tai bentsodiatsepiinia.

Hapen anto.

Hengityksen auttaminen

Verenkierron tukeminen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, Septocainella tai Septocaine fortella voi olla haittavaikutuksia.

Haittavaikutuksien esiintymistihettä kuvataan seuraavasti: Yleiset ($>1/100 - < 1/10$), epätavalliset ($>1/1000 - < 1/100$) ja harvinaiset ($>10.000 - < 1/1000$).

Immuniijärjestelmä

Harvinaiset: allergiset reaktiot

Psykiatriset haittavaikutukset

Harvinaiset: hermostuneisuus, ahdistuneisuus

Keskushermosto

Yleiset: päänsärky, pistelevä tunne, puutuminen

Harvinaiset: kasvohermojen halvaantuminen, epilepsia, huimaus, levottomuuus, orientaation häiriöt, vapina

Silmät

Harvinaiset: kaksoiskuvat, mustuaisen laajentuminen, silmälouomen roikkuminen, mustuaisen supistuminen, silmämunan painuminen silmäkuoppaan

Sydän

Yleiset: sydämen harvalyöntisyys, sydämen tiheälyöntisyys

Harvinaiset: sydänlihaksen toimintahäiriö ja sydämenpysähdy

Maha ja suolisto

Epätavalliset: pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Iho

Yleiset: kasvojen turvotus

Epätavalliset: kutina

Harvinaiset: angioödeema, kudoskuoliot

Muut

Yleiset: verenpaineen lasku

Epätavalliset: verenpaineen nousu

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. SEPTOCAINEN JA SEPTOCAIN FORTEN SÄILYTTÄMINEN

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätynä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville.

Älä käytä myyntipäällysmerkinnöissä olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Ampullit ovat kertakäyttöisiä. Jos osa ampullista jää käyttämättä, ylijäänyt liuos on hävitettävä.

6. MUUTA TIETOA

Tämä seloste on päivitetty viimeksi: 14.4.2004

BIPACKSEDEL

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

Septocaine 40 mg/ml + 5 mikrog/ml, injektionsvätska, lösning
Artikainhydroklorid + adrenalintartrat

Septocaine forte 40 mg/ml + 10 mikrog/ml, injektionsvätska, lösning
Artikainhydroklorid + adrenalintartrat

- De aktiva innehållsämnen: artikainhydroklorid 40 mg/ml och adrenalintartrat som motsvarar 5 mikrog/ml eller 10 mikrog/ml adrenalin.
- Övriga innehållsämnen: natriumklorid, natriumdetat, natriummetabisulfit, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
FRANKRIKE

1. VAD ÄR SEPTOCAINE/SEPTOCAIN FORTE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

Lokala bedövningsmedel.

Septocaine/Septocaine forte innehåller artikain som är ett bedövningsmedel av amidtyp. Artikain blockerar tillfälligt förmedlingen av nervimpulser. Adrenalinet som har tillsatts till preparatet förlänger bedövningen och minskar risken för biverkningar.

Septocaine/Septocaine forte är förpackade i cylinderampuller som upptill har en gummipropp och ett metallsigill och i bottnen en rörlig gummikolv. Vätskan är klar och färglös.

Förpackningarna innehåller 50 x 1,7 ml glasampuller.

Septocaine används för odontologisk bedövning vid enkla ingrepp. Septocaine forte används för odontologisk bedövning vid komplicerade ingrepp.

2. INNAN DU ANVÄNDER SEPTOCAINE/SEPTOCAIN FORTE

- Använd inte Septocaine/Septocaine forte
 - om du är överkänslig (allergisk) mot artikain eller något av de övriga innehållsämnen i Septocaine/Septocaine forte.
- Var särskilt försiktig med Septocaine/Septocaine forte
 - om du har obehandlad blodtrycksstegring, allvarliga hjärt-kärlsjukdomar speciellt sådana som är förknippade med ökad hjärtverksamhet
 - om du har AV-block
 - om du har en sjukdom som beror på överproduktion av sköldkörtelhormon
 - om du har diabetes
 - när nälen under injektionen tränger sig in i ett blodkärl, kan toxiska reaktioner förekomma på grund av överdosering
 - när Septocaine/Septocaine forte injiceras in i inflammerade eller infekterade vävnader
 - om du är allergisk mot sulfiter, eftersom dessa preparat kan orsaka eller förvärra anafylaktiska reaktioner
 - om du är en idrottare.
- Användning av Septocaine/Septocaine forte med mat och dryck
Åt inget före känseln har återkommit, eftersom det annars finns en risk att få bitsår (läpparna, kinderna, tungan).

Graviditet

Vid användning av preparatet under graviditet skall försiktighet iakttas.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Amning

Inga uppgifter om preparatets utsöndring i modersmjölken finns, men förekomsten av biverkningar hos barnet är osannolik, då doseringsanvisningarna följs.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Artikain har inte visats påverka koncentrationsförmågan, reaktionsförmågan eller den motoriska koordinationen.

Viktig information om några av hjälpmännen i Septocaine/Septocaine forte

Läkemedelspreparaten innehåller natriummetabisulfit som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och luftvägssymtom.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

- Ämnen som strukturellt påminner om lokala bedövningsmedel kan förstärka de toxiska effekterna.
- Betablockerare (blodtrycksläkemedel), inhalerbara anestetika, maprotilin och icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare (antidepressiva medel) kan kräva justering av doseringen.

3. HUR DU ANVÄNDER SEPTOCAINE/SEPTOCAINE FORTE

Endast läkare och tandläkare får injicera Septocaine/Septocaine forte, eftersom de har fått utbildning i tekniker för lokala bedövningsmedel samt är informerade om diagnostisering och behandling av komplikationer.

Vid rutiningrepp räcker i regel en ampull.

Din läkare eller tandläkare kan dock ge antingen en mindre eller större dos av bedövningsmedlet. Han/hon anpassar doseringen efter din ålder, vikt, ditt hälsotillstånd samt efter ingreppet som utförs.

Om du upplever att effekten av Septocaine/Septocaine forte är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om läkaren eller tandläkaren använder mera Septocaine/Septocaine forte än vad de borde, kan följande symptom på överdosering förekomma:

- Vid en relativ överdosering kan neurologiska symptom, speciellt kramper, förekomma.
- Vid en absolut överdosering kan hjärtsymptom och neurologiska symptom förekomma. Sådana är bl.a. synrubbningar, förvirring, myrkrypningar, hörselförändringar, ångest, en känsa av tryck över bröstet och pannan, artikulationssvårigheter och muskelyckningar.

Om de neurologiska symptomen inte upphör, kan det leda till medvetslöshet, kramper och obstruktion av luftvägarna. Acidos (hög halt av syra i blodet) försämrar de toxiska effekterna.

Om preparatet ges som en snabb intravenös bolus, leder den höga halten av preparatet i blodet till allvarlig förlamning av hjärtmuskeln, vilket kan leda till hjärtstillestånd.

Behandling av överdosering:

Patienten placeras vid behov i liggande ställning.

En intravenös injektion av en kortverkande barbitursyra eller bensodiazepin.

Tillförsel av syre.

Understöd av andningen.

Understöd av blodcirkulationen.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Septocaine/Septocaine forte ha biverkningar.

Förekomsten av biverkningar beskrivs enligt följande: Vanliga ($>1/100 - < 1/10$), mindre vanliga ($>1/1\ 000 - < 1/100$) och sällsynta ($>10\ 000 - < 1/1\ 000$).

Immunsystemet

Sällsynta: allergiska reaktioner

Psykiatriska biverkningar

Sällsynta: nervositet, ångest

Centrala nervsystemet

Vanliga: huvudvärk, myrkrypningar, domning

Sällsynta: förlamning av ansiktsnerverna, epilepsi, yrsel, upphetsning, orienteringsstörningar, skakningar

Ögonen

Sällsynta: dubbelseende, utvidgning av pupillen, hängande ögonlock, sammandragning av pupillen, nedsjunkning av ögongloben i ögonhålan

Hjärtat

Vanliga: minskad hjärtverksamhet, ökad hjärtverksamhet

Sällsynta: funktionsstörning i hjärtmuskeln och hjärtstillestånd

Mag-tarmkanalen

Mindre vanliga: illamående, kräkningar, diarré

Huden

Vanliga: ansiktssvullnad

Mindre vanliga: klåda

Sällsynta: angioödem, vävnadsdöd

Övriga

Vanliga: blodtryckssänkning

Mindre vanliga: blodtrycksstegring

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV SEPTOCAIN/SEPTOCAIN FORTE

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Ampullerna är för engångsbruk. Om en del av ampullen inte används, måste den överblivna lösningen kasseras.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Denna bipacksedel uppdaterades senast: 14.4.2004