

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bicalutamid Orion 50 mg kalvopäällysteiset tabletit bicalutamidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samankaltaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Bicalutamid Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bicalutamid Orion -tabletteja
3. Miten Bicalutamid Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Bicalutamid Orion -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Bicalutamid Orion on ja mihin sitä käytetään

Eturauhaskasvaimen kasvu on riippuvaista mm. miessukupuolihormoneista eli androgeeneista. Tämän lääkkeen vaikuttava aine, bicalutamidi, on ns. antiandrogeeni, joka estää luonnollisen androgeenin syöpäkasvaimen kasvua edistävää vaikutusta.

Tätä lääkettä käytetään eturauhassyövän hoitoon yhdessä muun hoidon kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bicalutamid Orion -tabletteja

Älä ota Bicalutamid Orion -tabletteja

- jos olet allerginen bicalutamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos käytät tiettyjä antihistamiineja (terfenadiini tai astemitsoli)
- jos käytät vatsalääke sisapridia.

Tätä lääkettä ei saa antaa naisille eikä lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Bicalutamid Orion -tabletteja,

- jos sinulla on jokin maksasairaus
- jos sinulla on jokin sydän- tai verisuonisairaus, kuten sydämen rytmihäiriö (arytmia), tai sinua hoidetaan lääkkeillä sen takia. Sydämen rytmihäiriön riski voi kasvaa, kun käytetään Bicalutamid Orion -tabletteja.
- jos sinulla on diabetes
- jos käytät muita lääkkeitä, erityisesti jos käytät verenohennuslääkkeitä tai lääkkeitä, jotka estävät verta hyytymästä
- jos käytät Bicalutamid Orion -tabletteja, sinun ja/tai kumppanisi on käytettävä raskauden ehkäisyä Bicalutamid Orion -hoidon aikana ja 130 vuorokautta hoidon päättymisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on kysymyksiä raskauden ehkäisystä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Bicalutamid Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä

- terfenadiinia ja astemitsolia (antihistamiineja)
- sisapridia (vatsalääke).

Joidenkin lääkkeiden tai Bicalutamid Orion -tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.

- tietyt verenohennuslääkkeet (esim. varfariini)
- siklosporiini (immuunijärjestelmään vaikuttava lääke)
- kalsiumkanavan salpaajat (sydän- ja verenpainelääkkeitä)
- simetidiini (mahahaavalääke)
- ketokonatsoli (sieni-infektiolääke)
- midatsolaami (unilääke).

Bicalutamid Orion -tableteilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin sydämen rytmihäiriön hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa (esim. kinidiini, prokainiamidi, amiodaroni ja sotaloli) tai Bicalutamid Orion voi lisätä riskiä sydämen rytmihäiriöön, kun sitä käytetään joidenkin muiden lääkkeiden kanssa (esim. metadoni (käytetään kivun lievitykseen ja huumeriippuvuuden katkaisuhoidon), moksifloksasiini (antibiootti), psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävät psykoosilääkkeet).

Bicalutamid Orion ruuan ja juoman kanssa

Tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naisten ei pidä käyttää Bicalutamid Orion -tabletteja eikä sitä saa antaa raskaana oleville tai imettäville naisille.

Bicalutamid Orion saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Tämä vaikutus on mahdollisesti palautuva.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Huimausta tai uneliaisuutta voi toisinaan ilmetä, ja tällöin täytyy noudattaa varovaisuutta.

Auringonvalo tai ultraviolettisäteily (UV-säteily)

Vältä suoraa altistumista voimakkaalle auringonvalolle tai UV-säteilylle silloin, kun käytät Bicalutamid Orion -tabletteja.

Bicalutamid Orion sisältää laktoosia

Valmiste sisältää 57,4 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Bicalutamid Orion -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on yksi 50 mg tabletti kerran päivässä aina samaan ajankohtaan joka päivä (tavallisesti aamulla tai illalla).

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera.

Jos otat enemmän Bicalutamid Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohtat ottaa Bicalutamid Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan **välittömästi**, jos koet jotakin seuraavista haittavaikutuksista:

- vakava hengitysvaikeus, johon mahdollisesti liittyy kuumetta ja yskää. Jotkut potilaat voivat sairastua interstitiaalikeuhkokuumeeksi kutsuttuun keuhkotulehdukseen.
- voimakas kutina (johon liittyy rakkuloita) tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus, jotka aiheuttavat nielemisvaikeuksia
- verivirtsaisuus
- vatsakivut
- ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti).

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia tai jos sinulla on muita ongelmia lääkityksen kanssa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

- anemia
- huimaus
- rintarauhasten kasvu, rintojen arkuus
- kuumat aallot
- vatsakipu, pahoinvointi, ummetus
- verivirtsaisuus
- voimattomuus, turvotus.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- ripuli, ruuansulatushäiriöt, ilmavaivat
- hiustenlähtö, ihottuma, kutina, hikoilu, liikakarvaisuus, ihon kuivuminen
- sokeritauti, painonnousu, ruokahaluttomuus
- masennus, seksuaalisen halun väheneminen
- uneliaisuus, unettomuus
- sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta
- maksavaurio, maksaentsyymien nousu, keltaisuus
- erektiohäiriöt, impotenssi
- yleiset kivut, lantion seudun kivut, rintakipu, vilun tunne.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- yliherkkyysoireet, angioneuroottinen ödeema (esim. kasvojen, huulten ja nielun turvotus sekä hengitys- ja nielemisvaikeudet), nokkosihottuma
- verensokerin kohoaminen, painonlasku
- keuhkosairaus, hengenahdistus
- suun kuivuminen
- öinen virtsaamistarve
- päänsärky, selkävaikeudet, niskavaikeudet.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- oksentelu
- maksan vajaatoiminta
- valoherkkyysoireet.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- sydämen rytmihäiriöt ja johtumishäiriöt, muutokset EKG:ssä (QT-ajan pidentyminen), epänormaali sydänkäyrä
- verihyyntöjen väheneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Bicalutamid Orion -tablettien säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bicalutamid Orion -tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on bicalutamidi, jota yksi tabletti sisältää 50 mg.
- Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, povidoni K-29/32, krospovidoni, natriumlauryylisulfaatti ja magnesiumstearaatti.
- Kalvopäällysteen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (väriaine E171) ja makrogoli 4000.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoost

Bicalutamid Orion 50 mg tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia ja kalvopäällysteisiä. Tablettien toisella puolella on merkintä BCM 50.

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.5.2023

Bipacksedel: Information till användaren

Bicalutamid Orion 50 mg filmdragerade tabletter bicalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Bicalutamid Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamid Orion-tabletter
3. Hur du tar Bicalutamid Orion-tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bicalutamid Orion-tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bicalutamid Orion är och vad det används för

Tillväxt av prostatatumör beror på bl.a. manliga könshormoner eller androgenerna. Bicalutamid, det aktiva innehållsämnet i detta läkemedel, är en s.k. antiandrogen som hämmar en stimulerande effekt av naturliga androgener på tillväxten av prostatacancertumören.

Detta läkemedel används för behandling av prostatacancer tillsammans med annan behandling.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamid Orion-tabletter

Ta inte Bicalutamid Orion-tabletter

- om du är allergisk mot bicalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du använder vissa antihistaminer (terfenadin eller astemizol)
- om du använder magmedicin cisaprid.

Detta läkemedel får inte ges till kvinnor eller barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Bicalutamid Orion-tabletter,

- om du lider av leversjukdom
- om du har någon hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrymrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrymrubbningar kan vara förhöjd när man tar Bicalutamid Orion.
- om du har diabetes
- om du använder andra läkemedel. Tala om för läkare särskilt om du använder blodförtunnande läkemedel eller läkemedel som förhindrar blodet att koagulera
- om du tar Bicalutamid Orion, måste du och/eller din partner använda preventivmedel under behandling med Bicalutamid Orion och 130 dagar efter avslutad behandling. Tala med läkare om du har några frågor om preventivmedel.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Bicalutamid Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte

- terfenadin och astemizol (antihistaminer)
- cisaprid (magmedicin).

Effekten av vissa läkemedel eller av Bicalutamid Orion-tabletter kan förändras, eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör

- vissa blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin)
- ciklosporin (läkemedel som påverkar immunsystemet)
- kalciumhämmare (hjärt- och blodtrycksmediciner)
- cimetidin (läkemedel mot magsår)
- ketokonazol (läkemedel mot svampinfektion)
- midazolam (sömnmedicin).

Bicalutamid Orion-tabletter kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

Bicalutamid Orion med mat och dryck

Bicalutamid Orion kan tas antingen i samband med måltid eller på tom mage.

Graviditet, amning och fertilitet

Bicalutamid Orion ska inte användas av kvinnor och får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

Bicalutamid Orion kan ha en effekt på manlig fertilitet. Denna effekt är eventuellt reversibel.

Körförmåga och användning av maskiner

Svindel eller dåsighet kan ibland förekomma och då måste försiktighet iakttas.

Solljus eller ultraviolett ljus (UV-ljus)

Undvik exponering för mycket och/eller starkt solljus eller UV-ljus under behandling med Bicalutamid Orion-tabletter.

Bicalutamid Orion innehåller laktos

Läkemedlet innehåller 57,4 mg laktos (som monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Bicalutamid Orion-tabletter

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är en 50 mg tablett per dag alltid vid samma tidpunkt varje dag (vanligen på morgonen eller på kvällen).

Tabletterna ska sväljas hela, tillsammans med vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Bicalutamid Orion-tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Bicalutamid Orion-tabletter

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare eller uppsök medicinsk vård **omedelbart** om du upplever någon av följande biverkningar:

- allvarliga andningssvårigheter, möjligen med hosta eller feber. Vissa patienter kan drabbas av en typ av lunginflammation som kallas interstitiell lungsjukdom.
- allvarlig klåda (med blåsor) eller svullnad av ansikte, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja
- blod i urinen
- magsmärta
- gulaktig färg på huden och i ögonen.

Tala om för din läkare om du har haft några av följande biverkningar eller andra problem med din medicin.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- anemi
- svindel
- bröstförstoring, ömhet i bröstet
- blodvallningar
- magsmärtor, illamående, förstoppning
- blod i urinen
- kraftlöshet, svullnad.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- diarré, magbesvär efter måltiden, väderspänning
- håravfall, hudutslag, klåda, svettning, ökad hårväxt, torr hud
- sockersjuka, viktökning, aptitlöshet
- depression, nedsatt sexuell lust
- sömnhet, sömnlöshet
- hjärtinfarkt, hjärtinsufficiens
- leverskada, höjning av leverenzymvärden, gulsot
- erektionsproblem, impotens
- allmänna smärtor, smärtor i bäckenet, bröstsmärtor, känsla av kyla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- överkänslighetsreaktioner, angioneurotisk ödem (t.ex. svullnad av ansikte, läppar och svalg samt andnings- och sväljningssvårigheter), nässelutslag
- förhöjt blodsocker, viktninskning
- lungsjukdom, andfåddhet
- muntorka
- behov att urinera på natten
- huvudvärk, ryggont, ont i nacken.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- kräkningar
- leversvikt
- ljuskänslighetsreaktioner.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- retlednings- och rytmrubbningar, förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram), onormala EKG-fynd
- minskat antal blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Bicalutamid Orion-tabletter ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är bicalutamid, varav det finns 50 mg i en tablett.
- Hjälpmännen i tablettkärnan är laktosmonohydrat, povidon K-29/32, krospovidon, natriumlaurylsulfat och magnesiumstearat.
- Hjälpmännen i filmdrageringen är laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (färgämne E171) och makrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bicalutamid Orion 50 mg tablettorna är vita, runda, konvexa och filmdragerade. På ena sidan är tablettorna märkta med BCM 50.

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tabletter i genomtrycksförpackning.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte finns till försäljning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 19.5.2023