

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

**Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa
Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa
Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa**

morfiami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Oramorph on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oramorphia
3. Miten Oramorphia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oramorphin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oramorph on ja mielin sitä käytetään

Oramorph sisältää morfiinia, jolla on voimakas kipuja lievittävä vaikutus. Oramorphia käytetään valkeiden kiputilojen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oramorphia

Älä ota Oramorphia

- jos olet allerginen morfiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on akuutti vatsasairausr
- jos sinulla on suolen lamaantuminen
- jos sinulla on akuutti myrkytys tai akuutti astmakohtaus.

Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet ennen hoidon aloittamista:

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen Oramorph-valmisteen ottamista, jos:

- sinulla on astma tai jokin muu hengitysvaikeuksia aiheuttava sairaus
- sinulla on eturauhasen liikakasvua
- sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta
- sinulla on akuutti tai krooninen maksasairausr
- sinulla on munuaissairaus
- sinulla on sappikivitauti
- sinulla on epilepsia
- sinulla on suolistosairaus
- sinulla on sirppisolaututi
- sinulla on joskus ollut lääke- tai alkoholiriippuvuus

- olet joskus kärsinyt vaikeasta ihottumasta tai ihmisen kuoriutumisesta, rakkuloista ja/tai suun haavaumista otettuaasi Oramorphia tai muita opioideja

Varoitukset ja varotoimet hoidon aikana

Vakavat ihoreaktiot

Akuutista yleistyneestä eksantematoottisesta pustuloosista (AGEP) on raportoitu Oramorph-hoidon yhteydessä. Oireet ilmenevät yleensä kymmenen ensimmäisen hoitopäivän aikana. Lopeta Oramorph-valmisten käyttö ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos huomaat mitä tahansa seuraavista oireista: rakkuloiden muodostuminen, ihmisen laaja-alainen hilseily, märkivät näppylät yhdessä kuumeen kanssa.

Toleranssi, riippuvuus ja addiktio

Tämä lääke sisältää morfiinia, joka on opioidilääke. Opioidien toistuva käyttö voi heikentää lääkkeen tehoa (elimistö tottuu lääkkeeseen. Tälläista tottumista kutsutaan toleranssiksi). Oramorph-valmisten toistuva käyttö voi johtaa myös riippuvuuteen, väärinkäytöön ja addiktioon, jotka voivat johtaa hengenvaaralliseen yliannostukseen. Suurempi annos ja hoidon pidempi kesto voivat lisätä näiden haittavaikutusten riskiä.

Riippuvuudessa tai addiktiossa voi tuntua siltä, ettet enää hallitse, miten paljon tai miten usein lääkettä on otettava.

Riippuvuuden tai addiktion kehittymisen riski on eri ihmisiä erilainen. Voit olla suuremmassa riskissä tulla riippuvaiseksi Oramorph-valmisten tai addiktoitua sillä seuraavissa tapauksissa:

- olet tai joku perheenjäsenesi on joskus väärinkäytänyt alkoholia, reseptilääkeitä tai huumeita tai ollut niistä riippuvainen ("addiktio").
- tupakoit.
- sinulla on joskus ollut mielialaongelma (masennusta, ahdistuneisuutta tai persoonallisuushäiriö) tai olet saanut psykiatrista hoitoa johonkin muuhun psykykkiseen sairauteen.

Jos huomaat mitä tahansa seuraavista merkeistä Oramorph-valmisten käytön aikana, sinulle on saattanut kehittyä riippuvuus tai addiktio:

- tarvitset lääkettä pidempään kuin lääkäri on suositellut.
- tarvitset suositeltua suuremman annoksen
- käytät lääkettä muuhun kuin määrättyyn tarkoitukseen, esimerkiksi rauhoittumisen tai nukkumisen tukena.
- olet toistuvasti yritynyt lopettaa lääkkeen käytön tai säädä sen käyttöä siinä onnistumatta.
- kun lopetat lääkkeen käytön, tunnet olosi huonoksi ja voit paremmin, kun otat taas lääkettä (vieroitusoireet).

Jos huomaat jonkin näistä merkeistä, kerro asiasta lääkärille, jotta voitte keskustella sinulle sopivasta hoitolopusta, kuten siitä, milloin on sopiva hetki lopettaa ja miten se tehdään turvallisesti (ks. kohta 3 Jos lopetat Oramorph-valmisten käytön).

Lisääntynyt kipuherkkyys

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulle kehittyy lisääntynyt herkkyyttä kivulle siitä huolimatta, että käytät suurempia annoksia kipulääkettä. Lääkäri päättää, täytyykö annostasi muuttua vai täytyykö vahva kipulääkkeesi vaihtaa toiseen.

Unenaikaiset hengityshäiriöt

Oramorph voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (unenaikaisia hengityskatkoksia) sekä unenaikaista hypoksemiaa (veren alhainen happipitoisuus). Oireita voivat olla unenaikaiset hengityskatkokset, hengenahdistuksesta johtuva heräily, katkonainen uni tai päivisin esiintyvä voimakas uneliaisuus. Jos sinä tai joku toinen henkilö havaitsee näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi harkita annoksen pienentämistä.

Haimatulehdus ja sappitieongelmat

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee voimakasta ylävatsakipua, joka saattaa sääteillä selkään, pahoinvointia, oksentelua tai kuumetta, sillä nämä voivat olla haimatulehdusen (pankreatiitti) ja sappitieongelmien oireita.

Lisämunuaisten vajaatoiminta

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulle kehittyv heikotusta, väsymystä, ruokahaluttomuutta, pahoinvointia, oksentelua tai matalaa verenpainetta. Nämä voivat olla oireita siitä, että lisämunuaiset tuottavat liian vähän kortisolinitää hormonia, ja voi olla, että tarvitset hormonikorvaushoitoa.

Sukupuolihormonien tuotannon vähentyminen

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on seksuaalista haluttomuutta, impotenssia tai kuukautisten poisjäämistä. Nämä voivat johtua sukupuolihormonien tuotannon vähentymisestä.

Muut lääkevalmisteet ja Oramorph

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Muiden lääkkeiden, kuten esim. unilääkkeiden ja ahdistuneisuutta lievittävien lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa Oramorph-hoidon tehoon. Tämän vuoksi lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen muiden lääkkeiden samanaikaisen käytön aloittamista.

Tämä on erityisen tärkeää, jos otat jotakin seuraavassa mainituista lääkeistä tai seuraaviin sairauksiin tarkoitettuja lääkeitä:

- Rifampisiini esimerkiksi tuberkuloosin hoitoon
- Joidenkin verihyytymien hoidossa käytettävien lääkkeiden (esim. klopidogreeli, prasugreeli, tikagreloori) vaikutus saattaa viivästyä tai vähentyä, kun niitä käytetään yhdessä morfiinin kanssa.
- Oramorphin ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien tai vastaanivien lääkkeiden, samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä ja voi olla hengenvaarallista. Tämän vuoksi näiden lääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee harkita vain, kun muita hoitovaihtoehtoja ei ole. Jos lääkäri kuitenkin määräää sinulle Oramorphia rauhoittavien lääkkeiden kanssa, hänen on määrättää mahdollisimman pieni annos, ja samanaikainen hoito saa kestää vain hyvin lyhyen ajan. Kerro lääkärille kaikista rauhoittavista lääkeistä, joita käytät, ja noudata lääkärin annossuositusta tarkasti. Kerro ystävilleesi tai sukulaisillesi edellä mainituista merkeistä ja oireista, koska siitä voi olla hyötyä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle kehittyv näitä oireita.
- Gabapentiini tai pregabalini, jota käytetään epilepsian ja hermoperäisistä ongelmista johtuvan kivun hoitoon (neuropaattinen kipu).

Oramorph ruuan ja juoman kanssa

Alkoholia ei tule nauttia Oramorph-hoidon aikana, koska ne yhdessä käytettyinä voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Raskaus ja imetys

On mahdollista, että lääke voi vaikuttaa sikiöön. Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen valmisteen käyttöä raskauden aikana. Jos Oramorphia käytetään pitkään raskauden aikana, on olemassa riski, että vastasyntyneellä lapsella on lääkehoidon vieroitusoireita, jotka vaativat lääkärin hoitoa.

Morfiini erittyy äidinmaitoon, mutta sillä ei todennäköisesti ole vaikutusta imevään lapsseen. Lääkärin kanssa tulee kuitenkin neuvotella ennen Oramorph-valmisteen käyttöä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oramorph voi heikentää reaktiokykyä. Tämä tulee ottaa huomioon, kun vaaditaan tarkkaa huomiokykyä kuten esim. autoa ajettaessa.

3. Miten Oramorphia ote taan

Ota tätä läkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri keskustelee kanssasi ennen hoidon aloittamista ja säädöllisesti hoidon aikana siitä, mitä voit odottaa Oramorph käytöltä, milloin ja miten pitkään sitä on käytettävä, milloin on otettava yhteys lääkäriin ja milloin käyttö on lopetettava (ks. myös tässä osiossa kohta Jos lopetat Oramorphin ottamisen).

Ennen kerta-annosampullin avaamista, irroita se muista ampulleista. Kerta-annosampullit avataan väntämällä ylösosa olevista muovisiivekkeistä ampullin kärki irti. Oramorph voidaan ottaa esim. mehuun tai tuoremehuun sekoitettuna.

Jos otat enemmän Oramorphia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen ottaneille henkilöille voi tulla keuhkokkuume sen vuoksi, että heidän hengitysteihinsä on voinut joutua oksennusta tai vierasesineitä. Oireita voivat olla hengästyminen, yskä ja kuume.

Yliannostuksen ottaneilla henkilöillä voi olla myös hengitysvaikeuksia, jotka voivat johtaa tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan.

Jos unohdat ottaa Oramorphia

Jos unohdit ottaa annoksen, voit ottaa sen suunniteltua myöhemmin, jos lääkkeen otto on myöhästynyt enintään kaksi tuntia. Jos seuraava annos pitää ottaa alle kahden tunnin päästä, jätä unohtunut annos väliin ja jatka lääkkeen ottamista lääkärin määräyksen mukaisesti. Älä otta kaksinkertaista annosta korvatakseesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oramorphin ottamisen

Älä lopeta Oramorphin ottamista kysymättä ensin lääkärläsi neuvoa, koska lääkityksen äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Jos haluat lopettaa Oramorph-hoidon, kysy lääkärlä, miten hitaasti annosta tulee pienentää, jotta vältyisit vieroitusoireilta. Vieroitusoireita voivat olla esimerkiksi kivut eri puolilla kehoa, vapina, ripuli, mahakipu, pahoinvointi, flunssan kaltaiset oireet, nopea syke ja pupillien laajeneminen. Psykkisiä oireita ovat esimerkiksi voimakas tyytymättömyyden tunne, ahdistuneisuus ja ärtyneisyys.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Oramorph käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

- Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta.
- Vaikea ihoreaktio, jossa esiintyy rakkuloita, hilseilyä laajalla alalla, märkiviä näppylöitä yhdessä kuumeen kanssa. Kyseessä voi olla akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP).

Tavalliset: unelaisuus, väsymys, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, virtsaamisvaikeudet ja pupillien supistuminen.

Melko harvinaiset/harvinaiset: kutina, alhainen verenpaine (huimaus), hengitysvaikeudet, keuhkoputkien supistuminen, sappi- ja virtsateiden kouristus, epämiellyttävä olo.

Tuntemattomat: lisääntynyt kipuherkkyys, hikoilu, suun kuivuminen, uniapnea (hengityskatkokset unen aikana), vieroitusoireet tai riippuvuuus (katso oireet kohdasta 3: Jos lopetat Oramorphin ottamisen).

Haimatulehdukseen (pankreatiitti) ja sappiteiden ongelmuiin liittyvät oireet, kuten voimakas ylävatsakipu, joka saattaa säteillä selkään, pahoinvointi, oksentelu tai kuume.

Jos jotkut haittavaikutukset pahenevat tai havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Oramorphin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C:ssa. Suojattava valolta.

Älä käytä tästä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatun pakkauksen kelpoisusaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oramorph sisältää

- Oramorph-valmisteen vaikuttava aine on morfiini, morfiinisulfaattina. Yksi annos (5 ml) Oramorph 2 mg/ml oraaliliuosta kerta-annosampullissa sisältää on 7,5 mg morfiinia. Yksi annos (5 ml) Oramorph 6 mg/ml oraaliliuosta kerta-annosampullissa sisältää 22,5 mg morfiinia. Yksi annos (5 ml) Oramorph 20 mg/ml oraaliliuosta kerta-annosampullissa sisältää on 75 mg morfiinia.
- Muut aineet ovat natriumedetaatti, vedetön sitruunahappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko (-koot)

10 ja 30 kerta-annosampullia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67 Frazione Granatieri
I-50018 Scandicci (Firenze)
Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Abcur AB, Box 1452, SE-251 14 Helsingborg, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 7.12.2023

Bipacksedel: Information till användaren

**Oramorph 2 mg/ml oral lösning i endosampull
Oramorph 6 mg/ml oral lösning i endosampull
Oramorph 20 mg/ml oral lösning i endosampull**

morfín

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Oramorph är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oramorph
3. Hur du tar Oramorph
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oramorph ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oramorph är och vad det används för

Oramorph innehåller morfin, som har en kraftigt smärtstillande effekt. Oramorph används vid svår kronisk smärta.

2. Vad du behöver veta innan du tar Oramorph

Använd inte Oramorph

- om du är allergisk mot morfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- vid akut magsjukdom
- vid tarmförlamning
- vid akut förgiftning eller akut astmaanfall.

Sluta dock inte att ta medicinen utan att rådgöra med din läkare

Varningar och försiktighet innan behandlingen påbörjas:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Oramorph

- vid astma eller annan sjukdom som ger andningssvårigheter
- vid prostatahypertrofi
- vid sköldkörtelsjukdom
- vid akut eller kronisk leverjukdom
- vid njursjukdom
- vid gallsjukdom
- vid epilepsi
- vid tarmsjukdom
- vid sicklecellsjukdom
- om du någon gång har haft läkemedels- eller alkoholberoende
- om du någon gång har fått svåra hudutslag eller hudfjällningar, blåsor och/eller munsår efter att ha tagit Oramorph eller andra opioider.

Varningar och försiktighet under behandling

Allvarliga hudreaktioner

Akut generaliserad exantematos pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med behandling med Oramorph. Symtomen uppträder vanligtvis inom de första tio dagarna av behandlingen. Sluta omedelbart att använda Oramorph och sök läkarvård om du drabbas av något av följande symptom: blåsor, utbredd hudfjällning eller varfyllda prickar tillsammans med feber.

Tolerans, beroende och missbruk

Detta läkemedel innehåller morfin som är ett opioidläkemedel. Upprepad användning av opioidläkemedel kan leda till att dess effekt minskar (du blir tillvand, något som kallas tolerans). Upprepad användning av Oramorph kan också leda till beroende och missbruk, vilket kan leda till livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka vid högre dos och mer långvarig användning.

Beroende eller missbruk kan innebära att du känner att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta och hur ofta du behöver ta det.

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende eller missbruk av Oramorph om:

- du eller någon i din familj någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger ("missbruk")
- du är rökare
- du någonsin har haft problem med humöret (depression, ångest eller personlighetsstörning) eller har behandlats av psykiater för andra psykiska störningar.

Om du märker något av följande tecken medan du tar Oramorph kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende.

- du behöver ta läkemedlet under en längre tid än vad läkaren har ordinerat.
- du behöver ta mer än den rekommenderade dosen.
- du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren ordinerat, till exempel för att känna dig lugn eller för att få hjälp att sova.
- du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över läkemedelsanvändningen.
- när du slutar att ta läkemedlet kan du känna dig sjuk och mår bättre när du tar läkemedlet igen (utsättningssymtom).

Om du märker några av dessa tecken ska du tala med läkare för att diskutera den bästa behandlingsvägen för dig, samt när det är lämpligt att sluta och hur du ska sluta på ett säkert sätt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Oramorph).

Ökad smärtkänslighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever ökad smärtkänslighet trots att du tar ökande doser. Läkaren kommer att besluta om du måste ändra dos eller byta till ett annat starkt analgetikum (smärtstillande medel).

Sömnrelaterade andningsstörningar

Oramorph kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan bland annat vara andningsuppehåll under sömnen, uppvaknande nattetid på grund av andnöd, svårigheter att förbliffo sovande eller överdriven dåsighet under dagen. Om du eller någon annan noterar dessa symptom, kontakta din läkare. En dosminskning kan övervägas av din läkare.

Inflammation i bukspottkörteln och gallvägssymtom

Kontakta din läkare om du upplever svår smärta i övre delen av buken som eventuellt strålar ut i ryggen, illamående, kräkningar eller feber, eftersom detta kan vara symptom förknippade med

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) och gallvägssymtom.

Nedsatt funktion i binjurarna

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara ett symtom på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan därför behöva ta hormontillskott.

Sänkt produktion av könshormoner

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever förlust av libido, impotens eller uteblivna menstruationer. Detta kan bero på sänkt produktion av könshormoner.

Andra läkemedel och Oramorph

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel, t ex sömnmedel och ångestdämpande medel tas samtidigt. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

Detta är särskilt viktigt om du tar något av läkemedlen här nedan eller läkemedel för:

- Rifampicin för att t.ex. behandla tuberkulos
- Vissa läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. klopidogrel, prasugrel, ticagrelor) kan ha en fördjöld eller minskad effekt när de tas tillsammans med morfin.
- Samtidig användning av Oramorph och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller relaterade medel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma, och kan vara livshotande. Samtidig användning ska därför endast övervägas när andra behandlingsalternativ saknas. Om din läkare ordinerar Oramorph tillsammans med sedativa läkemedel ska dock läkaren begränsa dosen och tidslängden för den samtidiga behandlingen. Berätta för din läkare om alla sedativa läkemedel du tar, och följ noga läkarens dosrekommendation. Det kan vara till hjälp att be vänner eller släktingar vara uppmärksamma på de tecken och symtom som nämns här ovan.
Kontakta läkare när du upplever sådana symtom.
- Gabapentin eller pregabalin för behandling av epilepsi och smärta på grund av nervproblem (neuropatisk smärta).

Oramorph med mat och dryck

Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Oramorph, eftersom kombinationen kan ge andningssvårigheter.

Graviditet och amning

Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Oramorph under graviditet. Vid långtidsanvändning av Oramorph under graviditet finns det en risk för att det nyfödda barnet får läkemedelsutsättningssymtom (abstinens) som ska behandlas av läkare.

Morfin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Oramorph under amning

Körförmåga och användning av maskiner

Oramorph kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfället då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

3. Hur du tar Oramorph

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen kommer läkaren att diskutera med dig vad du kan förvänta dig av användningen av Oramorph, när och hur länge du behöver ta det, när du ska kontakta läkare och när du behöver sluta med behandlingen (se även ”Om du slutar att ta

Oramorph” i detta avsnitt).

Bryt loss en endosampull från de andra ampuller innan du öppnar den. Endosampullerna öppnas genom att man vrider av plastvingen på toppen. Oramorph kan blandas i t.ex saft eller juice.

Om du har tagit för stor mängd av Oramorph

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Personer som har tagit en överdos kan få lunginflammation av att dra ner kräkning eller främmande material i lungorna, med symtom såsom andfåddhet, hosta och feber.

Personer som har tagit en överdos kan också få andningssvårigheter som leder till medvetslöshet eller t.o.m. att de dör.

Om du har glömt att ta Oramorph

Om du har glömt att ta en dos, kan du ta den senare än planerat, om förseningen är högst två timmar. Om följande dos skall tas inom två timmar, skall du hoppa över den glömda dosen och fortsätta enligt läkarens ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Oramorph

Sluta inte ta Oramorph utan att först tala med din läkare, eftersom ett plötsligt avbrytande kan orsaka biverkningar. Avbryt inte behandlingen med Oramorph om du inte har avtalat detta med din läkare. Om du vill avbryta behandlingen med Oramorph, fråga läkaren hur man sänker dosen långsamt för att undvika abstinenssymtom. Abstinenssymtom kan bestå av värv i kroppen, skakningar, diarré, magsmärta, illamående, influensaliknande symtom, hjärtklappning och förstorade pupiller. I psykologiska symtom ingår en intensiv känsla av otillfredsställelse, ångest/oro och irritabilitet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta omedelbart att använda Oramorph och sök läkarvård om du upptäcker något av följande symtom:

- Allvarlig allergisk reaktion som ger svårighet att andas eller yrsel.
- Svåra hudreaktioner med blåsbildning, utbredd hudfjällning eller varfyllda prickar tillsammans med feber. Detta kan vara ett tillstånd som kallas akut generaliserad exantematos pustulos (AGEP).

Vanliga: Dåsighet, trötthet, förstopning, illamående, kräkningar, svårighet att kasta vatten, förminskning av pupillerna.

Mindre vanliga/sällsynta: Klåda, lågt blodtryck (svindel), andningssvårigheter, kramp i luftrören, kramper i gall- och urinvägarna, olustkänsla.

Ingen känd frekvens: Ökad smärtkänslighet, svettning, muntröret, sömnapsé (andningsuppehåll under sömnen), abstinenssymtom eller beroende (för symtom, se avsnitt 3: Om du slutar ta Oramorph). Symtom förknippade med inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) och gallvägarna, t.ex. svår smärta i övre delen av buken som eventuellt strålar ut i ryggen, illamående, kräkningar eller feber.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Hur Oramorph ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning är användbar 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är morfin i form av morfinsulfat. En dos (5 ml) Oramorph 2 mg/ml oral lösning i endosampull innehåller motsvarande 7,5 mg morfin. En dos (5 ml) Oramorph 6 mg/ml oral lösning i endosampull innehåller motsvarande 22,5 mg morfin. En dos (5 ml) Oramorph 20 mg/ml oral lösning i endosampull (5 ml) innehåller motsvarande innehåller 75 mg morfin.
- Övriga innehållsämnen är natriumedetat, vattenfri citronsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 eller 30 endosampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67 Frazione Granatieri
I-50018 Scandicci (Firenze)
Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Abcur AB, Box 1452, SE-251 14 Helsingborg, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 7.12.2023