

## **VALMISTEYHTEENVETO**

### **1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Oxyratio Depot 20 mg depottabletti  
Oxyratio Depot 40 mg depottabletti  
Oxyratio Depot 80 mg depottabletti

### **2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

Oxyratio Depot 20 mg depottabletti  
Yksi depottabletti sisältää 20 mg oksikodonihydrokloridia, mikä vastaa 17,9 mg:aa oksikodonia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi depottabletti sisältää enintään 6 mg sakkaroosia.

Oxyratio Depot 40 mg depottabletti  
Yksi depottabletti sisältää 40 mg oksikodonihydrokloridia, mikä vastaa 35,9 mg:aa oksikodonia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi depottabletti sisältää enintään 12 mg sakkaroosia.

Oxyratio Depot 80 mg depottabletti  
Yksi depottabletti sisältää 80 mg oksikodonihydrokloridia, mikä vastaa 71,7 mg:aa oksikodonia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi depottabletti sisältää enintään 23 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

### **3. LÄÄKEMUOTO**

Depottabletti

Oxyratio Depot 20 mg depottabletti:  
VaaLEANPUNAINEN, kaksiskupera, pitkänomainen depottabletti, jossa on kummallakin puolella ja-kouurre.

Oxyratio Depot 40 mg depottabletti:  
Oranssi, kaksiskupera, pitkänomainen depottabletti, jossa on kummallakin puolella jakouurre.

Oxyratio Depot 80 mg depottabletti:  
Keltainen, kaksiskupera, pitkänomainen depottabletti, jossa on kummallakin puolella jakouurre.

Depottabletit voidaan puolittaa.

### **4. KLIINISET TIEDOT**

#### **4.1 Käyttöaiheet**

Vaikea-asteinen kipu, jota pystytään riittävästi hallitsemaan vain opioidikipulääkkeillä.

Oxyratio Depot on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12 vuotta täytyneiden nuorten hoitoon.

## 4.2 Annostus ja antotapa

### Annostus

Annostus määritetään kivun voimakkuuden ja potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan.

Yleiset annostussuositukset ovat seuraavat:

#### Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

##### *Aloitusannos*

Aloitusannos on opioidihoitaa aiemmin saamattomille potilaalle tavallisesti 10 mg oksikodonihydrokloridia 12 tunnin välein. Joillekin potilaalle 5 mg:n aloitusannos on sopivampi haittavaikutusten esiintymisen minimoimiseksi.

Ennestään opioideja saavien potilaiden hoito voidaan aloittaa suuremmalla annostuksella ottaen huomioon heidän kokemuksensa aiemmista opioidihoidoista.

Sopivan annostuksen valintaan on saatavilla 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tai 80 mg oksikodonihydrokloridia sisältäviä depottabletteja.

Kontrolloitujen kliinisten tutkimusten mukaan 10–13 mg oksikodonihydrokloridia vastaa noin 20 mg:aa morfiinisulfaattia, kun molemmat ovat depotmuodossa.

Koska herkyydessä eri opioideille on yksilöllisä eroja, suositellaan, että muista opioideista Oxyratio Depot -depottabletteihin siirtyminen tehdään varovaisesti siten, että aluksi käytetään 50–75 %:a laskeutumisesta oksikodonianoksesta.

##### *Annosmuutokset*

Jotkut kiinteän aikataulun mukaisesti Oxyratio Depot -depottableteja käyttävät potilaat tarvitsevat varalääkkeeksi nopeasti lääkeainetta vapauttavia kipulääkkeitä läpilyöntikivun hoitoon. Oxyratio Depot -depottabletit eivät sovi akuutin kivun eivätkä läpilyöntikivun hoitoon. Yhden varalääkekertan annoksen tulee vastata kuudesosa Oxyratio Depot -depottablettien ekvianalgeettisesta vuorokausianoksesta. Jos varalääkettä joudutaan käyttämään useammin kuin kahdesti vuorokaudessa, Oxyratio Depot -depottablettien annostusta on syytä suurentaa. Annosta voidaan muuttaa enintään kerran 1–2 vuorokaudessa, kunnes saavutetaan vakaa annostus kahdesti vuorokaudessa.

Sen jälkeen, kun 12 tunnin välein otettava annos on suurennettu 10 mg:sta 20 mg:aan, annostuksen muutokset tulee tehdä siten, että vuorokausiannos muuttuu noin kolmanneksen. Tavoitteena on potilaalle yksilöllinen, kahdesti vuorokaudessa otettava annostus, jonka avulla saavutetaan riittävä kivunhallinta siedettävillä haittavaikutuksilla ja mahdollisimman vähällä varalääkityksellä niin pitkään kuin kivunhoito on tarpeen.

Useimille potilaalle sopii kiinteää aikataulua seuraava (12 tunnin välein) annostelu ja lääkeannoksen tasainen jakaminen (sama annos aamulla ja illalla). Joillekin potilaalle voi olla etua siitä, että annos jaetaan epätasaisesti.

Yleisesti tulee valita matalin tehokas annos. Kivun, joka ei liity pahanlaatuiseen sairauteen, hoidossa päiväannokseksi riittää yleensä 40 mg; mutta suurempia annoksia voidaan tarvita. Potilaat, joilla on syövästä johtuvaa kipua, voivat tarvita 80–120 mg:n annoksia, joita yksittäistapauksissa voidaan nostaa jopa 400 mg:aan. Jos tarvitaan vielä suurempia annoksia, annostus tulee päättää yksilöllisesti ja punnita hoidon teho verrattuna toleranssin kehittymisen ja haittavaikutusten riskiin.

##### Hoidon tavoitteet ja lopettaminen

Ennen Oxyratio Depot -hoidon aloittamista on sovittava yhdessä potilaan kanssa hoitosuositusten mukaisesta kivunhoitostrategiasta, mukaan lukien hoidon kesto, hoitotavoitteet ja hoidon lopettamisuunnitelma. Hoidon aikana lääkärin ja potilaan on oltava säännöllisesti yhteydessä, jotta hoidon jat-

kamista voidaan arvioida, hoidon lopettamista voidaan harkita ja annoksia voidaan muuttaa tarvittaessa. Kun oksikodonihito ei enää ole tarpeen, annoksen pienentäminen vähitellen voi olla aiheellista vieroitusoireiden väältämiseksi. Jos kipulääkitys ei tehoa toivotulla tavalla, on otettava huomioon ki-puherkkyyden, toleranssin ja taustalla olevan sairauden etenemisen mahdollisuus (ks. kohta 4.4).

#### Hoidon kesto

Oksikodonihitoa ei pidä jatkaa pidempään kuin on väältämätöntä

#### Läkkäät potilaat

Annostusta ei yleensä ole tarpeen muuttaa läkkäille potilaille, joilla ei ole maksan eikä munuaisten vajaatoiminnan kliinisä merkkejä.

#### Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Näillä potilailla aloitusannoksen suhteen on noudatettava konservatiivista lähestymistapaa. Suositeltua aikuisten aloitusannosta on pienennettävä 50 % (esimerkiksi 10 mg kokonaismuorokausiannos suun kautta potilailla, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet opioideja), ja jokaisen potilaan annosta säädetään kliinisen tilan mukaan, kunnes saavutetaan riittävä kivun hallinta.

#### Muihin riskiryhmiin kuuluvat potilaat

Riskiryhmiin kuuluville potilaille (esim. potilaat, joilla on pieni ruumiinpaino tai hidas lääkeainemetabolia), jotka eivät ole ennen saaneet opioidihitoa, tulee aluksi käyttää puolta suositellusta aikuisten annoksesta. Pienin valmisteyhteenvedossa suositeltu annos 10 mg ei siis välttämättä sovi aloitusannokseksi.

Annoksen suurentaminen on tehtävä yksilöllisen kliinisen tilanteen mukaisesti.

#### Pediatriset potilaat

Puutteellisten turvallisuutta ja tehoa koskevien tietojen vuoksi oksikodonia ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

#### **Antotapa**

Suun kautta.

Oxyratio Depot -depottabletit tulee ottaa säännöllisesti kahdesti vuorokaudessa määrätyn annostuksen mukaisesti.

Depottabletit voidaan ottaa ruokailuajoista riippumatta, riittävän nestemäärän kera. Depottabletit voi puolittaa. Oxyratio Depot -depottabletit tulee niellä, eikä niitä saa pureskella tai murskata.

### **4.3 Vasta-aiheet**

- Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Vaikea hengityslama, johon liittyy hypoksiaa ja/tai hyperkapniaa.
- Vaikea krooninen ahtauttava keuhkosairaus.
- Keuhkosydänsairaus (*Cor pulmonale*).
- Vaikea keuhkoastma.
- Paralyttinen ileus.
- Akuutti vatsa, gastropareesi.

### **4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa oksikodonia potilaille,

- joiden hengitystoiminta on vaikeasti heikentynt
- joilla on uniapnea
- jotka käyttävät keskushermosta lamaavia lääkkeitä (ks. alla sekä kohta 4.5)
- jotka käyttävät monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO:n estäjiä; ks. alla sekä kohta 4.5)
- joille on kehittynyt toleranssi, fyysinen riippuvuus tai vieroitusoireita (ks. alla)
- joilla on psyykkinen riippuvuus (ks. alla)
- jotka ovat heikkokuntoisia ja läkkääitä
- joilla on pään alueen vamma, kallonsisäisiä leesioita tai kohonnut kallonsisäinen paine, tai joiden tajunnan taso on tuntemattomasta syystä alentunut

- joilla on hypotensio
- joilla on hypovolemia
- joilla on epilepsia tai kouristusalttius
- joilla on haimatulehdus
- joilla on jokin ahtauttava tai tulehduksellinen suolistosairaus
- joilla on maksan vajaatoiminta
- joilla on munuaisten vajaatoiminta
- joilla on myksödeema
- joilla on kilpirauhasen vajaatoiminta
- joilla on Addisonin tauti (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta)
- joilla on eturauhasen liikasvua
- joilla on toksinen psykoosi
- joilla on *delirium tremens*
- joilla on ummetus
- joilla on jokin sappiteiden sairaus.

Jos potilaalla todetaan tai epäillään paralyyttinen ileus, on oksikodonihito heti keskeytettävä.

#### Hengityslama

Merkittävin opioidien liialliseen käyttöön liittyvä riski on hengityslama.

#### *Unenaikaiset hengityshäiriöt*

Opioideit voivat aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten sentraalista uniapneaa (CSA) ja unenai-kaista hypoksemiaa. Opioideiden käyttö suurentaa sentraalisen uniapnean riskiä annoksesta riippuvalla tavalla. Jos potilaalla esiintyy sentraalista uniapneaa, on harkittava opioidien kokonaisannoksen pienentämistä.

#### *Sedatiivisten lääkkeiden (kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden) samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit*

Opioideiden, mukaan lukien oksikodonihydrokloridin, ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden, samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi sedatiivisia lääkkeitä voidaan määräätä samanaikaisesti vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi. Jos potilaalle päätetään määräätä Oxyratio Depot -valmistetta samanaikaisesti sedatiivisten lääkkeiden kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen.

Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita (ks. kohta 4.5).

#### *Oxyratio Depot 80 mg depottabletit*

Oxyratio Depot 80 mg:n depottabletteja ei suositella opioidinaiveille potilaille, sillä tämä vahvuus voi johtaa henkeä uhkaavaan hengityslamaan.

#### MAO:n estäjät

Oksikonia on annettava varoen potilaille, jotka käyttävät MAO:n estäjiä tai jotka ovat kahden edellisen viikon aikana käyttäneet MAO:n estäjiä.

#### Toleranssi, fyysinen riippuvuus ja vieroitusoireet

Lääkkeen pitkääikäinen käyttö voi aiheuttaa toleranssin kehittymistä, ja kivun hallintaan voidaan tarvita yhä suurempia annoksia. Tämän valmisteen pitkittynyt käyttö saattaa aiheuttaa fyysisistä riippuvuutta ja äkillisen keskeyttämisen jälkeen saattaa ilmetä vieroitusoireyhtymä. Jos potilas ei enää tarvitse oksikodonihitoa, on suositeltavaa pienentää annosta vähitellen vieroitusoireiden väältämiseksi. Vieroitusoireina saattaa esiintyä haukottelua, mustuaisten laajentumista, kynnelnesteen eritystä, voimakasta vetistä nuhaa, vapinaa, voimakasta hikoilua, ahdistuneisuutta, kiihtymystä, kouristuksia, unettomuutta tai lihaskipuja.

### Opioidien käyttöhäiriö (väärinkäyttö ja riippuvuus)

Opioidien, kuten oksikodonin, toistuva käyttö voi aiheuttaa toleranssin kehitymistä ja fyysistä ja/tai psykkistä riippuvuutta.

Oxyratio Depot -valmisten toistuva käyttö voi johtaa opioidien käyttöhäiriöön (opioid use disorder, OUD). Suuremmilla annoksilla ja pidemmän aikaa annettu opioidihoitto voi lisätä opioidien käyttöhäiriön kehityksen riskiä. Oxyratio Depot -valmisten väärinkäyttö tai tahallinen virheellinen käyttö voi johtaa yliannostukseen ja/tai kuolemaan. Opioidien käyttöhäiriön (OUD) kehityksen riski on suurempi, jos potilaalla tai hänen perheessään (vanhemmilla tai sisaruksilla) on aiemmin esiintynyt pähitiden väärinkäyttöä (mukaan lukien alkoholin väärinkäyttöä), jos potilas tupakoi tai jos potilaalla on aiemmin esiintynyt muita mielenterveysongelmia (esim. vakavaa masennusta tai ahdistuneisuutta tai persoonallisuushäiriötä).

Ennen Oxyratio Depot -hoidon aloittamista ja hoidon aikana on sovittava yhdessä potilaan kanssa hoidon tavoitteista ja lopettamisesta (ks. kohta 4.2). Ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana potilaalle on myös tiedotettava opioidien käyttöhäiriön riskeistä ja oireista. Jos näitä oireita ilmenee, potilaasta on neuvottava ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Potilaita on seurattava pähdehakuisen käyttäytymisen havaitsemiseksi (esim. ennenaikaiset reseptin uusimispyyntö). Tähän sisältyy myös samanaikaisesti käytettyjen opioidien ja psykoaktiivisten lääkkeiden (kuten bentsodiatsepiinien) tarkistus. Jos potilaalla esiintyy opioidien käyttöhäiriön merkkejä ja oireita, on harkittava riippuuuden hoitoon erikoistuneen lääkärin konsultointia.

### Alkoholi

Oksikodonia ei pidä käyttää samanaikaisesti alkoholijuomien kanssa, sillä samanaikainen käyttö voi lisätä oksikodonin haittavaikutuksia.

### Väärinkäyttö

Jos Oxyratio Depot -depottabletteja pistetään päähtymistarkoituksessa laskimoon, tabletin apuaineet (etenkin talkki) voivat aiheuttaa paikallista kudosnekroosia, keuhkogranuloomia tai muita vakavia, mahdollisesti kuolemaan johtavia tapahtumia.

### Mahdollisesti kuolemaan johtavat oksikodoniannokset

Depottabletteja ei saa pureskella eikä murskata, koska tabletin depotominaisuudet voivat muuten vahingoittua. Pureskeltujen tai murskattujen tabletien nauttiminen aiheuttaa mahdollisesti tappavan suuren oksikodoniannoksen vapautumisen ja imeytymisen (ks. kohta 4.9).

### Kipuherkkyys

Kipuherkkyyttä, johon oksikodoniannoksen kasvattaminen ei auta, voi esiintyä hyvin harvoin, erityisesti suurilla annoksilla. Oksikodonin annoksen vähentäminen tai vaihto toiseen opioidiin saattaa olla tarpeen.

### Kirurgiset toimenpiteet

Oksikodonia ei suositella leikkauksen esilääkitykseksi, eikä käytettäväksi 12-24 tuntia leikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeisen Oxyratio Depot -hoidon tarkka aloitusajankohta riippuu leikkauksen typistä ja laajuudesta, valitusta anestesiamenetelmästä, muusta samanaikaisesta lääkityksestä ja potilaan yksilöllisestä tilanteesta, ja sen tulee perustua huolelliseen potilaskohtaiseen hyöty/riski-arvioon.

Oksikodonia, kuten muitakin opioidivalmisteita, on käytettävä varoen vatsaan liittyvien kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, koska opioidien tiedetään heikentävän suolen motilitettilä ja sitä ei saa käyttää ennen kuin lääkäri on vakuuttunut normaalista vatsan toiminnasta.

### Endokriiniset vaikutukset

Opioidit, kuten oksikodonihydrokloridi, saattavat vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin tai hypotalamus-aivolisäke-sukurauhasakseliin. Mahdollisia muutoksia ovat mm. seerumin prolaktiinipitoisuuden nousu ja plasman kortisol- ja testosteronipitoisuksien lasku. Nämä hormonaaliset muutokset saattavat aiheuttaa kliinisiä oireita.

### Maksan vajaatoiminta

Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita tulee seurata huolellisesti.

### Doping

Urheilijoiden on huomioitava, että tämä lääke saattaa aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtestissä. Oksikodonin käyttö dopingaineena voi olla haitallista terveydelle.

### Pediatriset potilaat

Puutteellisten turvallisuutta ja tehoa koskevien tietojen vuoksi Oxyratio Depot -depottabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

### Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää sakkarosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoos-i-imetymishäiriö tai sakkarooli-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tästä lääkettä.

## **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Additiivisen keskushermosta lamaavan vaikutuksen vuoksi sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentso-diatsepiinien ja vastaanosteen lääkkeiden, samanaikainen käyttö opioidien kanssa lisää sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman riskiä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoja on rajoitettava (ks. kohta 4.4).

Keskushermoston toimintaa lamaavia lääkeitä ovat esimerkiksi sedatiiviset lääkkeet, jotka eivät kuulu bentsodiatsepiineihin; unilääkkeet, psykoosilääkkeet, fentiatsiinit, neuroleptit, masennuslääkkeet, antihistamiinit, pahoinvoittilääkkeet ja muut opioidit.

Alkoholi voi voimistaa oksikodonin farmakodynamisia vaikutuksia, joten samanaikaista käyttöä on välttää.

MAO:n estäjillä tiedetään olevan yhteisvaikutuksia euporisoivien analgeettien kanssa. MAO:n estäjät aiheuttavat keskushermoston kiihtymystä tai lamaa, johon liittyy hypertensiivinen tai hypotensiivinen kriisi (ks. kohta 4.4). Oksikonia on käytettävä varoen potilaille, jotka saavat MAO:n estäjiä tai jotka ovat saaneet niitä kuluneen kahden viikon aikana (ks. kohta 4.4).

Oksikodonin samanaikainen anto serotonergisten valmisteiden, kuten selektiivisen serotoniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI), kanssa voi aiheuttaa serotoniinioireyhtymän, jonka oireita voivat olla psykkisen tilan muutokset (esim. levottomuuks, hallusinaatiot, kooma), autonomisen hermoston toimintahäiriö (esim. takykardia, labiili verenpaine, hypertermia), neuromuskulaariset poikkeavuudet (esim. hyperrefleksia, koordinaatiohäiriö, jäykkyys) ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvoitti, oksentelu, ripuli). Oksikodonin käytösä on noudatettava varovaisuutta, ja annostusta voi olla tarpeen pienentää näitä lääkeitä käyttäville potilaille.

Antikolinergisia ominaisuuksia omaavat lääkkeet (esim. psykoosilääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet, antihistamiinit, pahoinvoittilääkkeet, lihasrelaksantit, Parkinsonin taudin lääkkeet) saattavat tehostaa oksikodonin antikolinergisia haittaavaiktuksia, kuten ummetusta, suun kuivumista tai virtsamerityksen häiriötä.

Oksikodonin metaboloituu pääasiassa CYP3A4-isoentsyymin välityksellä. CYP2D6-isoentsyymi osallistuu metabolismiin. Näiden metaboliareittien aktiivisuus voi estyä tai lisääntyä useiden muiden samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden tai ravintoaineiden vaikutuksesta. Näitä yhteisvaikutuksia selitetään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

CYP3A4:n estäjät, kuten makrolidiantibiootit (esim. klaritromysiini, erytromysiini ja telitromysiini), atsoli-sienilääkkeet (esim. ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli ja posakonatsoli), proteaasin estä-

jät (esim. bosepreviiri, ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri ja sakinavii), simetidiini ja greippimehu, saattavat vähentää oksikodonin puhdistumaa, mikä saattaa johtaa oksikodonin lisääntyneisiin plasmapitoisuksiin. Siksi oksikodonin annosta saatetaan joutua muuttamaan vastaavasti.

Tarkempia esimerkkejä on annettu alla:

- Itrakonatsoli (voimakas CYP3A4:n estääjä) lisäsi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 200 mg suun kautta viiden vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 2,4 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,5 - 3,4).
- Vorikonatsoli (CYP3A4:n estääjä) lisäsi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 200 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (kaksi ensimmäistä annosta 400 mg) neljän vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 3,6 kertaa korkeampi (vaihteluväli 2,7 - 5,6).
- Telitromysiini (CYP3A4:n estääjä) lisäsi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 800 mg suun kautta 4 vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 1,8 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,3 - 2,3).
- Greippimehu (CYP3A4:n estääjä) lisäsi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 200 ml kolme kertaa vuorokaudessa viiden vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 1,7 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,1 - 2,1).

CYP3A4:n induktorit, kuten rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini ja mäkikuisma saattavat kiilptytää oksikodonin metabolismia ja lisätä oksikodonin puhdistumaa mikä saattaa johtaa pienempiin oksikodonin plasmapitoisuksiin. Oksikodonin annosta saatetaan joutua muuttamaan vastaavasti.

Tarkempia esimerkkejä on annettu alla:

- Mäkikuisma (CYP3A4:n induktori) vähensi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 300 mg kolmesti vuorokaudessa 15 vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 50 % alhaisempi (vaihteluväli 37-57 %).
- Rifampisiini (CYP3A4:n induktori) vähensi suun kautta otetun oksikodonin AUC-arvoa, kun sitä annettiin 600 mg kerran vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan. AUC oli keskimäärin 86 % alhaisempi.

Lääkkeet, jotka estävät CYP2D6:n aktiivisuutta, kuten paroksetiini ja kinidiini, saattavat vähentää oksikodonin puhdistumaa, mikä saattaa johtaa suurentuneisiin oksikodonin plasmapitoisuksiin.

Muiden isoentsyyminestäjien vaikutusta oksikodonin metabolismiin ei tunneta. Mahdolliset yhteisvaikutukset on syytä ottaa huomioon.

Kumariiniantikoagulantteja ja oksikodonia samanaikaisesti käytäneillä henkilöillä on havaittu INR-arvon (International Normalized Ratio) kliinisesti merkitseviä muutoksia kumpaankin suuntaan.

Tutkimuksia oksikodonin vaikutuksesta muiden lääkeaineiden CYP:n katalysoimaan metabolismiin ei ole tehty.

#### Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

## **4.6 He de Imällisyys, raskaus ja imetys**

Tämän lääkevalmisten käytööä imettävillä ja raskaana olevilla potilailla pitäisi välttää mahdollisuuden mukaan.

#### Raskaus

Oksikodonin käytöstä raskaana olevilla naisilla on vain rajoitetusti tietoa. Vastaanotteita, joiden äidit ovat käyttäneet opioideja 3-4 viikon aikana ennen synnytystä, pitää seurata hengityslaman varalta. Vieroitusoireita saattaa esiintyä vastasyntyneillä, joiden äitejä hoidetaan oksikodonilla.

### Imetys

Oksikodoni saattaa erityä äidinmaitoon ja voi aiheuttaa sedaatiota ja hengityslamaa imettävälle lapselle. Imettävien äitienvi ei siksi pidä käyttää oksikodonia.

### Hedelmällisyys

Oksikodonin vaikutuksista ihmisten hedelmällisyyteen ei ole olemassa tietoja. Rotilla suoritetuissa tutkimuksissa ei ole todettu vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

## 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Oksikodoni saattaa heikentää kykyä ajaa autolla tai käyttää koneita. Tämä on erityisen todennäköistä oksikodonihoidon alussa, annoksen suurentamisen tai lääkerotaation yhteydessä ja siinä tapauksessa, että oksikodonia käytetään yhdessä muiden keskushermiston toimintaa lamaavien aineiden kanssa.

Kun potilas käyttää tiettyä vakaata annosta, hoito ei väältämättä aiheuta rajoituksia. Tästä syystä potilaiden tulee neuvotella lääkärinsä kanssa siitä, onko ajaminen tai koneiden käyttö sallittua.

## 4.8 Haittavaikutukset

### Turvallisuusprofiilin yhteenvetö

Farmakologisten ominaisuuksien vuoksi oksikodoni saattaa aiheuttaa hengityslamaa, mioosia, bronkospasmia sekä sileän lihaksiston spasmeja ja yskänrefleksin estymistä.

Kaikista yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat pahoinvointi (etenkin hoidon alussa) ja ummetus.

Hengityslama on tärkein opioidyliannostukseen liittyvä riskitekijä ja sitä ilmenee yleisimmin iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat aiheuttaa vaikea-asteista hypotensiota tällaisille reaktioille herkillä potilailla.

### Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset esitetään seuraavassa taulukossa elinjärjestelmälukon ja yleisyyden mukaan ryhmiteltyinä:

Elinjärjestelmä	Hyvin yleinen ( $\geq 1/10$ )	Yleinen ( $\geq 1/100, < 1/10$ )	Melko harvinainen ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ )	Harvinainen ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ )	Hyvin harvinainen ( $< 1/10\ 000$ )	Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riittää esiintyvyyden arviointiin)
Infektiot				<i>Herpes simplex</i>		
Veri ja imukudos				Lymfadenopatia		
Immuni-järjestelmä			Yliherkkyyss			Anafylaktinen reaktio, anafylaktoidinen reaktio
Umpieritys			Antidiureettisen hormonin epäasi-anmukaisen erityksen oireyhtymä (SIADH)			
Aineenvaihdunta ja ravitsemus		Heikentynyt ruokahalu – ruokalahaluttomuus	Dehydraatio	Lisääntynyt ruokahalu		
Psyyykkiset häiriöt		Ahdistuneisuus, sekavuustila, masennus, vähentynyt aktiivisuus,	Agitaatio, affektilabilius, euforinen mieliala, havainnointihäiriöt (esim.			Aggressiivisuus

		levottomuus, psykomotorinen yliaktiivisuus, hermostuneisuus, unettomuus, tavallisesta poikkeavat ajatuksset	hallusinaatiot, de-realisaatio), heikentynyt libido, lääkeriippuvuus (ks. kohta 4.4)			
Hermosto	Uneliaisuus, se-daatio, huimaus, päänsärky	Vapina, letargia	Amnesia, kouristukset (etenkin henkilöillä, joilla on epileptisiä häiriötä tai taipumusta kouristuksiin), keskitymisvaikeudet, migreeni, hypertonias, tahattomat lihassupistukset, hypesthesia, koordinatiohäiriöt, puheen häiriöt, pyörtyminen, paresteesiat, dysgeusia			Hyperalgesia
Silmät			Nään heikkeneminen, mioosi, lakrimaatiohäiriöt			
Kuulo ja tasa-painoelin			Hyperakusia, heikentynyt kuulo, pyörrytys			
Sydän			Takykardia, palpi-taatiot (vieroitusoireyhtymän yhteydessä)			
Verisuonisto			Vasodilataatio	Hypotensio, ortostaattinen hypotensio		
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina		Dyspnea, bronkospasmit	Hengityslama, dysfonia, yskä, faryngiitti, riniitti			Sentraalinen uniapneaoireyhtymä
Ruoansulatuselimistö	Ummetus, oksentelu, pahoinvointi	Vatsakivut, ripuli, kuiva suu, hikka, dyspepsia	Suuun haavaumat, gingiviitti, stomaattiitti, dysfagia, ilmavaivat, röyhtäily, ileus	Meleena, hamppaisiin liittyvät häiriöt, ienvrenvuodot		Karies
Maksa ja sappi			Kohonneet maksa-entsyyymiavrot			Kolestaasi, sappikoliikki
Iho ja ihonalainen kudos	Kutina	Ihoreaktiot/ihottuma, harvoissa tapauksissa lisääntynyt valoherkkyyss, yksittäistapauksissa eksfoliatiivinen dermatiitti, liikahikoilu	Kuiva iho	Urtikaria		
Munuaiset ja virtsatiet		Dysuria, virtsaa-mispakko	Virtsaretentio	Hematuria		
Sukupuolielimet ja rinnat			Erektiohäiriöt, hypogonadismi			Amenorrea
Yleisoireet ja antopaiakassa todettavat haitat		Astenia, väsymys	Vilunväreet, vieroitusoireyhtymä, kipu (esim. rintakivut), huonovointisuus,	Painon nousu, painon lasku, selluliitti		Vastasynteen vieroitusoireyhtymä

			edeema, perifeerinen edeema, lääketoleranssi, janot			
Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot			Tapaturmien aiheuttamat vammat			

### Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

#### *Lääkeriippuvuus*

Lääkeriippuvuus voi kehittyä toistuvilla Oxyratio Depot -annoksilla, vaikka ne olisivat terapeuttisia. Lääkeriippuvuuden riskiin voivat vaikuttaa potilaan yksilölliset riskitekijät sekä opioidihoidon annostus ja kesto (ks. kohta 4.4).

#### Pediatriset potilaat

Alle 12-vuotiaiden potilaiden haittavaikutusten laadun, esiintyvyyden ja vaikeusasteen ei oleteta eroavan aikuisilla ja vähintään 12 vuotta täyttäneillä nuorilla todetuista.

Imeväisikäiset, joiden äidit saavat oksikodonia: ks. kohta 4.6.

#### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

### **4.9 Yliannostus**

#### Oireet

Mioosi, hengityslama, uneliaisuus, lihasjänteiden väheneminen, verenpaineen lasku ja toksinen leukoikenfalopatia on havaittu oksikodonin yliannostuksen yhteydessä. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä verenkiertokollapsia, stuporia, koomaa, bradykardiaa ja ei-kardiogeenistä keuhkopööhää. Voimakkaiden opioidien, kuten oksikodonin, pähdekeyttö suurina annoksina voi johtaa kuolemaan.

#### Hoito

Ensimmäiseksi on huolehdittava hengitysteiden avoimuudesta sekä ventilaatiohoidon aloittamisesta tai kontrolloidusta hengityksestä.

Yliannostustapauksessa voi olla aiheellista antaa laskimoon opiaattiantagonistia (esim. 0,4–2 mg naloksonia laskimoon). Kerta-annos toistetaan kliinisen tilanteen mukaan 2–3 minuutin välein. Naloksonia voidaan antaa myös laskimoinfusiona 2 mg 500 ml:ssa isotonista natriumkloridiliuosta tai 5-prosenttista glukoosiliuosta (naloksonia 0,004 mg/ml). Infusionopeus määritetään aiempien bolusinjektioiden ja potilaan vasteen perusteella.

Mahahuuhtelua voidaan harkita. Lääkehiilen käyttöä (50 g aikuisille, 10–15 g lapsille) voidaan harkita, jos suuren lääkeannoksen ottamisesta on aikaa enintään 1 tunti ja jos hengitystiet pystytään pitämään avoimina. Voi olla perusteltua olettaa, että lääkehiilen myöhäinenkin antaminen voi olla hyödyllistä depotvalmisteiden yliannostuksen yhteydessä. Tätä tukevia todisteita ei kuitenkaan ole.

Sopivan laksatiivin (esim. jonkin PEG-pohjaisen liuoksen) käyttö voi olla hyödyksi suoliston tyhjentämisessä.

Tarvittaessa tulee käyttää tukitoimia (esim. tekohengitystä, lisähappea, vasopressoreita ja infusiohointa), jos yliannostukseen liittyy verenkertosokki. Sydänpysähdyksen tai rytmihäiriöiden yhteydessä

voidaan käyttää sydämenhierontaa tai defibrillaatiota. Tarvittaessa tulee käyttää ventilaatiohoitoa sekä huolehtia vesi- ja elektrolyyttitasapainosta.

## 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

### 5.1 Farmakodynamika

Farmakoterapeutinen ryhmä: luonnolliset opiumalkaloidit, ATC-koodi: N02AA05

Oksikodonilla on affinitettilähteitä aivojen ja selkäytimen kappa-, myy- ja delta-opioidireseptoreihin. Se vaikuttaa näihin reseptoreihin opioidagonistina, eikä sillä ole antagonistivaikeutusta. Terapeutinen vaikutus on pääasiassa analgeettinen ja sedatiivinen. Väliittömästi vapautuvaan oksikodonin verrattuna depottablettimuodossa oleva oksikodon lievittää kipua ainoana lääkkeenä tai yhdessä muiden lääkeaineiden kanssa käytettyä huomattavasti pidempään, eikä sen käyttöön liity enempää haittavaikutuksia.

#### Umpieritys

Ks. kohta 4.4.

#### Ruoansulatuselimiintö

Opioidit voivat indusoida Oddin sulkijalihaksen spasmeja.

#### Pediatriset potilaat

Yhdeksästä klinisestä, farmakodynamisesta ja farmakokineettisestä tutkimuksesta saadut kokonais-turvallisuustiedot yhteensä 629 imeväisikäisestä ja lapsesta (ikähaarukka: 2 kk–17 vuotta) osoittavat suun kautta otettavan oksikodonin olevan hyvin siedetty pediatrisilla potilailla ja aiheuttavan vain vähäisiä, pääosin ruoansulatuskanavaan ja hermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Suun kautta otettavan oksikodonin positiiviset turvallisuustiedot on vahvistettu yhdeksässä tutkimuksessa, joissa 1 860 imeväisikäiselle ja lapselle annettiin oksikodonia bukkaalisesti, lihaksensisäisesti ja laskimonsisäisesti. Näissäkin tutkimuksissa osallistujat kokivat vain lieviä haittavaikutuksia, jotka olivat verrattavissa suun kautta otettavalla oksikodonilla havaittuihin haittavaikutuksiin.

Tutkimuksissa imeväisikäisille ja lapsille parenteraalisesti annetut oksikodonianokset vaihtelivat välillä 0,025 mg/kg–0,1 mg/kg. Näistä 0,1 mg/kg oli yleisin käytetty annos ja toiseksi yleisin oli 0,05 mg/kg. Laskimonsisäisesti annetut oksikodonianokset vaihtelivat välillä 0,025 mg/kg–0,1 mg/kg. Yleisin käytetty annos oli 0,1 mg/kg ja toiseksi yleisin 0,05 mg/kg. Lihaksensisäisesti annetut oksikodonianokset vaihtelivat välillä 0,02 mg/kg–0,1 mg/kg. Suun kautta annetut annokset vaihtelivat välillä 0,1 mg/kg (aloitusannos)–1,24 mg/kg/vrk. Bukkaalisesti annetu oksikodonianos oli 0,1 mg/kg.

Kaiken kaikkiaan näissä tutkimuksissa todetut oksikodonin haittavaikutukset imeväisikäisillä ja lapsilla näyttäisivät olevan yhdenmukaiset lukemattomissa, aikuisilla potilailla suoritetuissa tutkimuksissa todetun turvallisuusprofiilin kanssa. Yhtäkään uutta tai odottamatonta turvallisuussignaalia ei havaittu näissä tutkimuksissa. Kaikki raportoidut haittavaikutukset olivat yhdenmukaiset oksikodonin ja muiden vastaavien vahvojen opioidien tunnettujen turvallisuusprofiilien kanssa. Puutteellisten turvallisuus- ja tehotietojen vuoksi oksikodonia ei kuitenkaan suositella alle 12-vuotialle lapsille.

### 5.2 Farmakokinetiikka

#### Imeytyminen

Oxyratio Depot -depottablettien suhteellinen hyötyosuus vastaa väliittömästi vapautuvan oksikodonin hyötyosuutta. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan depottablettien oton jälkeen noin 4,5–7 tunnissa ja tavallisten tablettein oton jälkeen noin 1–1,5 tunnissa. Oksikodonin huippupitoisuus plasmassa ja pitoisuuden muutokset ovat depotvalmistetta ja väliittömästi lääkeainetta vapauttavaa valmistetta käytettäessä toisiaan vastaavat, kun depotvalmistetta otetaan 12 tunnin välein ja väliittömästi lääkeainetta vapauttavaa valmistetta 6 tunnin välein samana vuorokausiannoksena.

Runsaasti rasvaa sisältävän aterian nauttiminen ennen tabletten ottamista ei vaikuta oksikodonin huippupitoisuuteen eikä imetyymiseen. Depotabletteja ei saa pureskella eikä murskata, koska tabletin depotomaisuudet voivat vahingoittua ja oksikodonia voi vapautua liian nopeasti.

#### Jakautuminen

Depotmuodossa olevan oksikodonin absoluuttinen hyötyosuuus on noin 2/3 parenteraalisesti annetun annoksen hyötyosuudesta. Vakaassa tilassa oksikodonin jakautumisilavuus on 2,6 l/kg, plasman proteiineihin sitoutuminen 38–45-prosenttista, eliminaation puoliintumisaika 4–6 tuntia ja plasmapuhdistuma 0,8 l/min. Oksikodonin eliminaation puoliintumisaika on depottablettien yhteydessä 4–5 tuntia, ja vakaa tila saavutetaan keskimäärin 1 vuorokaudessa.

#### Biotransformaatio

Oksikodoni metaboloituu suolistossa ja maksassa P450-sytokromin välityksellä noroksikodoniks i ja oksimorfoniksi sekä useiksi glukuronidikonjugaateiksi. *In vitro*-tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että simetidiini ei terapeutisina annoksina vaikuttaisi oleellisesti noroksikodonin muodostumiseen. Ihmisellä kinidiini vähentää oksimorfonin muodostumista, mutta oksikodonin farmakodynamiiset ominaisuudet säilyvät suurelta osin muuttumattomina. Metaboliitit eivät vaikuta merkitsevästi farmakodynamiiseen kokonaisvaikutukseen.

#### Eliminaatio

Oksikodoni ja sen metaboliitit erittyvät virtsaan ja ulosteeseen. Oksikodoni läpäisee istukan ja erittyy äidinmaitoon.

#### Lineaarisuus

20, 40 ja 80 mg:n depottabletit ovat bioekvivalentteja suhteessa annoskokoon ja imetyyneeseen vaikeuttavan aineen määrään, ja niiden imetymisnopeudet vastaavat toisiaan.

### **5.3 Prekliinis et tiedot turvallis uudesta**

#### Lisääntymis- ja kehitystoksikologiset tiedot

Oksikodoni ei vaikuttanut hedelmällisyteen eikä alkioiden varhaiskehitykseen, kun sitä annettiin uros- ja naarasrotille enintään 8 mg/kg/vrk:n annoksina. Se ei myöskään aiheuttanut epämuodostumia, kun sitä annettiin rotille enintään 8 mg/kg/vrk:n annoksina tai kaneille 125 mg/kg:n annoksina. Kun kanin sikiötä tutkittiin yksilöllisesti, havaittiin kuitenkin kehitysvariaatioiden määrään annosriippuvaisista suurenemista (tavallista useammilla sikiöillä oli 27 presakraalista nikamaa tai ylimääräisiä kylkiluupareja). Kun näitä samoja parametrejä sen sijaan arvioitiin tilastollisesti poikueiden perusteella, vain 27 presakraalisen nikaman esiintyvyys oli suurentunut ja vain 125 mg/kg ryhmässä. Tämä annostaso aiheutti tiineille eläimille vaikeaa toksisuutta, joten sikiölöydökset olivat mahdollisesti toissijainen seuraus emojen kokemasta vaikeasta toksisuudesta.

Rotan pre- ja postnataalista kehitystä koskeneessa tutkimussa todettiin, että emojen paino ja syöntiä koskevat parametrit jäivät tavallista alhaisemmiksi annoksilla  $\geq 2$  mg/kg/vrk, kun tilannetta verrattiin kontrolliryhmään. Todettiin myös, että F1-sukupolven paino oli 6 mg/kg/vrk:n annoksilla pienempi kuin verrokkirrottien paino. Fyysisen kehityksen, heijaste- ja aistikekehityksen parametreissä ja käyttäytymisen ja lisääntymisen indekseissä ei todettu muutoksia F1-sukupolvessa (NOEL F1-pennulle oli 2 mg/kg/vrk ja kehon painoon vaikuttavia muutoksia todettiin annostasolla 6 mg/kg/vrk). Tutkimuksissa ei todettu vaikutuksia F2-sukupolveen.

#### Genotoksisuus

*In vitro*- ja *in vivo*-tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että genotoksisuuden riski ihmisiä olisi minimaalinen tai olematon sellaisilla oksikodonipitoisuksilla, jotka saavutetaan terapeutisin annoksin. Oksikodoni ei ollut genotoksinen bakteerien mutageenisuustestissä tai hiirten *in vivo*-mikrotumatestissä. Oksikodonilla saatuiin positiivinen vaste hiirillä suoritetussa *in vitro*-lymfoomatestissä, kun testissä käytettiin rotan maksan S9-fraktion metabolista aktivaatiota annostolla yli 25 µg/ml. Kaksi ihmisen lymfosyyteillä tehtävää *in vitro*-kromosomipoikkeavuustestiä suoritettiin. Ensimmäisessä oksikodonilla saatuiin negatiivinen tulos ilman metabolista aktivaatiota, mutta posi-

tiivinen tulos S9-fraktion metabolisella aktivaatiolla 24 tunnin kohdalla (mutta ei enää 48 tunnin kohdalla) altistumisen jälkeen. Toisessa tutkimuksessa oksikodonit ei osoittanut minkäänlaista klastogenisuutta metabolismen aktivaation kanssa tai ilman sitä, ja riippumatta käytetystä pitoisuudesta tai tutkimuksen ajankohdasta suhteessa altistukseen.

#### Karsinogeenisuus

Oksikodonin karsinogeenisuutta arvioitiin kaksi vuotta kestääneessä tutkimuksessa, jossa Sprague-Dawley-rotille annettiin läkettä suun kautta. Oksikodonit ei lisännyt kasvainten esiintyvyyttä uroeilä ja naarasrottilla annoksilla aina 6 mg/kg/vrk asti. Annoksia rajoittava tekijä oli opioideihin liittyvät farmakologiset vaikutukset.

## 6. FARMASEUTTISET TIEDOT

### 6.1 Apuaineet

*Tablettiyydin:*

Sokeripallot (sakkaroosi, maissitärkkelys)  
Hypromelloosi  
Makrogoli 6000  
Talkki  
Etyyliselluloosa  
Hydroksipropyylise lluloosa  
Propyleeniglykoli  
Magnesiumstearaatti  
Mikrokiteinen selluloosa  
Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

*Tabletin pääällyste:*

Oxyratio Depot 20 mg depottabletti  
Hypromelloosi  
Talkki  
Makrogoli 6000  
Titaanidioksidi (E 171)  
Punainen rautaoksidi (E 172)

Oxyratio Depot 40 mg depottabletti  
Hypromelloosi  
Talkki  
Makrogoli 6000  
Titaanidioksidi (E 171)  
Keltainen rautaoksidi (E 172)  
Punainen rautaoksidi (E 172)

Oxyratio Depot 80 mg depottabletti  
Hypromelloosi  
Talkki  
Makrogoli 6000  
Titaanidioksidi (E 171)  
Keltainen rautaoksidi (E 172)

### 6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

### **6.3 Kestoaika**

3 vuotta

### **6.4 Säilytys**

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

### **6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot**

Lapsiturvallinen alumiini/PVC/PVDC -läpipainolevy.

Pakkauskoot:

14 (vain 20 mg), 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 depottablettia.

Kerta-annos läpipainopakkaus, jossa repäisykatkoviivat

Pakkauskoko:

100 x 1 depottablettia.

HDPE-purkki, jossa polypropeenikierrekorkki

Pakkauskoot:

50, 100 ja 250 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle**

Ei erityisvaatimuksia.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Saksa

## **8. MYYNTILUVAN NUMEROT**

20 mg: 22390

40 mg: 22391

80 mg: 22392

## **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 8.11.2007

Viièmeisimmän uudistamisen päivämäärä: 21.12.2011

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

3.2.2023

## **PRODUKTRESUMÉ**

### **1. LÄKEMEDLETS NAMN**

Oxyratio Depot 20 mg depottabletter

Oxyratio Depot 40 mg depottabletter

Oxyratio Depot 80 mg depottabletter

### **2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

Oxyratio Depot 20 mg depottabletter

En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid i en mängd som motsvarar 17,9 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje depottablett innehåller högst 6 mg sackaros.

Oxyratio Depot 40 mg depottabletter

En depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid i en mängd som motsvarar 35,9 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje depottablett innehåller högst 12 mg sackaros.

Oxyratio Depot 80 mg depottabletter

En depottablett innehåller 80 mg oxikodonhydroklorid i en mängd som motsvarar 71,7 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje depottablett innehåller högst 23 mg sackaros.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

### **3. LÄKEMEDELSFORM**

Depottablett.

Oxyratio Depot 20 mg depottablett:

Ljusröd, bikonvex, avlång depottablett med brytskåra på bågge sidor.

Oxyratio Depot 40 mg depottablett:

Orange, bikonvex, avlång depottablett med brytskåra på bågge sidor.

Oxyratio Depot 80 mg depottablett:

Gul, bikonvex, avlång depottablett med brytskåra på bågge sidor.

Depottabletterna kan halveras.

### **4. KLINISKA UPPGIFTER**

#### **4.1 Terapeutiska indikationer**

Svår smärta som endast kan kontrolleras adekvat med opioidanalgetika.

Oxyratio Depot är avsett för behandling av vuxna och ungdomar som fyllt minst 12 år.

## 4.2 Dosering och administreringssätt

### Dosering

Doseringen beror på smärtans intensitet och patientens individuella svar på behandlingen.

Följande generellt rekommenderade dosering gäller:

#### Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

##### *Startdos*

Generellt är den initiala dosen för opioidbehandlingade patienter 10 mg oxikodonhydroklorid givet med 12 timmars intervall. Vissa patienter kan ha fördel av en startdos på 5 mg för att minimera incidensen av biverkningar.

Patienter som redan får opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, med iakttagande av patientens erfarenhet från tidigare opioidbehandling.

För val av lämplig dosering finns depottabletter med 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg oxikodonhydroklorid.

Enligt kontrollerade kliniska studier motsvarar 10–13 mg oxikodonhydroklorid ungefär 20 mg morfinsulfat, då bågge läkemedlen administreras som depotformuleringar.

På grund av individuella skillnader i känslighet för olika opioider rekommenderas att patienterna startar försiktigt med Oxyratio Depot depottabletterna efter konvertering från andra opioider på så vis att man inledningsvis använder 50–75 % av den beräknade oxikodondosen.

##### *Dosjustering*

Vissa patienter som intar Oxyratio Depot depottabletter enligt ett fast schema behöver snabbverkande analgetika som behovsmedicinering vid genombrottssmärta. Oxyratio Depot depottabletter är inte indikerade för behandling av akut smärta och/eller genombrottssmärta. En engångsdos av behovsmedicinering bör uppgå till 1/6 av den dagliga, ekvianalgetiska dosen av Oxyratio Depot depottabletter. Användning av behovsmedicinering mer än två gånger dagligen indikerar att dosen Oxyratio Depot depottabletter behöver ökas. Dosen bör inte justeras oftare än en gång per 1–2 dagar tills en stabil administrering två gånger dagligen har uppnåtts.

Efter en dosökning från 10 mg till 20 mg var tolfta timme bör dosjusteringar göras i steg om ungefär en tredjedel av den dagliga dosen. Målet är en patientspecifik dosering, administrerad två gånger dagligen, som möjliggör en adekvat smärtlindring med tolererbara biverkningar och så låg behovsmedicinering som möjligt under hela den tid som smärtlindring är nödvändig.

En jämn distribution (samma dos morgon och kväll) enligt ett fast schema (var tolfta timme) är lämpligt för majoriteten av patienterna. För vissa patienter kan det vara fördelaktigt med en ojämnn fördelning av doserna.

Generellt sett bör längsta effektiva dos väljas. Vid behandling av icke-malign smärta är i allmänhet en daglig dos på 40 mg tillräckligt; men högre dosering kan bli nödvändig. Patienter med cancerrelaterad smärta kan behöva doser på 80 till 120 mg, vilka i individuella fall kan ökas upp till 400 mg. Om ännu högre doser krävs bör dosen beslutas individuellt genom att balansera effekt mot riskerna för tolerans och biverkningar.

#### Behandlingsmål och utsättning av behandlingen

Innan behandling med Oxyratio Depot påbörjas ska en behandlingsstrategi som inkluderar behandlingstid och behandlingsmål, samt en plan för behandlingens avslut, överenskommas med patienten i enlighet med riktlinjer för smärthantering. Under behandlingen ska läkare och patient ha tät kontakt för att utvärdera behovet av fortsatt behandling samt ta ställning till utsättning och justering av dose-

ringen vid behov. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon kan det vara tillräddigt att trappa ned dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom. Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska möjlig hyperalgesi, tolerans och progression av underliggande sjukdom övervägas (se avsnitt 4.4).

#### Behandlingens längd

Oxikodon ska inte användas längre än nödvändigt.

#### Äldre patienter

Äldre patienter utan kliniska tecken på nedsatt njur- eller leverfunktion kräver vanligtvis ingen dosjustering.

#### Nedsatt njur- eller leverfunktion

Startdos bör väljas konservativt för dessa patienter. Startdosen bör vara halva den rekommenderade startdosen (t.ex. en daglig oral dos av 10 mg hos opioidbehandlade patienter) och döstrivering bör utföras så att tillräcklig smärtlindring uppnås i enlighet med den individuella kliniska situationen.

#### Övriga riskpatienter

Riskpatienter, t.ex. patienter med låg kroppsvikt eller långsam metabolism av läkemedel, bör initialt erhålla halva den rekommenderade vuxendosen om de är tidigare opioidbehandlade. Den minsta rekommenderade dosen på 10 mg lämpar sig inte nödvändigtvis som initaldos.

Döstrivering bör utföras i enlighet med den individuella kliniska situationen.

#### Pediatrisk population

På grund av bristfälliga data gällande säkerhet och effekt rekommenderas oxikodon inte till barn under 12 år.

#### **Administreringssätt**

Oral användning.

Oxyratio Depot depottabletterna ska tas regelbundet, två gånger dagligen enligt den dos som läkaren fastställt.

Depottabletterna kan tas oberoende av måltider, men ska alltid tas tillsammans med en tillräcklig mängd vätska. Oxyratio Depot depottabletterna kan halveras. Depottabletterna ska sväljas och man får inte tugga på, eller krossa dem.

### **4.3 Kontraindikationer**

- Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmäne som anges i avsnitt 6.1.
- Allvarlig andningsdepression med hypoxi och/eller hyperkapni.
- Allvarlig kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
- *Cor pulmonale*.
- Svår bronkialastma.
- Paralytisk ileus.
- Akut buk, gastropares.

### **4.4 Varningar och försiktighet**

Försiktighet måste iakttas vid administrering av dessa tabletter till patienter:

- med allvarligt nedsatt andningsfunktion
- med sömnapsné
- med samtidig användning av CNS-dämpande medel (se nedan och avsnitt 4.5)
- med samtidig användning av MAO-hämmare (se nedan och avsnitt 4.5)
- med tolerans, fysiskt beroende och abstinenssymtom (se nedan)
- med psykiskt beroende (missbruk) (se nedan)
- som är äldre och svaga
- med skallskada, intrakraniella lesioner eller ökat intrakraniellt tryck, sänkt medvetandegrad av osäkert ursprung

- med hypotension
- med hypovolemi
- med någon epileptisk störning eller predisposition för krampanfall
- med pankreatit
- med obstruktiv, inflammatorisk tarmsjukdom
- med nedsatt leverfunktion
- med nedsatt njurfunktion
- med myxödem
- med hypotyreos
- med Addisons sjukdom (binjurebarkinsufficiens)
- med prostatahypertrofi
- med toxisk psykos
- med *delirium tremens*
- med förstopning
- med någon sjukdom i gallvägarna.

Vid förekomst av, eller misstanke om, paralytisk ileus ska behandlingen med oxikodon omedelbart avbrytas.

#### Andningsdepression

Andningsdepression är den mest betydande risk som förknippas med opioider.

#### *Sömnrelaterade andningsstörningar*

Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom central sömnapné och sömnrelaterad hypoxemi. Risken för central sömnapné ökar med dosen. Överväg att minska den totala opioiddosen till patienter med central sömnapné.

#### *Risker förknippade med ett samtidigt bruk av sedativa läkemedel (såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel)*

Ett samtidigt bruk av opioider, inklusive oxikodonhydroklorid, och sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel, kan orsaka sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker kan denna typ av kombination endast ordinaras till patienter för vilka inga andra alternativ lämpar sig.

Om ett beslut om samtidig ordning av Oxyratio Depot och sedativa läkemedel fattas, ska minsta möjliga effektiva dos användas och behandlingstiden vara så kort som möjligt.

Patienten ska följas upp noggrant för eventuella tecken på andningsdepression eller sedering. I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och hens närmiljö om att vara uppmärksamma på dessa symptom (se avsnitt 4.5).

#### *Oxyratio Depot 80 mg depottabletter*

Oxyratio Depot 80 mg depottabletter rekommenderas inte till opioidnaiva patienter, eftersom denna styrka kan orsaka livshotande andningsdepression.

#### MAO-hämmare

Oxikodon ska administreras med försiktighet till patienter som tar MAO-hämmare eller som har fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna.

#### Tolerans, fysiskt beroende och abstinens

Vid långvarig administrering av läkemedlet kan patienterna utveckla tolerans, vilket gör att allt högre doser småningom krävs för att upprätthålla önskad analgetisk effekt. Ett långvarigt bruk av detta läkemedel kan också leda till fysiskt beroende, och abstinensbesvär kan därmed förekomma om behandlingen avbryts abrupt. För att undvika abstinensbesvär, kan det därför vara skäl att trappa ned dosen gradvis när patienten inte längre behöver behandling med oxikodon. Abstinensbesvären kan utgöras av t.ex. gäspningar, mydriasis, tårflöde, kraftig snuva, tremor, överdriven svettning, ångest, agitation, kramper, sömlöshet eller myalgi.

### Opioidbruksyndrom (missbruk och beroende)

Tolerans och fysiskt och/eller psykologiskt beroende kan utvecklas vid upprepad administrering av opioider som oxikodon.

Upprepad användning av Oxyratio Depot kan leda till opioidbruksyndrom. En högre dos och mer långvarig behandling kan öka risken för att utveckla opioidbruksyndrom. Missbruk eller avsiktlig felanvändning av Oxyratio Depot kan resultera i överdos och/eller dödsfall. Risken för att utveckla opioidbruksyndrom är förhöjd hos patienter med en personlig anamnes eller familjeanamnes (föräldrar eller syskon) på drogberoende (inklusive alkoholberoende), hos patienter som använder tobak eller hos patienter med andra psykiska sjukdomar i anamnesen (t.ex. egentlig depression, ångest och personlighetsstörningar).

Innan behandling med Oxyratio Depot påbörjas och under behandlingen ska behandlingsmål och en utsättningsplan överenskommas med patienten (se avsnitt 4.2). Före och under behandling ska patienten också informeras om riskerna för och tecknen på opioidbruksyndrom. Om sådana tecken uppstår ska patienten rådas att kontakta läkare.

Patienterna ska övervakas för tecken på drogsökande beteende (t.ex. för tidiga önskemål om påfyllning). Detta inkluderar en genomgång av opioider och psykoaktiva läkemedel (såsom bensodiazepiner) som används samtidigt. Hos patienter med tecken och symtom på opioidbruksyndrom ska konsultation med en beroendespecialist övervägas.

### Alkohol

En samtidig användning av alkohol och oxikodon ska undvikas, eftersom ett samtidigt bruk kan öka biverkningarna orsakade av oxikodon.

### Missbruk

Om detta läkemedel används i missbruksyfte som parenteral, intravenös injektion, kan tabletternas hjälpmänna (särskilt talket) leda till lokal vävnadsnekros, lunggranulom eller andra allvarliga och potentiellt dödliga reaktioner.

### Potentiellt dödlig dos av oxikodon

Depottabletterna får varken tuggas på eller krossas, eftersom detta kan skada preparatets depotegenskaper. Tuggade eller krossade depottablett med oxikodon kan leda till frisättning och upptag av potentiellt dödliga mängder oxikodon (se avsnitt 4.9).

### Hyperalgesi

I mycket sällsynta fall, och särskilt då i samband med höga doser, kan en ökad smärtkänslighet, som inte reagerar på ökade doser, uppkomma. I sådana fall kan en minskning av oxikondoden eller ett byte till någon alternativ opioid krävas.

### Kirurgiska ingrepp

Bruk av oxikodon som premedicinering inför kirurgiska ingrepp rekommenderas ej, och bruk inom 12–24 timmar efter ett kirurgiskt ingrepp rekommenderas inte heller. Exakt tidpunkt för när en postoperativ behandling med Oxyratio Depot kan sättas in ska bestämmas på basen av en individuell risk/nytta-bedömning som tar hänsyn till typ och omfattning av det kirurgiska ingreppet, den anestesimethod som används, övrig samtidig medicinering och patientens allmänna tillstånd.

I likhet med alla opioider ska oxikodonpreparat användas med försiktighet i samband med bukkirurgiska ingrepp, eftersom de är kända för att försämra tarmmotiliteten. Denna typ av läkemedel får inte användas förrän läkare konstaterat att tarmen fungerar som normalt igen.

### Endokrina effekter

Opioider, såsom oxikodonhydroklorid, kan påverka hypotalamus-hypofys-binjurebark- eller gonadaxeln. Möjliga förändringar som kan observeras omfattar en ökning av serumprolaktin samt en minskning av plasmakortisol och -testosteron. Kliniska symtom kan uppkomma till följd av dessa hormonella förändringar.

### Leverinsufficiens

Patienter med svår leverinsufficiens ska observeras noggrant.

### Dopingvarning

Idrottare bör observera att detta läkemedel kan ge positivt resultat vid dopingtest. Ett bruk av oxikodon i dopingsyfte kan vara farligt för hälsan.

### Pediatrisk population

På grund av bristfälliga data gällande säkerhet och effekt rekommenderas Oxyratio Depot inte till barn under 12 år.

### Hjälpmännen

Detta läkemedel innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärfliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukrasisomaltasbrist.

## **4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

Ett samtidigt bruk av opioider och sedativa läkemedel, som bensodiazepiner och liknande, leder p.g.a. den additiva centraldepressiva effekten till en ökad risk för sedering, andningsdepression, koma och död. Såväl dosering som samtidig behandlingstid bör begränsas (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet är bl.a. sedativa som inte tillhör bensodiazepinerna, hypnotika, antipsykotika, fentiaziner, neuroleptika, antidepressiva, antihistaminer, antiemetika och övriga opioider.

Alkohol kan förstärka de farmakodynamiska effekterna av oxikodon och ett samtidigt bruk ska därför undvikas.

MAO-hämmare har kända interaktioner med euforiserande analgetika, och de orsakar då antingen CNS-excitation eller -depression, vilket förknippas med hyper- eller hypotensiv kris som följd (se avsnitt 4.4). Oxikodon ska användas med försiktighet vid behandling av patienter som tar MAO-hämmare eller som använt sådana läkemedel under de senaste två veckorna (se avsnitt 4.4).

En samtidig användning av oxikodon och serotonerga läkemedel, som t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), kan leda till uppkomsten av serotonerg syndrom med symptom som förändringar i det psykiska tillståndet (t.ex. rastlöshet, hallucinationer, koma), störningar i det autonoma nervsystems funktion (t.ex. takykardi, labilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära avvikelse (t.ex. hyperreflexi, koordinationsstörningar, stelhet) och/eller symptom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Försiktighet ska iakttas vid bruk av oxikodon, och det kan vara skäl att minska dosen för patienter som samtidigt använder ovan nämnda läkemedel.

Läkemedel med antikolinergisk effekt (t.ex. antipsykotika, tricykliska antidepressiva, antihistaminer, antiemetika, muskelrelaxantia, läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom) kan intensifiera de antikolinergiska biverkningarna av oxikodon, såsom förstopning, munorrhet eller störningar i urinsekretionen.

Oxikodon metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4, med bidrag av CYP2D6. Aktiviteterna hos dessa metabolismvägar kan hämmas eller induceras av flera olika läkemedel eller näringssämnen om de administreras samtidigt. Dessa interaktioner förklaras närmare i följande avsnitt.

CYP3A4 hämmare, såsom makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, och telitromycin), azoler (d.v.s. svampmedel som t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, och posaconazol), proteashämmare (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir och sakvinavir), cimetidin och grapefruktjuice kan minska clearance av oxikodon, vilket å sin sida kan leda till en ökning av

plasmakoncentrationen av oxikodon. Därför kan en motsvarande justering av oxikodondosen vara nödvändig.

Några specifika exempel ges nedan:

- Efter fem dagars oral administrering av 200 mg itrakonazol (en potent CYP3A4 hämmare) en gång dagligen ökade AUC för oralt oxikodon. I medeltal var AUC ungefär 2,4 gånger högre (intervall: 1,5–3,4).
- Efter fyra dagars oral administrering av 200 mg vorikonazol (en CYP3A4 hämmare) två gånger dagligen (första dagen 2 x 400 mg) ökade AUC för oralt oxikodon. I medeltal var AUC ungefär 3,6 gånger högre (intervall: 2,7–5,6).
- Efter fyra dagars oral administrering av 800 mg telitromycin (en CYP3A4 hämmare) en gång dagligen ökade AUC för oralt oxikodon. I medeltal var AUC ungefär 1,8 gånger högre (intervall: 1,3–2,3).
- Efter fem dagars administrering av 200 ml grapefruktsaft (en CYP3A4 hämmare) tre gånger dagligen ökade AUC för oralt oxikodon. I medeltal var AUC ungefär 1,7 gånger högre (intervall: 1,1–2,1).

CYP3A4 inducerande medel, såsom rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört, kan inducera metabolismen av oxikodon och orsaka ett ökat clearance av läkemedlet, vilket leder till en sänkt koncentration av oxikodon i plasma. En motsvarande justering av oxikodondosen kan därför behövas.

Några specifika exempel ges nedan:

- Efter femton dagars administrering av johannesört i doser på 300 mg (en CYP3A4 inducerare) tre gånger dagligen, minskade AUC för oralt oxikodon i medeltal med 50 % från det normala (intervall: 37–57 %).
- Efter sju dagars administrering av rifampicin 600 mg (en CYP3A4 inducerare) en gång dagligen minskade AUC för oralt oxikodon. I medeltal var AUC då 86 % lägre än normalt.

Läkemedel som hämmar aktiviteten hos CYP2D6, såsom paroxetin och kinidin, kan orsaka minskat clearance av oxikodon, vilket å sin sida kan leda till en ökad koncentration av oxikodon i plasma.

Effekten av andra isoenzymhämmare på metabolismen av oxikodon är inte känd. Risken för potentiella interaktioner bör tas i beaktande.

Kliniskt relevanta förändringar i International Normalised Ratio (INR) i bågge riktningarna har observerats hos personer som samtidigt använt kumarinantikoagulatia och oxikodon.

Inga studier i vilka man skulle ha undersökt de möjliga effekterna av oxikodon på CYP-katalyserad metabolism av andra läkemedel har utförts.

#### Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

## **4.6 Fertilitet, graviditet och amning**

Användning av denna produkt ska i mån av möjlighet undvikas till gravida eller ammande kvinnor.

#### Graviditet

Erfarenhet av behandling med oxikodon under graviditet är begränsad. Nyfödda barn till mödrar som har fått opioider under de senaste 3–4 veckorna före förlossning bör kontrolleras med avseende på andningsdepression. Oxikodonbehandling hos modern kan leda till abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.

#### Amning

Oxikodon kan utsöndras i bröstmjölk, och framkalla sedering och andningsdepression hos barn som ammas. Oxikodon bör därför inte användas under amning.

## Fertilitet

Humandata gällande oxikodons eventuella inverkan på fertiliteten saknas. Studier på råttor har inte visat på några effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

## **4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Oxikodon kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta är särskilt sannolikt i början av behandlingen med oxikodon, i samband med dosökningar eller produktrotation och om oxikodon kombineras med något annat CNS-depressivt medel.

Patienter som är stabila på en särskild dosering behöver inte nödvändigtvis begränsas. Patienten bör därför rådfråga sin läkare om huruvida det är tillåtet att framföra fordon och använda maskiner.

## **4.8 Biverkningar**

### Sammanfattning av biverkningsprofilen

På grund av de farmakologiska egenskaperna kan oxikodon orsaka andningsdepression, mios, bronkospasmer och spasmer i glatt muskulatur och kan hämma hostreflexen.

De allra oftast rapporterade biverkningarna är illamående (särskilt i början av behandlingen) och förstopning.

Den allra allvarligaste risken vid överdosering av opioider är andningsdepression och detta förekommer främst hos äldre eller svaga patienter. Opioider kan orsaka allvarlig hypotension hos personer med tendens till detta.

### Biverkningstabell

Biverkningarna presenteras i nedanstående tabell grupperade enligt organ system och förekomst.

Organsystem	Mycket vanliga ( $\geq 1/10$ )	Vanliga ( $\geq 1/100$ , $< 1/10$ )	Mindre vanliga ( $\geq 1/1\ 000$ , $< 1/100$ )	Sällsynta ( $\geq 1/10\ 000$ , $< 1/1\ 000$ )	Mycket sällsynta ( $< 1/10\ 000$ )	Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
Infektioner och infestationer				<i>Herpes simplex</i>		
Blodet och lymfssystemet				Lymfadenopati		
Immun-system-sjukdomar			Överkänslighet			Anafylaktiska reaktioner, anafylaktoida reaktioner
Endokrina systemet			Inadekvat ADH-sekretion (SIADH)			
Metabolism och nutrition		Minskad aptit – aptit-löshet	Dehydrering	Ökad aptit		
Psykiatriska sjukdomar		Ängest, förvirrings-tillstånd, depression, minskad aktivitet, rastlöshet, psykomotorisk hyperaktivitet, nervositet,	Agitation, affektlabilitet, euforiskt sinnelag, uppfattningsstörningar (t.ex. hallucinationer, derealisering), minskad libido,			Aggressivitet

		sömnlöshet, avvikande tankegångar	läkemedels- beroende (se avsnitt 4.4)			
Centrala och perifera nervsystemet	Somnolens, sedering, svindel, huvudvärk	Tremor, letargi	Amnesi, krämper (särskilt hos personer med någon epileptisk störning eller tendens till krämper), koncentrations- svårigheter, migrän, hypertoni, ofrivilliga muskel- sammandra- ningar, hypesesi, koordinations- rubbnings- talstörningar, svimning, parestesier, dysgeusi			Hyperalgesi
Ögon			Försämrat syn, mios, lakrimations- störning			
Sjukdomar i öron och balansorgan			Hyperakusi, nedsatt hörsel, yrsel			
Hjärt- sjukdomar			Takykardi, palpitationer (i samband med abstinens- syndrom)			
Vaskulära sjukdomar			Vasodilatation	Hypotension, ortostatisk hypotension		
Respiratoriska, torakala och mediastinala sjukdomar		Dyspné, bronko- spasmer	Andnings- depression, dysfoni, hosta, faryngit, rinit			Central sömnapné- syndrom
Magtarm- kanalen	Förstopp- ning, kräkningar, illamående	Buksmärtor, diarré, muntorrhett, hicka, dyspepsi	Sår i munnen, gingivit, stomatit, dysfagi, flatulens, rapningar, ileus	Melena, störningar i tänderna, blödningar från tandköttet		Tandkaries
Lever och gallvägar			Förhöjda leverenzym- värden			Kolestas, gallkolik
Sjukdomar i hud och subkutan vävnad	Kläda	Hudreaktioner / hudutslag, i sällsynta fall ökad ljus- känslighet, i enstaka fall exfoliativ	Torr hud	Urtikaria		

		dermatit, hyperhidros				
Njur- och urinvägs- sjukdomar		Dysuri, urinträng- ningar	Urinretention	Hematuri		
Sjukdomar i fortplantnings- systemoch bröst			Erekitions- störningar, hypogonadism			Amenorré
Allmänna sjukdomar och tillsstånd på administre- ringsstället		Asteni, trötthet	Frossa, abstinens- syndrom, smärta (t.ex. brösts märta), sjukdoms- känsla, ödem, perifert ödem, läkemedels- tolerans, törst	Viktökning, viktminsk- ning, cellulit		Neonatalt abstinens- syndrom,
Skador, förgiftningar och behandlings- komplikationer			Skador orsakade av olycksfall			

#### Beskrivning av valda biverkningar

##### *Läkemedelsberoende*

Upprepad användning av Oxyratio Depot kan leda till läkemedelsberoende, även vid terapeutiska doser. Risken för läkemedelsberoende kan variera beroende på patientens individuella riskfaktorer, dosering och opioidbehandlingens längd (se avsnitt 4.4).

##### Pediatrisk population

Frekvens, typ och allvarlighetsgrad av biverkningar hos patienter under 12 år förväntas inte skilja sig från dem hos vuxna och ungdomar som fyllt minst 12 år.

Angående spädbarn till mödrar som tar oxikodon, se avsnitt 4.6.

##### Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea.

Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

## 4.9 Överdosering

##### Symtom

Miosis, andningsdepression, dåsighet, reducerad muskeltonus, blodtrycksfall och toxisk leukoencefalopati har observerats vid överdosering av oxikodon. I svåra fall cirkulatorisk kollaps, stupor, koma, bradykardi och icke-kardiogen lungödem. Miss bruk av höga doser av starka opioider, som oxikodon, kan vara dödligt.

##### Behandling

Först och främst ska fastställande av patientens luftvägar och upprättande av assisterad eller kontrollerad ventilation ombesörjas.

I händelse av överdosering kan en intravenös administrering av någon opiatantagonist (t.ex. 0,4–2 mg intravenöst naloxon) vara indikerad. Administrering av dessa engångsdoser upprepas i intervaller om 2–3 minuter beroende på den kliniska situationen. Dessutom kan en intravenös infusion på 2 mg naloxon i 500 ml isoton natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning (motsvarande 0,004 mg naloxon/ml) ges. Infusionshastigheten ska justeras enligt de tidigare bolusinjektionerna och svaret hos patienten.

Ventrikelsköljning kan övervägas. Aktivt kol kan övervägas (50 g för vuxna, 10–15 g för barn) inom en timme efter intag av en omfattande mängd läkemedel och under förutsättning att öppna luftvägar kan upprätthållas. Det kan vara rimligt att anta att även en sen administrering av aktivt kol kunde vara fördelaktigt vid överdosering av depotberedningar, men det finns dock inga bevis som stödjer detta.

För att skynda på passagen genom tarmsystemet, kan ett lämpligt laxermedel (t.ex. en PEG-baserad lösning) vara användbart.

Stödjande åtgärder (såsom konstgjord andning, syretillförsel, administrering av kärlsammandragande medel och infusionsterapi) ska, om nödvändigt, tillämpas vid fall av åtföljande cirkulatorisk chock. Vid hjärtstillestånd eller hjärtarytmier kan hjärtkompressioner eller defibrillering vara indikerade. Om nödvändigt, andningshjälp samt underhåll av vatten- och elektrolytbalans.

## 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

### 5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Naturliga opiumalkaloider  
ATC-kod: N02AA05

Oxikodon visar affinitet till kappa-, my- och delta-opioidreceptorer i hjärna och ryggmärg. Oxikodon inverkar som en opioidagonist utan antagonistisk effekt på dessa receptorer. Den terapeutiska effekten är huvudsakligen smärtlindrande och sederande. Jämfört med snabbfrisättande oxikodonpreparat som ges ensamt eller i kombination med andra substanser, ger depottableterna smärtlindring under en påtagligt längre period utan någon ökad biverkningsfrekvens.

#### Endokrina systemet

Se avsnitt 4.4.

#### Magtarmkanalen

Opioider kan inducera spasmer i Oddis sfinkter.

#### Pediatrisk population

De säkerhetsdata som samlats in från totalt 629 spädbarn och barn (ålder: 2 månader–17 år) under 9 kliniska, farmakodynamiska och farmakokinetiska prövningar med oralt administrerat oxikodon har visat att oralt oxikodon är vältolererat hos pediatriska patienter och endast orsakar mindre biverkningar som främst riktar sig mot magtarmkanalen och nervsystemet. De positiva säkerhetsdata som setts med oralt oxikodon har bekräftats i 9 studier med buckalt, intramuskulärt och intravenöst administrerat oxikodon hos totalt 1 860 spädbarn och barn, vilka också upplevt endast lindriga biverkningar jämförbara med dem som sett vid användning av oralt administrerat oxikodon.

De parenterala oxikondosser som gavs till spädbarnen och barnen i de kliniska prövningarna var mellan 0,025 mg/kg och 0,1 mg/kg. Den allra vanligaste dosen var 0,1 mg/kg, följt av 0,05 mg/kg. De intravenösa doserna varierade mellan 0,025 mg/kg och 0,1 mg/kg. 0,1 mg/kg var vanligast, följt av 0,05 mg/kg. De intramuskulära doserna varierade mellan 0,02 mg/kg och 0,1 mg/kg. De orala doserna varierade mellan 0,1 mg/kg (startdos) och 1,24 mg/kg/dag. De buckalt administrerade doserna var 0,1 mg/kg.

Totalt sett var biverkningarna i dessa oxikodonstudier hos spädbarn och barn i linje med den kända säkerhetsprofil som konstaterats på basen av ett stort antal kliniska prövningar hos vuxna. Inga nya eller oväntade säkerhetssignaler identifierades i samband med studierna. Alla biverkningar som rapporterades var i linje med oxikodons och övriga motsvarande starka opioiders kända säkerhetsprofiler. Oxikodon rekommenderas ändå inte till barn under 12 år på grund av bristfälliga data gällande säkerhet och effekt.

## 5.2 Farmakokinetiska egenskaper

### Absorption

Den relativa biotillgängligheten hos Oxyratio Depot depottabletterna är jämförbar med den hos snabbfrisättande oxikodonpreparat. Maximal plasmakoncentration uppnås ungefär 4,5 - 7 timmar efter intag av depottabletter jämfört med cirka 1–1,5 timmar vid bruk av vanliga tabletter. De maximala plasmakoncentrationerna och svängningarna i oxikodonkoncentrationerna från depot- och snabbfrisättande formuleringar är jämförbara då depotpreparaten tas med intervall på 12 timmar och de snabbfrisättande tabletterna med intervaller på 6 timmar på ett sådant sätt att den totala dygnsdosen blir densamma.

En fetrik måltid före intag av tabletterna påverkar inte den maximala koncentrationen eller upptaget av oxikodon.

Depottabletterna får inte krossas eller tuggas på, då detta skadar depotegenskaperna, vilket i sin tur leder till en alldel för snabb frisättning av oxikodon.

### Distribution

Den absoluta biotillgängligheten hos oxikodon i depotform är ca 2/3 av biotillgängligheten vid parenteral administrering. Vid steady state uppgår distributionsvolymen hos oxikodon till 2,6 l/kg och plasmaproteinbindningsgraden till 38–45 %. Halveringstiden för eliminationsfasen uppgår till 4–6 timmar och plasmaclearance är 0,8 l/min. Halveringstiden för eliminationsfasen hos oxikodon i form av depottabletter är 4–5 timmar, och steady state uppnås i medeltal på 1 dygn.

### Metabolism

Oxikodon metaboliseras i tarmen och levern via P450-cytochromsystemet till noroxikodon och oximorfon samt till flera glukuronidkonjugat. *In vitro*-studier tyder på att terapeutiska cimetidindoser inte skulle inverka i betydande grad på uppkomsten av noroxikodon. Kinidin minskar dock uppkomsten av oximorfon hos mänskliga, men de farmakodynamiska egenskaperna hos oxikodon bevaras dock till största delen i oförändrad form. Metaboliterna spelar ingen betydande roll för den totala farmakodynamiska effekten av läkemedlet.

### Eliminering

Oxikodon och dess metaboliter utsöndras via urin och feces. Oxikodon passerar placentan och utsöndras i bröstmjölk.

### Linjäritet

Depottabletterna på 20 mg, 40 mg och 80 mg är bioekvivalenta på ett dosproportionellt sätt med avseende på hastighet och grad av absorption.

## 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

### Reproduktions- och utvecklingstoxikologi

Oxikodon hade ingen effekt på fertilitet eller tidig embryonal utveckling hos han- eller honråttor vid doser på upp till 8 mg/kg kroppsvikt/dag. Oxikodon orsakade inte heller missbildningar hos råttor vid doser på upp till 8 mg/kg/dag eller hos kaniner vid doser på upp till 125 mg/kg kroppsvikt/dag. Hos kaniner observerades dock en dosrelaterad ökning av variationer i utvecklingen (ökad incidens av 27 presakrala ryggkotor, extra par revben) när individuella foster användes för statistisk utvärdering. När dessa parametrar utvärderades statistiskt med hjälp av kullar ökade bara incidensen för 27 presakrala ryggkotor, och då endast i gruppen som fick 125 mg/kg/dag. Denna dosnivå hade allvarliga

farmakotoxiska effekter på de dräktiga djuren kan fosterfynden ha varit en sekundär följd av den svåra maternella toxiciteten.

I en studie gällande pre- och postnatal utveckling hos råttor konstaterades den maternella vikten och födointaget vara lägre än vanligt vid doser på  $\geq 2$  mg/kg/dag i jämförelse mot kontrollgruppen. Kroppsvikten hos F1-generationen var lägre än hos jämförelsegruppen vid doser på 6 mg/kg/dag till de dräktiga moderdjuren. Inga effekter på parametrar gällande fysisk, reflexologisk eller sensorisk utveckling eller på beteende eller reproduktion konstaterades hos F1-generationen (NOEL för F1 var 2 mg/kg/dag och inverkan på vikten sågs vid 6 mg/kg/dag). I denna studie sågs inga effekter på F2-generationen med någon av de undersökta doserna.

#### Gentoxicitet

Resultaten av *in vitro*- och *in vivo*-studier tyder på att den genotoxiska risken med oxikodon hos människa skulle vara minimal eller obefintlig vid de systemiska oxikodonkoncentrationer som uppnås med terapeutiska doser. Oxikodon var inte genotoxiskt i ett bakteriellt mutagenicitetstest eller vid ett *in vivo* mikronukleustest hos möss. Oxikodon gav positivt svar på *in vitro* lymfomtest hos möss vid förekomst av råttlever med metabolt aktiverad S9 på dosnivåer högre än 25 µg/ml. Två kromosomavvikelsestest med humana lymfocyter har utförts *in vitro*. I det första var oxikodon negativt utan metabolisk aktivering, men positivt med metabolt aktiverad S9 då 24 timmar förlutit efter dosen – dock inte längre 48 timmar efter exponering. I det andra testet visade oxikodon ingen klastogen potential vid någon tidpunkt eller med någon av de undersökta koncentrationerna, varken med eller utan metabolisk aktivering.

#### Karcinogenicitet

Karcinogenicitet utvärderades i en 2-årig studie med oralt administrerat oxikodon hos Sprague-Dawley råttor. Oxikodon ökade inte förekomsten av tumörer hos varken han- eller hondjur vid doser på upp till 6 mg/kg/dag. Dosstorleken begränsades av de opioidrelaterade farmakologiska effekterna hos oxikodon.

## **6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1 Förteckning över hjälpmänne**

#### *Tablettkärna*

Sockersfärer (sackaros, majsstärkelse),  
hypromellos,  
makrogol 6000,  
talk,  
etylcellulosa,  
hydroxipropylcellulosa,  
propylenglykol,  
magnesiumstearat,  
mikrokristallin cellulosa,  
kolloidal, vattenfri kiseldioxid.

#### *Filmdrägering*

##### Oxyratio Depot 20 mg depottabletter

Hypromellos,  
talk,  
makrogol 6000,  
titandioxid (E 171),  
röd järnoxid (E 172).

##### Oxyratio Depot 40 mg depottabletter

Hypromellos,  
talk,

makrogol 6000,  
titandioxid (E 171),  
gul järnoxid (E 172),  
röd järnoxid (E 172).

#### Oxyratio Depot 80 mg depottabletter

Hypromelos,  
talk,  
makrogol 6000,  
titandioxid (E 171),  
gul järnoxid (E 172).

#### **6.2 Inkompatibiliteter**

Ej relevant.

#### **6.3 Hållbarhet**

3 år.

#### **6.4 Särskilda förvaringsanvisningar**

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

#### **6.5 Förpacknings typ och inne håll**

Barnsäkra aluminium/PVC/PVDC-blisterförpackningar.

Förpackningsstorlekar:

14 (endast 20 mg depottabl.), 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 depttablettter.

Endosförpackade, dosperforerade blisterförpackningar

Förpackningsstorlek:

100 x 1 depottabletter.

Tablettburkar av HDPE med skruvlock av polypropen.

Förpackningsstorlekar:

50, 100 och 250 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

#### **6.6 Särskilda anvisningar för destruktion**

Inga särskilda anvisningar.

### **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Straße 3  
89079 Ulm  
Tyskland

### **8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

20 mg: 22390  
40 mg: 22391

80 mg: 22392

**9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

Datum för det första godkännandet: 8.11.2007

Datum för den senaste förnyelsen: 21.12.2011

**10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

3.2.2023