

## VALMISTEYHTEENVETO

### 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos

### 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 ml sisältää 10 mg parasetamolia

Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää 500 mg parasetamolia

Yksi 100 ml:n injektiopullo sisältää 1000 mg parasetamolia

Täydellinen apuaineluetelo, ks. kohta 6.1.

### 3. LÄÄKEMUOTO

Infuusioneste, liuos.

Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

Osmolaalisuus 270–310 mOsm/kg

pH: 4,5–6,5

### 4. KLIINISET TIEDOT

#### 4.1 Käyttöaiheet

Paracetamol Baxter on tarkoitettu kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikaiseen hoitoon, kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti ja/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista.

#### 4.2 Annostus ja antotapa

Laskimoon.

*Vastasynteet, imeväisikäiset, leikki-ikäiset ja lapset (enintään 33 kg painavat)*  
Käytä injektiopulhoa, jonka täytyövolyymi on 50 ml.

*Aikuiset, nuoret ja lapset (yli 33 kg painavat)*

Käytä injektiopulhoa, jonka täytyövolyymi on 100 ml.

#### Annostus:

Potilaan painon mukainen annostelu (ks. annostustaulukko alla)

Potilaan paino	Annos antokertaa kohti	Tilavuus antokertaa kohti	Paracetamol Baxter - valmisteen maksimitilavuus (10 mg/ml) annostelua kohti perustuen kunkin ryhmän painoylärajaan (ml)**	Maksimiannos vuorokaudessa ***
≤ 10 kg *	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg – ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg, ei yli 2 g
> 33 kg – ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg, ei yli 3 g

Potilaan paino	Annos antokertaa kohti	Tilavuus antokertaa kohti	Maksimitilavuus/ antokerta **	Maksimiannos vuorokaudessa ***
> 50 kg jos lisäksi muita riskitekijöitä maksatoksiuudelle	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg jos ei muita riskitekijöitä maksatoksiuudelle	1 g	100 ml	100 ml	4 g

\* **Keskiset:** Tietoja valmisteen turvallisuudesta ja tehosta vastasyntyneiden keskosten hoidossa ei ole saatavilla (ks. kohta 5.2).

\*\* Potilaat, jotka painavat vähemmän, tarvitsevat pienemmän annostilavuuden.

\*\*\* **Enimmäisvuorokausiannos:** Yllä olevan taulukon enimmäisvuorokausiannos on potilaalle, joka ei saa muita parasetamolia sisältäviä valmisteita. Annosta on muutettava asianmukaisesti, jos potilas käyttää muita tällaisia valmisteita.

Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana.

Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.

#### *Munuaisten vajaatoiminta*

Munuaisten vajaatoimintapotilailla annosteluväljä on muutettava seuraavasti:

Kreatiinipuhdistuma	Antoväli
≥ 50 ml/min	4 tuntia
10–50 ml/min	6 tuntia
< 10 ml/min	8 tuntia

#### *Maksan vajaatoiminta*

Potilaat, joilla on krooninen tai kompensoitu aktiivinen maksasairaus, maksasolujen vajaatoiminta, krooninen alkoholismi, krooninen aliravitsemus (maksan alhainen glutationivarasto), nestehukka, Gilbertin oireyhtymä tai paino alle 50 kg: Enimmäisvuorokausiannos ei saa olla yli 3 g (ks. kohta 4.4).

#### *Iäkkääät potilaat*

Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille.

#### *Antotapa:*

Paracetamol Baxter -valmistetta määrättääessä ja annosteltaessa on oltava huolellinen, jotta ei tapahdu sekaannusta milligrammojen (mg) ja millilitrojen (ml) väillä ja annosteluvirhettä, joka voi johtaa vahingossa yliannostukseen ja kuolemaan. On varmistettava, että annos ilmaistaan ja annostellaan oikein. Lääkemäääräyksessä on oltava sekä kokonaisanos milligrammoina että kokonaistilavuus millilitroina.

Parasetamoliliuos annetaan 15 minuuttia kestävään infuusiona laskimoona.

*Potilaan paino ≤ 10 kg:*

- Injektiopulloa ei pidä käyttää infuusion antamiseen, koska tälle potilasryhmälle annettava lääkevalmyyti on hyvin pieni.
- Annosteltava määrä on otettava pois injektiopullossa, ja se voidaan antaa joko laimentamattomana tai laimennettuna (yksi osa infuusionestettä korkeintaan yhdeksään osaan laimenninta) 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella. Liuos annostellaan 15 minuutin aikana.
- Sopivan annoksen mittaamiseen suhteessa lapsen painoon ja haluttuun tilavuuteen pitää käyttää 5 ml:n tai 10 ml:n ruiskua. Tälle painoryhmälle annettava tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 7,5 ml annosta kohti.
- Käyttäjän tulee tarkistaa valmisteyhteenvedossa annetut annostussuositukset.

Liuos otetaan injektiopullossa 0,8 mm:n (21 gaugen) neulalla. Tulppa lävistetään kohtisuoraan merkitystä kohdasta.

Kuten kaikkia lasisissa injektiopulloissa olevia infuusoliuoksia annettaessa, infuusiota on valvottava tarkoin varsinkin sen loppuvaiheessa antoreitistä riippumatta. Huolellinen valvonta infuusion loppuvaiheessa koskee erityisesti keskuslaskimoon annettavia infusioita, ilmaembolian väittämiseksi.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoaa.

#### 4.3 Vasta-aiheet

Paracetamol Baxter on vasta-aiheista:

- potilailla, jotka ovat yliherkkiä parasetamolille tai propasetamolihydrokloridille (parasetamolin esimuoto) tai apuaineille.
- vaikeassa hepatosellulaarisessa vajaatoiminnassa.

#### 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

##### Varoitukset

###### LÄÄKITYSVIRHEIDEN RISKI

On oltava huolellinen, jotta ei tapahdu sekaannusta milligrammojen (mg) ja millilitrojen (ml) välillä ja annosteluvirhettä, joka voi johtaa vahingossa yliannostukseen ja kuolemaan (ks. kohta 4.2).

On suositeltavaa käyttää sopivaa suun kautta otettavaa kipulääkitystä heti, kun tämä antoreitti on mahdollinen.

Tarkista yliannosriskin väittämiseksi, etteivät muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet sisällä joko parasetamolia tai propasetamolia.

Suositustuloon suurempien annosten käyttöön liittyy hyvin vakavan maksavaurion riski. Maksavaurion (kuten äkillinen hepatiitti, maksan vajaatoiminta, kolestaattinen hepatiitti, sytolysinen hepatiitti) oireet ja merkit ilmaantuvat yleensä kahden vuorokauden kuluttua lääkkeen annosta ja ovat suurimmillaan 4–6 vuorokauden kuluttua. Vastalääke tulee antaa ensi tilassa (ks. kohta 4.9).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

Parasetamoli voi aiheuttaa vakavia ihoreaktioita. Potilaalle on kerrottava vakavien ihoreaktioiden merkeistä, ja lääkkeen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos ihottumaa tai mitä tahansa muita yliherkkyyden merkkejä ilmenee.

Kuten kaikkia lasisissa injektiopulloissa olevia infuusoliuoksia annettaessa, infuusiota on valvottava tarkoin varsinkin sen loppuvaiheessa (ks. kohta 4.2).

#### Käyttöön liittyvät varotoimet

Parasetamolin käytössä on noudatettava varovaisuutta seuraavissa tapauksissa:

- hepatosellulaarinen vajaatoiminta, Gilbertin oireyhtymä
- vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2 ja 5.2)
- krooninen alkoholismi
- krooninen aliravitsemus (maksan alhainen glutationivarasto)
- nestehukka.
- Potilailla, joilla on geneettinen G6PD-puutos (favismi), hemolyyttisen anemian esiintyminen on mahdollista johtuen parasetamolin annosta aiheutuvasta glutationin allokaation vähenemisestä.

Parasetamolin ja flukloksasilliinin samanaikaisessa annossa on noudatettava varovaisuutta, koska suurentuneen anionivajeen aiheuttaman metabolisen asidoosin (HAGMAN) riski on suurentunut etenkin potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis, aliravitsemus tai muu glutationivajeen syy (esim. krooninen alkoholismi), samoin kuin käytettäessä parasetamolista enimmäisannoksia päivittäin. Tarkkaa seurantaa, mukaan lukien virtsan 5-oksoproliinin mittaanista, suositellaan.

#### **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

- Probenesidi aiheuttaa parasetamolin puhdistumassa lähes 2-kertaisen pienemisen estämällä sen konjugoitumisen glukuronihapon kanssa. Parasetamoliannoksen pienentämistä on harkittava, jos sitä käytetään samanaikaisesti probenesidin kanssa.
- Salisyliamidi voi pidentää parasetamolin eliminaation puoliintumisaikaa ( $t_{1/2}$ ).
- Entsyymejä indusoivien aineiden samanaikainen käyttö vaatii varovaisuutta (ks. kohta 4.9).
- Parasetamolin (4 g/vrk vähintään 4 vrk ajan) ja suun kautta otettavien antikoagulantien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vähäisiä INR-arvojen muutoksia. Tällaisissa tapauksissa INR-arvoja on seurattava normaalilla tiheämmän yhteiskäytön aikana ja vielä 1 viikon ajan parasetamolioidon päättymisen jälkeen.
- On syytä varovaisuteen, kun parasetamolia käytetään samanaikaisesti flukloksasilliinin kanssa, sillä samanaikaiseen käyttöön on liittynyt suurentuneesta anionivajeesta johtuva metabolisti asidoosia etenkin niillä potilailla, joilla on riskitekijöitä. (Ks. kohta 4.4.)

#### **4.6 Heldelmäisyys, raskaus ja imetyks**

##### Raskaus:

Parasetamolin antamisesta laskimoon on niukasti kliinistä kokemusta.

Eläimillä ei ole tehty lisääntymistutkimuksia parasetamolin laskimoon annettavalla muodolla.

Raskaana olevista naisista saatu suuri määärä tietoa suun kautta toteutetusta hoidosta ei kuitenkaan viittaa epämuodostumien aiheutumiseen eikä toksisuuteen sikiölle/vastasyntyneelle. Epidemiologiset tutkimukset parasetamolille kohdussa altistuneiden lasten neurologisesta kehityksestä eivät ole antaneet ratkaisevia tuloksia. Kliinisesti tarvittaessa parasetamolia voidaan käyttää raskauden aikana; sitä olisi kuitenkin käytettävä pienimmällä vaikuttavalla annoksella ja lyhimmän mahdollisen ajan sekä mahdollisimman harvoin.

##### Imetyks:

Sun kautta otettu parasetamoli erittyy ihmisen rintamaitoon pieninä määrinä. Rintaruokittuihin imeväisiin kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.

Paracetamol Baxter -valmistetta voi siis käyttää imetysaikana.

## 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Ei oleellinen.

## 4.8 Haittavaikutukset

Kuten kaikilla parasetamolia sisältävillä lääkkeillä haittavaikutukset ovat joko harvinaisia ( $\geq 1/10\ 000$ ,  $< 1/1\ 000$ ) tai hyvin harvinaisia ( $< 1/10\ 000$ ), ja ne on kuvattu alla:

Elinjärjestelmä	Harvinainen $\geq 1/10\ 000$ , $< 1/1\ 000$	Hyvin harvinainen ( $< 1/10\ 000$ )
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	Huonovointisuus	Yliherkkysreaktio
Verisuonisto	Hypotensio	
Maksa ja sappi	Kohonneet maksan transaminaasiarvor	
Veri ja imukudos		Trombosytopenia, leukopenia, neutropenia

Kliinisissä tutkimuksissa on ilmoitettu yleisesti pistoskohdan haittavaikutuksia (kipua ja kirvelyä).

Hyvin harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu yliherkkysreaktioita, jotka vaihtelevat tavallisesta ihottumasta tai nokkosihottumasta anafylaktiseen sokkiin ja vaativat hoidon keskeyttämistä.

Eryteemaa, punastelua, kutinaa ja takykardiaa on ilmoitettu.

Vakavia iholeaktioita on ilmoitettu joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa.

### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haiittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## 4.9 Yliannostus

Yliannostukseen liittyy maksavaurion vaara (kuten äkillinen hepatiitti, maksan vajaatoiminta, kolestaattinen hepatiitti, sytolyyttinen hepatiitti), erityisesti iäkkäillä henkilöillä, pikkulapsilla ja potilailla, joilla on maksasairaus sekä kroonisesta alkoholismista tai kroonisesta aliravitsemustilasta kärsivillä potilailla ja entsyymi-induktoreita saavilla potilailla. Näissä tapauksissa yliannos voi johtaa kuolemaan.

- Oireet ilmenevät yleensä ensimmäisen vuorokauden aikana ja niihin kuuluvat: pahoinvoiinti, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakipu. Yliannostus, aikuisilla yli 7,5 g parasetamolia kerta-annoksena tai lapsilla 140 mg painokiloa kohti kerta-annoksena aiheuttaa maksasolujen hajoamista, joka voi johtaa täydelliseen ja korjautumattomaan nekroosiin, ja sen seurausena maksasolujen vajaatoimintaan, metaboliseen asidoosiin ja encefalopatiaan, joka voi johtaa koomaan ja kuolemaan. Samanaikaisesti on todettu maksan transaminaasiarvojen (ASAT, ALAT) sekä laktaattidehydrogenaasi- ja bilirubiiniarvojen suurenemista ja protrombiniarvon pienennemistä, joka voi ilmaantua 12–48 tunnin kuluttua annoksesta.

Maksavaurion klüniiset oireet ovat yleensä havaittavissa kahden vuorokauden kuluttua, ja ne ovat enimmillään 4–6 vuorokauden kuluttua.

#### Hätätoimenpiteet

- Vältön sairaalahoito.
- Ennen hoidon aloittamista otetaan putkellinen verta plasman parasetamolipitoisuuden määrittämiseksi mahdollisimman pian yliannoksen ottamisen jälkeen.
- Hoitoon kuuluu vastalääkkeen, N-asetyylityksteiinin (NAC), antaminen laskimoona tai suun kautta, jos mahdollista, ennen kuin 10 tuntia on kulunut. NAC voi kuitenkin suojata jonkin verran vaikka 10 tuntia olisi jo kulunut, mutta tällöin hoitoa pitkitetää.
- Oireenmukainen hoito.
- Maksakokeet on tehtävä hoidon alussa ja toistettava vuorokauden välein. Useimmissa tapauksissa maksan transaminaasit palautuvat normaaliksi viikon tai kahden kuluessa, ja maksan toiminta palautuu ennalleen. Erittäin vaikeissa tapauksissa maksansiirto voi kuitenkin olla tarpeen.

## **5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET**

### **5.1 Farmakodynamika**

Farmakoterapeutinen ryhmä: muut analgeetit ja antipyreetit ATC-koodi: N02BE01

#### Vaikutusmekanismi

Parasetamolin täsmällistä analgeettista ja antipyreettistä mekanismia ei ole vielä selvitetty; siihen voi liittyä sekä keskushermostollisia että ääreisvaikutuksia.

#### Farmakodynaamiset vaikutukset

Kivunlievitys alkaa 5–10 minuutin kuluessa Paracetamol Baxter -valmisteen annon aloittamisesta. Kipua lievittävä vaikutus saavuttaa huippunsa tunnin kuluttua ja vaikutus kestää yleensä 4–6 tuntia.

Paracetamol Baxter alentaa kuumetta 30 minuutin kuluessa annon aloittamisesta, ja kuumetta alentava vaikutus kestää vähintään 6 tuntia.

### **5.2 Farmakokinetiikka**

#### *Aikuiset*

#### Imeystyminen:

Parasetamolin farmakokinetiikka on lineaarinen kerta-annoksen jälkeen 2 grammaan asti ja toistuvan annon jälkeen 24 tunnin ajan.

Parasetamolin biologinen hyötyosuus 500 mg:n ja 1 g:n Paracetamol Baxter -infuusion jälkeen on samankaltainen kuin 1 g:n ja 2 g:n propasetaamoli-infusion (vastaan 500 mg ja 1 g parasetamolia) jälkeen. Parasetamolin huipputoisuus plasmassa (C<sub>max</sub>) 15 minuuttia kestävän laskimoinfusion lopussa on noin 15 mikrog/ml annettaessa 500 mg parasetamolia ja noin 30 mikrog/ml annettaessa 1 g parasetamolia.

#### Jakautuminen:

Parasetamolin jakautumistilavuus on noin 1 l/kg.

Parasetamoli ei sitoudu voimakkaasti plasman proteiineihin.

Aivo-selkäyдинnestestä mitattiin merkitseviä parasetamolipitoisuksia (noin 1,5 mikrog/ml) 20 minuutin kuluttua 1 g:n parasetamoli-infusiosta.

#### Biotransformaatio:

Parasetamoli metaboloituu suurimmaksi osaksi maksassa pääasiassa kahta reittiä: glukuronihappokonjugaation ja rikkihappokonjugaation kautta. Jälkimmäinen reitti kyllästyy nopeasti, jos käytetään hoitoannosta suurempia annoksia. Pieni osa (alle 4 %) metaboloituu sytokromi P450 -entsyymin välityksellä reaktiiviseksi välituotteeksi (N-asettylibentsokinoni-imini), jonka pelkistynyt glutationi detoksifioi nopeasti normaaleissa käyttöolosuhteissa ja joka eliminoituu virtsaan konjugoiduttuaan kysteihin ja merkaptuurihapon kanssa. Massiivinen yliannos kuitenkin lisää tämän toksisen metaboliitin määrää.

#### Eliminaatio:

Parasetamolin metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan. 90 % annoksesta erittyy 24 tunnin kuluessa, pääasiassa glukuronidi- (60–80 %) ja sulfaattikonjugaatteina (20–30 %). Alle 5 % eliminoituu muuttumattomana. Puoliintumisaika plasmassa on 2,7 tuntia ja kokonaispuhdistuma on 18 l/h.

#### *Vastasyntyneet, imeväiset ja lapset*

Parasetamolin farmakokineettiset parametrit ovat imeväisillä ja lapsilla samanlaiset kuin aikuisilla lukuun ottamatta puoliintumisaikaa plasmassa, joka on hieman lyhyempi (1,5–2 tuntia) kuin aikuisilla. Vastasyntyneillä puoliintumisaika plasmassa on pitempi kuin imeväisillä, eli noin 3,5 tuntia. Erittyvien glukuronidikonjugaattien määrä on vastasyntyneillä, imeväisillä ja enintään 10-vuotiailla lapsilla merkitsevästi pienempi ja sulfaattikonjugaattien määrä suurempi kuin aikuisilla.

*Taulukko. Taulukossa esitetään iän mukaiset farmakokineettiset arvot (standardoitu puhdistuma,  $*CL_{std}/F_{oral} (l \cdot h^{-1} 70 \text{ kg}^{-1})$ .*

Ikä	Paino (kg)	$CL_{std}/F_{oral} (l \cdot h^{-1} 70 \text{ kg}^{-1})$
40 viikkoa (PCA)	3,3	5,9
3 kuukautta (PNA)	6	8,8
6 kuukautta (PNA)	7,5	11,1
1 vuosi (PNA)	10	13,6
2 vuotta (PNA)	12	15,6
5 vuotta (PNA)	20	16,3
8 vuotta (PNA)	25	16,3

\* $CL_{std}$  on perusjoukosta laskettu puhdistuman CL estimaatti

#### *Erityisryhmät*

##### *Munuaisten vajaatoiminta*

Parasetamolin eliminoituminen viivästyy hieman vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (kreatiniinipuhdistuma 10–30 ml/min), ja eliminaation puoliintumisaika on 2–5,3 tuntia. Glukuronidi- ja sulfaattikonjugaattien eliminaationopeus on 3 kertaa hitaampi vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla kuin terveillä tutkimushenkilöillä. Siksi on suositeltavaa pidentää antoväli vähintään 6 tuntiin annettaessa parasetamolia potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma  $\leq 30$  ml/min) (ks. kohta 4.2 Annostus ja antotapa).

#### *Iäkkääät*

Parasetamolin farmakokinetiikka ja metabolismia eivät muudu iäkkäillä henkilöillä. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen tässä potilasryhmässä.

### **5.3 Prekliiniset tiedot turvallisudesta**

Prekliiniset tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisseille toisaalla valmisteyhteenvedossa mainittujen haittojen lisäksi.

Rotalla ja kaniinilla tehdyissä tutkimuksissa Paracetamol Baxter -valmisteen paikallinen siedettävyys osoittautui hyväksi. Viivästyneen kosketusallergian puuttuminen testattiin marsuilla.

Tavanomaisia tutkimuksia, joissa on käytetty nykyisin hyväksyttyjä standardeja lisääntymis- ja kehitystoksisuuden arviointiin, ei ole saatavissa.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

Kysteinihydrokloridimonohydraatti (E920)

Dinatriumfosfaatti (E339)

Väkevä kloorivetyhappo (pH:n säättöön) (E507)

Mannitoli (E421)

Natriumhydroksidi (pH:n säättöön) (E524)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

### **6.2 Yhteensopimattomuudet**

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

### **6.3 Kestoaika**

2 vuotta.

Käytönaikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden kohdassa 6.6 luetelluissa liuoksissa on osoitettu olevan 48 tuntia 20–25 °C:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Ellei valmistetta käytetä heti, käytönaikainen säilytsaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä yleensä saa yliittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa ellei laimennus tapahdu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

### **6.4 Säilytys**

Älä säilytä kylmässä tai ei saa jäätynä.

Laimennetun lääkevalmisten säilytys, ks. kohta 6.3.

### **6.5 Pakaus typpi ja pakauskoko**

50 ml:n täytövolyyymi 100 ml:n tyypin II kirkkaasta lasista valmistetussa injektiopullossa, jossa on klorobutylylikumitulppa ja punainen irti napsautettava alumiinikorkki.

100 ml:n täytövolyyymi 100 ml:n tyypin II kirkkaasta lasista valmistetussa injektiopullossa, jossa on klorobutylylikumitulppa ja sininen irti napsautettava alumiinikorkki.

Pakauskoko: 25 injektiopullon pakaus.

### **6.6 Erityiset varotoimet hävittämiseelle ja muut käsittelyohjeet**

Läivistä tulppa merkitystä kohdasta kohtisuoraan 0,8 mm:n neulalla.

Valmiste on tarkastettava silmämäärisesti hiukkasten ja vääräytymien varalta ennen antoa. Vain kertakäyttöön. Käytämätön liuos on hävitettävä.

Paracetamol Baxter voidaan laimentaa 0,9 % natriumkloridiliuoksella tai 5 % glukoosiliuoksella yhteen kymmenenesosaan (yksi osa Paracetamol Baxter -valmistetta yhdeksään osaan laimenninta). Laimennettu liuos on tarkastettava silmämäärisesti eikä sitä saa käyttää, jos havaitaan opalisointia, näkyviä hiukkasia tai saostumia.

Ei erityisiä varotoimia hävittämisen suhteen

Käytämätön lääkevalmiste tai jälte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Baxter Holding B.V.  
Kobaltweg 49  
3542CE Utrecht  
Alankomaat

## **8. MYYNTILUVAN NUMERO**

37685

## **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 14.06.2021  
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

19.10.2022

## PRODUKTRESUMÉ

### 1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paracetamol Baxter 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

### 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller 10 mg paracetamol.

Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 500 mg paracetamol.

Varje 100 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg paracetamol.

För fullständig förteckning över hjälpmitten, se avsnitt 6.1.

### 3. LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Lösningen är klar, färglös till svagt gulaktig utan synliga partiklar.

Osmolalitet 270 till 310 mOsm/kg

pH: 4,5–6,5

### 4. KLINISKA UPPGIFTER

#### 4.1 Terapeutiska indikationer

Paracetamol Baxter är avsedd för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber, när intravenös administrering är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller feber och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga.

#### 4.2 Dosing och administreringssätt

Intravenös användning.

*För nyfödda barn, spädbarn, småbarn och barn (upp till 33 kg)*

Använd en injektionsflaska med 50 ml lösning.

*För vuxna, ungdomar och barn (över 33 kg)*

Använd en injektionsflaska med 100 ml lösning.

#### Dosering:

Dosering baserad på patientvikt (se doseringstabellen nedan)

Patientens vikt	Dos per administrerings-tillfälle	Volym per administrerings-tillfälle	Maximal volym av Paracetamol Baxter per administreringstillfälle baserat på gruppens övre viktgräns (ml)**	Maximal daglig dos***
≤ 10 kg*	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg till ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg, utan att överskrida 2 g
> 33 kg till ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg, utan att

				överskrida 3 g
--	--	--	--	-------------------

Patientens vikt	Dos per administrerings-tillfälle	Volym per administrerings-tillfälle	Maximal volym per administrerings-tillfälle**	Maximal daglig dos***
> 50 kg med ytterligare riskfaktorer för leverotoxicitet	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg utan ytterligare riskfaktorer för leverotoxicitet	1 g	100 ml	100 ml	4 g

\* **Prematura nyfödda spädbarn:** Det finns inga data beträffande säkerhet och effekt tillgängliga för prematura nyfödda spädbarn (se avsnitt 5.2).

\*\* Patienter som väger mindre kräver mindre volymer.

\*\*\* **Maximal daglig dos:** Den maximala dagliga dosen som anges i tabellen ovan gäller för patienter som inte får några andra läkemedel som innehåller paracetamol och ska justeras med hänsyn till sådana läkemedel.

Intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar. Högst 4 doser får ges under 24 timmar.

Det kortaste intervallet mellan varje administrering för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion måste vara minst 6 timmar.

#### Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion ska det kortaste intervallet mellan varje administrering ändras enligt följande schema:

Kreatininclearance	Doseringsintervall
≥ 50 ml/min	4 timmar
10–50 ml/min	6 timmar
< 10 ml/min	8 timmar

#### Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med kronisk eller kompenserad aktiv leversjukdom, hepatocellulär insufficiens, kronisk alkoholism, kronisk undernäring (låga reserver av leverglutation), dehydrering, Gilberts sjukdom, som väger under 50 kg: den maximala dagliga dosen får inte överskrida 3 g (se avsnitt 4.4).

#### Äldre patienter

Vanligtvis krävs ingen dosjustering för geriatriska patienter.

#### **Administreringssätt:**

Var uppmärksam vid förskrivning och administrering av Paracetamol Baxter för att undvika doseringsfel på grund av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml), vilket kan leda till oavsiktlig överdosering som kan bli fatal. Se noga till att korrekt dos kommuniceras och mäts upp. Vid skrivna ordinationer ska både den totala dosen i mg och den totala dosen i volym inkluderas.

Paracetamollsningen administreras som intravenös infusion under 15 minuter.

#### *Patienter som väger $\leq 10$ kg:*

- Injektionsflaskan ska inte hängas upp som en infusion på grund av den lilla volym läkemedel som ska administreras till denna population.
- Volym som ska administreras ska dras upp ur injektionsflaskan och sen administreras outspädd eller utspädd (från en till nio volymer spädningsvätska) i 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning och administreras under 15 minuter.
- En 5 eller 10 ml spruta ska användas för att mäta upp den dos som är lämplig för barnets vikt och önskad volym. Den volym som administreras till denna viktgrupp ska aldrig överskrida 7,5 ml per dos.
- Användaren hänvisas till doseringsrekommendationerna i produktresumén.

För att dra upp lösning måste en 0,8 mm nål (21 gauge-nål) användas och proppen ska perforeras vertikalt på den specifikt markerade platsen.

Som för alla infusionsvätskor, lösningar i injektionsflaska av glas är det viktigt att tänka på att noggrann övervakning är nödvändig, särskilt i slutet av infusionen, oavsett administreringväg. Övervakning i slutet av perfusionen är särskilt viktigt vid infusion via centralvenkateter, för att undvika luftemboli.

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

#### **4.3 Kontraindikationer**

Paracetamol Baxter är kontraindicerat:

- för patienter med överkänslighet mot paracetamol eller propacetamolhydroklorid (prodrug till paracetamol) eller mot något hjälpmämne
- vid fall av svår hepatocellulär insufficiens.

#### **4.4 Varningar och försiktighet**

##### Varningar

##### RISK FÖR MEDICINERINGSFEL

Var uppmärksam för att undvika doseringsfel på grund av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml), vilket kan leda till oavsiktlig överdosering och död (se avsnitt 4.2).

Det rekommenderas att en lämplig analgetisk oral behandling används så snart denna administreringväg är möjlig.

Kontrollera att övriga administrerade läkemedel varken innehåller paracetamol eller propacetamol för att undvika risk för överdosering.

Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Kliniska symtom och tecken på leverskada (bland annat fulminant hepatitis, leversvikt, kolestatisk hepatitis, cytolytisk hepatitis) ses vanligen först efter två dagars läkemedelsadministrering och kulmen ses vanligen efter 4–6 dagar. Behandling med antidot ska ges så snart som möjligt (se avsnitt 4.9).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

Paracetamol kan orsaka allvarliga hudreaktioner. Patienter ska informeras om tecken på allvarliga hudreaktioner och användning av läkemedlet ska avbrytas vid första uppkomst av hudutslag eller något annat tecken på överkänslighet.

Som för alla infusionsvätskor, lösningar i injektionsflaska av glas är det nödvändigt med noggrann övervakning, särskilt i slutet av infusionen (se avsnitt 4.2).

#### Försiktighetsåtgärder vid användning

Paracetamol ska användas med försiktighet vid följande tillstånd:

- hepatocellulär insufficiens, Gilberts sjukdom
- kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2)
- kronisk alkoholism
- kronisk undernäring (låga reserver av leverglutation)
- dehydrering
- hos patienter med en genetiskt orsakad G-6-PD-brist (favism) kan hemolytisk anemi orsakad av en reducerad allokering av glutation uppkomma efter administrering av paracetamol.

Försiktighet rekommenderas när paracetamol administreras tillsammans med flukloxacillin på grund av den ökade risken för HAGMA (high anion gap metabolic acidosis), i synnerhet till patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis, malnutrition och andra orsaker till glutationbrist (t.ex. kronisk alkoholism), samt särskilt vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol. Noggrann övervakning, inklusive sökning efter 5-oxoprolin i urinen rekommenderas.

#### **4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

- Probenecid halverar nästan clearance av paracetamol genom att hämma dess konjugering med glukuronsyra. En minskning av paracetamoldosen ska övervägas vid samtidig behandling med probenecid.
- Salicylamid kan förlänga halveringstiden för eliminering av paracetamol.
- Försiktighet ska iakttas vid samtidigt intag av enzyminducerande substanser (se avsnitt 4.9).
- Samtidig användning av paracetamol (4 g per dag i minst 4 dagar) och orala antikoagulantia kan leda till mindre förändringar av INR-värdena. I detta fall ska ökad övervakning av INR-värdena ske under perioden med samtidig användning samt under 1 vecka efter utsättande av behandlingen med paracetamol.
- Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av paracetamol och flukloxacillin eftersom samtidigt intag har förknippats med HAGMA (high anion gap metabolic acidosis), särskilt hos patienter med riskfaktorer. (se avsnitt 4.4.)

#### **4.6 Fertilitet, graviditet och amning**

##### Graviditet:

Den kliniska erfarenheten av intravenös administrering av paracetamol är begränsad.

Reproduktionsstudier med den intravenösa formen av paracetamol har inte utförts på djur.

En stor mängd data från oral användning hos gravida kvinnor tyder dock inte på risk för missbildningstoxicitet och inte heller på fostertoxicitet/neonatal toxicitet. Epidemiologiska studier av neurologisk utveckling hos barn som exponerats för paracetamol *in utero* visar inte konklusiva resultat. Om det är kliniskt nödvändigt kan paracetamol användas under graviditet. Det ska dock användas med lägsta möjliga effektiva dos under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens.

##### Amning:

Efter oral administrering utsöndras paracetamol i bröstmjölk i små mängder. Inga biverkningar har rapporterats hos ammande spädbarn.

Paracetamol Baxter kan därför användas av ammande kvinnor.

#### **4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Ej tillämpligt.

#### **4.8 Biverkningar**

Som för alla produkter som innehåller paracetamol är biverkningar sällsynta ( $>1/10\ 000$ ,  $<1/1\ 000$ ) eller mycket sällsynta ( $<1/10\ 000$ ). De beskrivs nedan:

Organsystem	Sällsynta $>1/10\ 000$ , $<1/1\ 000$	Mycket sällsynta $<1/10\ 000$
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället	Sjukdomskänsla	Överkänslighetsreaktion
Blodkärl	Hypotoni	
Lever och gallvägar	Förhöjda nivåer av levertransaminaser	
Blodet och lymfsystemet		Trombocytopeni, leukopeni, neutropeni

Frekventa biverkningar vid injektionsstället har rapporterats under kliniska prövningar (smärta och en brännande känsla).

Mycket sällsynta fall av överkänslighetsreaktioner som varierar från lindriga hudutslag eller urtikaria till anafylaktisk chock har rapporterats och kräver att behandlingen avbryts.

Fall av erytem, vallningar, klåda och takykardi har rapporterats.

Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

#### Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

#### **4.9 Överdosering**

Det finns risk för leverskada (bland annat fulminant hepatitis, leversvikt, kolestatisk hepatitis, cytolitisk hepatitis), speciellt hos äldre, små barn, patienter med leversjukdom, vid kronisk alkoholism, hos patienter med kronisk undernäring och hos patienter som får enzyminducerande läkemedel. Överdosering kan i dessa fall vara livshotande.

Symtom uppkommer vanligen inom de första 24 timmarna och innefattar: illamående, kräkningar, anorexi, blekhet och buksmärkor. Överdosering med 7,5 g paracetamol eller mer som en enkeldos till vuxna, och 140 mg/kg kroppsvikt som en enkeldos till barn, orsakar levercytolys, vilket sannolikt medför en fullständig och irreversibel nekros som resulterar i hepatocellulär insufficiens, metabolisk

acidos och encefalopati, vilket kan leda till koma och död. Samtidigt ses ökade nivåer av levertransaminaser (AST, ALAT), laktatdehydrogenas och bilirubin tillsammans med minskade protrombinnivåer, vilket kan uppträda 12 till 48 timmar efter administrering.

Kliniska symtom på leverskada börjar vanligen märkas efter två dagar och når maximal styrka efter 4 till 6 dagar.

#### Åtgärder i akutsituationer

- Omedelbar inläggning på sjukhus.
- Innan behandling påbörjas tas så fort som möjligt efter en överdos ett rör med blod för bestämning av paracetamolkoncentrationen i plasma.
- Behandlingen innefattar administrering av antidoten N-acetylcystein (NAC) som ges intravenöst eller oralt, om möjligt inom 10 timmar. N-acetylcystein kan dock i någon mån skydda även efter 10 timmar, men i dessa fall ges förlängd behandling.
- Symtomatisk behandling.
- Levertester måste utföras i början av behandlingen och upprepas var 24:e timme. I de flesta fall återgår levertransaminaserna till normal nivå inom en till två veckor med fullständigt återställd leverfunktion. I mycket allvarliga fall kan dock levertransplantation bli nödvändig.

## **5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

### **5.1 Farmakodynamiska egenskaper**

Farmakoterapeutisk grupp: andra analgetika och antipyretika, ATC-kod: N02BE01

#### Verkningsmekanism

Den exakta mekanismen för de analgetiska och antipyretiska egenskaperna hos paracetamol har ännu inte fastställts. Den kan innefatta central och perifer verkan.

#### Farmakodynamisk effekt

Paracetamol Baxter ger smärtlindring inom 5 till 10 minuter efter administreringsstart. Maximal analgetisk effekt uppnås efter 1 timme och effekten kvarstår vanligtvis 4 till 6 timmar.

Paracetamol Baxter ger febnernedsättning inom 30 minuter efter administreringsstart och den antipyretiska effekten kvarstår minst 6 timmar.

### **5.2 Farmakokinetiska egenskaper**

*Vuxna*

#### Absorption:

Farmakokinetiken hos paracetamol är linjär efter en enkeldos på upp till 2 g samt efter upprepad administrering under 24 timmar.

Biotillgängligheten av paracetamol efter en infusion av 500 mg och 1 g Paracetamol Baxter liknar den som observeras efter en infusion av 1 g och 2 g propacetamol (motsvarar 500 mg respektive 1 g paracetamol). Maximal plasmakoncentration (Cmax) av paracetamol som observeras i slutet av en 15 minuters intravenös infusion av 500 mg och 1 g Paracetamol Baxter är cirka 15 mikrogram/ml respektive 30 mikrogram/ml.

#### Distribution:

Distributionsvolymen för paracetamol är cirka 1 l/kg.

Paracetamol är inte bundet till plasmaproteiner i någon större utsträckning.

Efter infusion av 1 g paracetamol observerades signifikanta koncentrationer av paracetamol (cirka 1,5 mikrogram/ml) i cerebrospinalvätskan från och med 20 minuter efter infusionsen.

#### Metabolism:

Paracetamol metaboliseras främst i levern via två huvudvägar: konjugering med glukuronsyra och konjugering med svavelsyra. Den sistnämnda vägen blir snabbt mättad vid doser som överskrider den terapeutiska dosen. En liten del (mindre än 4 %) metaboliseras av cytokrom P450 till ett reaktivt intermediat (N-acetylbensokinonimin) som under normala användningsförhållanden snabbt detoxifieras av reducerat glutation och utsöndras i urinen efter konjugering med cystein och merkaptursyra. Vid en kraftig överdosering ökar dock mängden av denna toxiska metabolit.

#### Eliminering:

Metaboliterna av paracetamol utsöndras huvudsakligen i urinen. 90 % av den administrerade dosen utsöndras inom 24 timmar, främst som glukuronidkonjugat (60–80 %) och sulfatkonjugat (20–30 %). Mindre än 5 % elimineras oförändrat. Halveringstiden i plasma är 2,7 timmar och total kropps clearance är 18 l/timme.

#### *Nyfödda, spädbarn och barn*

De farmakokinetiska parametrarna för paracetamol som observeras hos spädbarn och barn liknar de som observeras hos vuxna, med undantag för halveringstiden i plasma som är något kortare (1,5 till 2 timmar) än hos vuxna. Hos nyfödda är halveringstiden i plasma längre än hos spädbarn, dvs. cirka 3,5 timmar. Nyfödda, spädbarn och barn upp till 10 år utsöndrar betydligt mindre glukuronidkonjugat och mer sulfatkonjugat än vuxna.

*Tabell. Åldersrelaterade farmakokinetiska värden (standardiserad clearance, \*CL<sub>std</sub>/F<sub>oral</sub> (l.h<sup>-1</sup> 70 kg<sup>-1</sup>) visas nedan.*

Ålder	Vikt (kg)	CL <sub>std</sub> /F <sub>oral</sub> (l.h <sup>-1</sup> 70 kg <sup>-1</sup> )
40 veckors postkonceptionell ålder	3,3	5,9
3 månaders postnatal ålder	6	8,8
6 månaders postnatal ålder	7,5	11,1
1 års postnatal ålder	10	13,6
2 års postnatal ålder	12	15,6
5 års postnatal ålder	20	16,3
8 års postnatal ålder	25	16,3

\* CL<sub>std</sub> är populationsestimat för CL

#### *Särskilda patientgrupper*

##### *Nedsatt njurfunktion*

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance 10–30 ml/min) är elimineringen av paracetamol något födröjd med en elimineringshalveringstid som varierar från 2 till 5,3 timmar. Hos personer med kraftigt nedsatt njurfunktion är elimineringstiden för glukuronid- och sulfatkonjugat 3 gånger längre än hos friska personer. Det rekommenderas därför att det kortaste intervallet mellan varje administrering ökas till 6 timmar när paracetamol ges till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance ≤ 30 ml/min) (se avsnitt 4.2 Dosering och administreringssätt).

##### *Äldre*

Farmakokinetiken och metabolismen för paracetamol är inte förändrad hos äldre personer. Ingen dosjustering är nödvändig för denna population.

### **5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter**

Prekliniska uppgifter visade inte några särskilda risker för mänskliga utöver den information som finns i andra avsnitt av produktresumén.

Studier av lokal tolerans av Paracetamol Baxter hos råtta och kanin visade god tolerans. Frånvaro av fördröjd kontaktöverkänslighet har testats på marsvin.

Det saknas konventionella reproduktions- och utvecklingstoxikologiska studier som är utförda enligt gällande riktlinjer.

## **6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1 Förteckning över hjälpmänen**

Cysteinhydrokloridmonohydrat (E920)

Dinatriumfosfat (E339)

Koncentrerad saltsyra (för pH-justering) (E507)

Mannitol (E421)

Natriumhydroxid (för pH-justering) (E524)

Vatten för injektionsvätskor

### **6.2 Inkompatibiliteter**

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

### **6.3 Hållbarhet**

2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning i lösningarna som listas i avsnitt 6.6 har visats för 48 timmar vid 20–25 °C.

I mikrobiologiskt hänseende ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade antiseptiska förhållanden.

### **6.4 Särskilda förvaringsanvisningar**

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

### **6.5 Förpackningsotyp och innehåll**

50 ml fyllnadsvolym i 100 ml injektionsflaska av klart typ II-glas med propp av klorobutylgummi och rött flip off-lock av aluminium.

100 ml fyllnadsvolym i 100 ml injektionsflaska av klart typ II-glas med propp av klorobutylgummi och blått flip off-lock av aluminium.

Förpackningsstorlek: förpackning med 25 injektionsflaskor.

## **6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering**

Använd en 0,8 mm nål och perforera proppen vertikalt på den specifikt angivna platsen.

Före administrering ska produkten inspekteras visuellt med avseende på eventuella partiklar och missfärgning. Endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras.

Paracetamol Baxter kan spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning upp till en tiondel (en volym Paracetamol Baxter till nio volymer spädningsvätska). Den utspädda lösningen ska inspekteras visuellt och ska inte användas om opalescens, synliga partiklar eller utfällning förekommer.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

## **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Baxter Holding B.V.  
Kobaltweg 49  
3542CE Utrecht  
Nederlanderna

## **8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

37685

## **9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

Datum för det första godkännandet: 14.06.2021

Datum för den senaste förnyelsen:

## **10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

19.10.2022