

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Yksi injektiopullo sisältää 1 g keftriaksonia (keftriaxoninatriumina).
Natriumin määrä per injektiopullo: 83 mg (vastaa 3,6 mmola).

Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Yksi injektiopullo sisältää 2 g keftriaksonia (keftriaxoninatriumina).
Natriumin määrä per injektiopullo: 166 mg (vastaa 7,2 mmola).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Lähes valkoinen tai kellertävä jauhe.

4. KLIININSET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Ceftriaxone Kalceks on tarkoitettu aikuisille ja lapsille mukaan lukien täysiaikaisille vastasyntyneille seuraavien infektioiden hoitoon:

- bakteeriperäinen aivokalvotulehdus;
- avohoitokeuhkokkuume;
- sairaalakeuhkokkuume;
- akuutti välikorvatulehdus;
- vatsansisäiset infektiot;
- komplisoituneet virtsatieinfektiot (mukaan lukien pyelonefriitti);
- luu- ja nivelinfektiot;
- komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot;
- tippuri;
- kuppa;
- bakteeriperäinen endokardiitti.

Ceftriaxone Kalceks -valmistetta voidaan käyttää:

- keuhkoahaudaudin akuuttien pahenemisvaiheiden hoitoon aikuisille;
- disseminoituneen Lympen borrelioosin (varhaisvaiheen [vaihe II] ja myöhäisvaiheen [vaihe III]) hoitoon aikuisille ja lapsille mukaan lukien vähintään 15 vuorokauden ikäisille vastasyntyneille;
- leikkausalueen infektioiden preoperatiiviseen ennaltaehkäisyyn;
- neutropeenisten kuumeilevien potilaiden hoitoon, kun kuumeen epäillään johtuvan bakteri-infektiosta;
- bakteriemiapotilaiden hoitoon, kun bakteremia liittyy tai sen epäillään liittyvän johonkin edellä mainituista infektiosta.

Ceftriaxone Kalceks -valmistetta on annettava yhdessä muiden bakteerilääkkeiden kanssa silloin, kun sen vaikutuskirjo ei kata kaikkia niitä baktereereja, jotka ovat saattaneet aiheuttaa infektion (ks. kohta 4.4).

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viralliset suositukset on huomioitava.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Annoksen suuruus riippuu infektion vaikeusasteesta, infektion aiheuttajan antibioottiherkkyydestä, infektion paikasta ja tyypistä sekä potilaan iästä ja maksan ja munuaisten toiminnasta.

Alla olevissa taulukoissa suositellut annokset perustuvat tavanomaisiin käyttöaihekohtaisiin suosituksiin. Hyvin vaikeissa tapauksissa on harkittava suositellun annosalueen suurinta annosta.

Aikuiset ja yli 12 vuoden ikäiset lapset ($\geq 50 \text{ kg}$)

Keftriaksoni-annos*	Antoväli**	Käyttöaiheet
1–2 g	Kerran päivässä	Avohoitokeuhkokkuume
		Keuhkoahtaumataudin akuutit pahenemisvaiheet
		Vatsansisäiset infektiot
		Komplisoituneet virtsatieinfektiot (mukaan lukien pyelonefriitti)
2 g	Kerran päivässä	Sairaalakeuhkokkuume
		Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot
		Luu- ja nivelinfektiot
2–4 g	Kerran päivässä	Neutropeenisten kuumeilevien potilaiden hoito, kun kuumeen epäillään johtuvan bakteri-infektiosta
		Bakteeriperäinen endokardiitti
		Bakteeriperäinen aivokalvotulehdus

* Dokumentoidussa bakteremiassa on harkittava suositellun annosalueen suurinta annosta.

** Kaksi kertaa päivässä (12 tunnin välein) antoa voidaan harkita, jos vuorokausianos ylittää 2 g.

Erityisen annostusaikataulun vaativat käyttöaiheet aikuisilla ja yli 12 vuoden ikäisillä lapsilla ($\geq 50 \text{ kg}$):

- Akuutti välikorvatulehdus
Keftriaksonia voidaan antaa 1–2 g:n kerta-annos lihakseen.
Vähäiset tiedot viittaavat siihen, että tapauksissa, joissa potilas on vaikeasti sairas tai edellinen hoito on epäonnistunut, keftriaksoni saattaa tehosta, kun sitä annetaan lihakseen 1–2 g:n annos päivässä 3 päivän ajan.
- Leikkausalueen infektioiden preoperatiivinen ennaltaehkäisy
2 g:n kerta-annos ennen leikkausta.
- Tippuri
500 mg:n kerta-annos lihakseen.
- Kuppa
Yleensä suositeltava annos on 500 mg – 1 g kerran päivässä, joka hermostokuppassa suurennetaan 2 g:aan kerran päivässä, 10–14 päivän ajan. Kupppaa ja hermostokupppaa koskevat annossuositukset perustuvat vähäiseen määrään tietoja. Kansalliset tai paikalliset suositukset on huomioitava.

- Disseminoitunut Lymen borrelioosi (varhaisvaihe [vaihe II] ja myöhäisvaihe [vaihe III]) 2 g kerran päivässä 14–21 päivän ajan. Hoidon kestoja koskevat suositukset vaihtelevat. Kansalliset tai paikalliset suositukset on huomioitava.

Pediatriset potilaat

15 vuorokauden – 12 vuoden ikäiset vastasyntyneet, imeväiset ja lapset (< 50 kg)

Vähintään 50 kg painavien lasten annostus on sama kuin aikuisilla.

Keftriaksoni-annos*	Antoväli**	Käyttöaiheet
50–80 mg/kg	Kerran päivässä	Vatsansisäiset infektiot
		Komplisoituneet virtsatieinfektiot (mukaan lukien pyelonefritti)
		Avohoitokehukkuume
		Sairaalakeuhkokuume
50–100 mg/kg (enintään 4 g)	Kerran päivässä	Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot
		Luu- ja nivelinfektiot
		Neutropeenisten kuumeilevien potilaiden hoito, kun kuumeen epäillään johtuvan bakteri-infektiosta
80–100 mg/kg (enintään 4 g)	Kerran päivässä	Bakteeriperäinen aivokalvotulehdus
100 mg/kg (enintään 4 g)	Kerran päivässä	Bakteeriperäinen endokardiitti

* Dokumentoidussa bakteremiassa on harkittava suositellun annosalueen suurinta annosta.

** Kaksi kertaa päivässä (12 tunnin välein) antoa voidaan harkita, jos vuorokausia on yli 2 g.

Erityisen annostusaikataulun vaativat käyttöaiheet 15 vuorokauden – 12 vuoden ikäisillä vastasyntyneillä, imeväisillä ja lapsilla (< 50 kg)

- Akuutti välkorvatulehdus
Akuutin välkorvatulehduksen aloitushoitona voidaan antaa 50 mg/kg:n kerta-annos keftriaksonia lihakseen. Vähäiset tiedot viittaavat siihen, että tapauksissa, joissa lapsi on vaikeasti sairas tai edellinen hoito on epäonnistunut, keftriaksoni saattaa tehota, kun sitä annetaan lihakseen 50 mg/kg:n annos päivässä 3 päivän ajan.
- Leikkausalueen infektioiden preoperatiivinen ennaltaehkäisy
50-80 mg/kg:n kerta-annos ennen leikkausta.
- Kuppa
Yleensä suositeltava annos on 75–100 mg/kg (enintään 4 g) kerran päivässä 10–14 päivän ajan. Kuppa ja hermostokuppa koskevat annossuositukset perustuvat vähäiseen määärään tietoja. Kansalliset tai paikalliset suositukset on huomioitava.
- Disseminoitunut Lymen borrelioosi (varhaisvaihe [vaihe II] ja myöhäisvaihe [vaihe III]) 50–80 mg/kg kerran päivässä 14–21 päivän ajan. Hoidon kestoja koskevat suositukset vaihtelevat. Kansalliset tai paikalliset suositukset on huomioitava.

0–14 vuorokauden ikäiset vastasyntyneet

Keftriaksoni on vasta-aiheinen keskosille, joiden ikä äidin viimeisistä kuukautisista laskettuna (gestaatioikä + kronologinen ikä) on enintään 41 viikkoa.

Keftriaksoni-annos*	Antoväli	Käyttöaiheet
20–50 mg/kg	Kerran päivässä	Vatsansisäiset infektiot
		Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot
		Komplisoituneet virtsatieinfektiot (mukaan lukien pyelonefriitti)
		Avohoitokeuhkokkuume
		Sairaalaakeuhkokkuume
		Luu- ja nivelinfektiot
		Neutropeenisten kuumeilevien potilaiden hoito, kun kuumeen epäillään johtuvan bakteeri-infektiosta
50 mg/kg	Kerran päivässä	Bakteeriperäinen aivokalvotulehdus
		Bakteeriperäinen endokardiitti

* Dokumentoidussa bakteremiassa on harkittava suositellun annosalueen suurinta annosta. Enimmäisannosta 50 mg/kg päivässä ei saa ylittää.

Erityisen annostusaikataulun vaativat käyttöaiheet 0–14 vuorokauden ikäisillä vastasyntyneillä:

- Akuutti välikorvatulehdus
Akuutin välikorvatulehduksen aloitushoitona voidaan antaa 50 mg/kg:n kerta-annos keftriaksonia lihakseen.
- Leikkausalueen infektioiden preoperatiivinen ennaltaehkäisy
20–50 mg/kg:n kerta-annos ennen leikkausta.
- Kuppa
Yleensä suositeltava annos on 50 mg/kg kerran päivässä 10–14 päivän ajan. Kuppa ja hermostokuppa koskevat annossuositukset perustuvat vähäiseen määrään tietoja. Kansalliset tai paikalliset suositukset on huomioitava.

Hoidon kesto

Hoidon kesto vaihtelee taudin kulun mukaan. Kuten antibioottihoidossa yleensä, keftriaksonin antoa on jatkettava 48–72 tunnin ajan sen jälkeen, kun potilaas on kuumeeton tai bakteerien häätö on vahvistettu.

Jäkkäät potilaat

Aikuisille suositeltuja annoksia ei tarvitse muuttaa jäkkäille potilaille edellyttäen, että potilaan munuaiset ja maksat toimivat riittävän hyvin.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Saatavilla olevien tietojen perusteella annosta ei tarvitse muuttaa lievä tai keskivaikean maksan vajaatoiminnan vuoksi edellyttäen, että munuaisten toiminta ei ole heikentynyt.

Vaikaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole tutkimustietoa saatavilla (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Keftriaksonin annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnan vuoksi edellyttäen, että maksan toiminta ei ole heikentynyt. Poikkeuksena on preterminaalin munuaisten vajaatoiminta (kreatiiniinin puhdistuma < 10 ml/min), jolloin keftriaksonin vuorokausiannos ei saa ylittää 2 g:aa. Dialyysipotilaille ei tarvitse antaa lisäännosta dialyysisin jälkeen. Keftriaksoni ei poistu peritoneaalili- tai hemodialyysissä. Tehon ja turvallisuuden huolellista kliinistä seurantaa suositellaan.

Potilaat, joilla on vaikea maksan ja munuaisten vajaatoiminta.

Tehon ja turvallisuuden huolellista kliinistä seurantaa suositellaan, jos potilaalla on sekä munuaisten että maksan vaikea vajaatoiminta.

Antotapa

Laskimoon, lihakseen.

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten voidaan antaa injektiona lihakseen (i.m.), hitaana injektiona laskimoon (i.v.) ja infuusiona laskimoon (i.v.).

Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten voidaan antaa injektiona lihakseen (i.m.) ja infuusiona laskimoon (i.v.).

Lihakseen anto

Ceftriaxone Kalceks voidaan antaa syvänä injektiona lihakseen. Injektiot lihakseen on pistettävä suhteellisen suuren lihaksen runkoon. Yhteen injektiokohtaan ei saa pistää enempää kuin 1 g. Jos annos on suurempi kuin 1 g, se on jaettava ja pistettävä useampaan kuin yhteen kohtaan (ks. kohta 6.6). Jos annos on suurempi kuin 2 g, se on annettava laskimoon. Lihakseen antoa on harkittava tilanteissa, joissa laskimoon anto ei ole mahdollista tai se sopii potilaalle huonommin kuin lihakseen anto.

Koska liuottimena käytetään lidokaiinia, käyttövalmista liuosta ei saa antaa laskimoon (ks. kohta 4.3). Lidokaïinivalmisten valmisteyhteenvedossa olevat tiedot on otettava huomioon.

Laskimoon anto

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten voidaan antaa vähintään 30 minuutin kestoisena infuusiona laskimoon (ensisijainen antotapa) tai 5 minuutin kestoisena hitaana injektiona laskimoon. Toistuvat injektiot laskimoon on annettava 5 minuutin kestoisina ja mieluiten suurehkoihin laskimoihin.

Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten voidaan antaa vähintään 30 minuutin kestoisena infuusiona laskimoon.

Imeväisillä ja enintään 12 vuoden ikäisillä lapsilla laskimoon annettavat vähintään 50 mg/kg:n annokset on annettava infuusiona. Vastasyntyneillä laskimoon annettavat annokset on annettava 60 minuutin kestoisina infuusioina kernikteruksen mahdollisen riskin pienentämiseksi (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Keftriaksoni on vasta-aiheinen vastasyntyneille (≤ 28 vuorokautta), jotka tarvitsevat (tai joiden odotetaan tarvitsevan) hoitoa kalsiumia sisältävillä laskimoon annettavilla liuoksilla, kuten parenteraalisilla ravintoliuoksilla, keftriaksonin ja kalsiumin saostumisen riskin vuoksi (ks. kohta 4.3).

Kalsiumia sisältäviä laimentimia (esim. Ringerin liuosta tai Hartmannin liuosta) ei saa käyttää keftriaksoni-injektiopullojen käyttökuntaan tai käyttökuntaan saattetun injektiopullen edelleen laimentamiseen laskimoon antoa varten, sillä se voi aiheuttaa saostumista. Keftriaksonin ja kalsiumin saostuminen on mahdollista myös silloin, jos keftriaksoni sekoittuu kalsiumia sisältävän liuoksen kanssa saman laskimoyhteyden kautta annettaessa. Siksi keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia ei saa sekoittaa keskenään tai antaa samanaikaisesti (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 6.2).

Leikkausalueen infektioiden preoperatiivisessa ennaltaehkäisyssä keftriaksoni on annettava 30-90 minuuttia ennen leikkausta.

Liuoksen väri käyttökuntaan saattamisen/laimentamisen jälkeen on hieman kellertävä tai ruskehtavan keltainen, säilytsajan, pitoisuuden ja käytetyn liuottimen mukaan, mutta tällä ei ole vaikutusta lääkevalmisteen tehoon.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisten saattamisesta/laimentamisesta käyttökuntaan ennen lääkkeen antoa.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyyys kefriaksonille, muille kefalosporiineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Aiempi vaikea yliherkkyyys (esim. anafylaktinen reaktio) muun tyypisille beetalaktaamirakenteiselle bakteerilääkkeille (esim. penisilliineille, monobaktaameille tai karbapeneemeille).

Kefriaksoni on vasta-aiheinen:

- keskosille, joiden ikä äidin viimeisistä kuukautisista laskettuna (gestaatioikä + kronologinen ikä) on enintään 41 viikkoa*;
- täysiaikaisille vastasyntyneille (enintään 28 vuorokauden ikäisille):
 - joilla on hyperbilirubinemia, ikterus, hyperalbuminemiasitoutuminen on todennäköisesti heikentynyt*;
 - jotka tarvitsevat (tai joiden odotetaan tarvitsevan) laskimonsisäistä kalsiumhoitoa tai kalsiumia sisältäviä infuusioita, kefriaksoni-kalsiumsuolan saostumisen riskin vuoksi (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 6.2).

* *In vitro*-tutkimukset ovat osoittaneet kefriaksonin voivan syrjäyttää seerumin albumiiniin sitoutuneen bilirubiinin, mikä voi aiheuttaa mahdollisen kernikteruksen riskin näille potilaille.

Jos injektiona lihakseen annettavan kefriaksoniliuoksen liuottimena käytetään lidokaiiniliuosta, lidokaiinin vasta-aiheet on poissuljettava ennen injektiota (ks. kohta 4.4). Ks. lidokaiinin valmisteyteenvedon tiedot, etenkin vasta-aiheet.

Lidokaiinia sisältävää kefriaksoniliuosta ei saa koskaan antaa laskimoon.

4.4 Varoituset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyyssreaktiot

Kuten kaikkien beetalaktaamirakenteisten bakteerilääkkeiden käytössä, vakavia ja joskus kuolemaan johtaneita yliherkkyyssreaktioita on raportoitu (ks. kohta 4.8). Vaikean yliherkkyyssreaktion tapauksessa kefriaksonihoidon aloittamista on selvitettävä, onko potilaalla aiemmin esiintynyt vaikeita yliherkkyyssreaktioita kefriaksonille, muille kefalosporiineille tai muun tyypisille beetalaktaamirakenteiselle lääkeaineille. Varovaisuutta on noudattettava, jos kefriaksonia annetaan potilaille, joilla on esiintynyt ei-vaikeaa yliherkkyyttä muille beetalaktaamirakenteiselle lääkeaineille.

Kefriaksonihoidon yhteydessä on raportoitu vaikeita iholaitavaikuttuksia (Stevens-Johnsonin oireyhtymää, Lyellin oireyhtymää / toksista epidermalista nekrolyssia ja yleisoireista eosinofillista oireyhtymää [DRESS]), jotka voivat olla henkeä uhkaavia tai kuolemaan johtavia. Näiden haittavaikuttusten yleisyyttä ei kuitenkaan tunneta (ks. kohta 4.8).

Jarisch-Herxheimerin reaktio (JHR)

Osalla spirokeettainfektion saaneista potilaista saattaa esiintyä Jarisch-Herxheimerin reaktio (JHR) pian kefriaksonihoidon aloittamisen jälkeen. JHR on yleensä itsestään rajoittuva tai hoidettavissa oireenmukaisella hoidolla. Antibioottihoitoa ei pidä lopettaa tällaisen reaktion vuoksi.

Yhteisvaikutukset kalsiumia sisältävien valmisteiden kanssa

Kuolemaan johtaneita reaktioita, jotka johtuvat keuhkoihin ja munuaisiin muodostuneista kefriaksoni-kalsiumsaostumista, on raportoitu keskosilla ja alle 1 kuukauden ikäisillä täysiaikaisilla vastasyntyneillä. Ainakin yhdessä näistä tapauksista potilas oli saanut kefriaksonia ja kalsiumia eri aikoina ja eri laskimoyhteyksien kanssa. Saatavilla olevat tutkimustiedot eivät sisällä rapportteja vahvistetusta suonensisäisestä saostumisesta potilailta, jotka ovat saaneet hoitoa kefriaksonilla ja kalsiumia sisältävillä liuoksilla tai muilla kalsiumia sisältävillä valmisteilla, lukuun ottamatta vastasyntyneitä potilaita. *In vitro*-tutkimukset osoittivat, että kefriaksonin ja kalsiumin saostumisen riski on suurempi vastasyntyneillä kuin muissa ikäryhmässä.

Potilaan iästä riippumatta kefriaksonia ei saa sekoittaa tai antaa samanaikaisesti kalsiumia sisältävien laskimoon annettavien liosten kanssa, edes eri infuusioletkujen tai eri infuusiokohtien kautta. Yli 28 vuorokauden ikäisille potilaille kefriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksi voidaan kuitenkin

antaa peräkkäin eri infuusioletkuja ja eri infuusiokohtia käyttämällä tai siten, että infuusioletkut vaihdetaan tai huuhdellaan huolellisesti fysiologisella keittosuolaliuoksella infuusoiden välillä, saostumisen välttämiseksi. Potilaille, jotka tarvitsevat jatkuvaan täydellistä parenteraalista ravitsemusta (TPN) kalsiumia sisältävillä liuoksilla, voidaan harkita vaihtoehtoista bakteerilääkehoitoa, johon ei liity samanlaista saostumisriskiä. Jos kefriaksonin käyttöä tällaisille potilaalle pidetään välttämättömänä, TPN-liuos ja kefriaksoni voidaan antaa samanaikaisesti eri infuusioletkujen ja infuusiokohtien kautta. Vaihtoehtoisen TPN-liuoksen infusoiminen voidaan keskeyttää kefriaksoni-infusion ajaksi ja infuusioletkut huuhdella infuusoiden välillä (ks. kohdat 4.3, 4.8, 5.2 ja 6.2).

Pediatriset potilaat

Kefriaksonin turvallisuus ja teho vastasyntyneiden, imeväisten ja lasten hoidossa on varmistettu niiden annosten osalta, jotka on kuvattu kohdassa Annostus ja antotapa (ks. kohta 4.2). Tutkimukset ovat osoittaneet kefriaksonin voivan, joidenkin muiden kefalosporiinien tavoin, syrjäyttää seerumin albumiiniin sitoutuneen bilirubiinin.

Kefriaksoni on vasta-aiheinen keskosille ja täysiaikaisille vastasyntyneille, joilla on kernikteruksen riski (ks. kohta 4.3).

Immuunivälitteen hemolyttinen anemia

Immuunivälitteistä hemolyttista anemiaa on havaittu kefalosporiineihin kuuluvia bakteerilääkkeitä, mukaan lukien kefriaksonia, saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Kefriaksonihoidon aikana esiintyneitä vaikeita ja myös kuolemaan johtaneita hemolyttisen anemian tapauksia on raportoitu sekä aikuisilla että lapsilla.

Jos potilaalle kehittyy anemia kefriaksonihoidon aikana, kefalosporiinihoitoon liittyvän anemian mahdollisuus on huomioitava ja kefriaksonihoido lopetettava, kunnes etiologia on selvitetty.

Pitkääikainen hoito

Pitkääikaisessa hoidossa on säännöllisesti tutkittava potilaan täydellinen verenkuva.

Koliitti/resistenttien mikrobiien liikkakasvu

Bakteerilääkkeisiin liittyvä koliväri ja pseudomembranoottista koliväri on raportoitu lähes kaikkien bakteerilääkkeiden, mukaan lukien kefriaksonin, käytössä, ja sen vaikeusaste voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan. Tämän diagnoosin mahdollisuus on siksi tärkeää huomioida, jos potilaalla esiintyy ripulia kefriaksonin annon aikana tai sen jälkeen (ks. kohta 4.8). Kefriaksonihoidon lopettamista ja *Clostridiooides difficile*-infektion spesifistä hoitoa on harkittava. Peristaltiikkaa estäviä lääkevalmisteita ei saa antaa.

Resistenttien mikrobiien aiheuttamat superinfektiot ovat mahdollisia, kuten muidenkin bakteerilääkkeiden käytössä.

Encefalopatia

Kefriaksonin käytössä on raportoitu encefalopatiaa (ks. kohta 4.8), etenkin iäkkäillä potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.2) tai keskushermoston häiriötä. Kefriaksoniin liittyvä encefalopatiaa epäiltäessä (esim. tajunnantason laskun, mielentilan muutoksen, myoklonuksen tai kouristuskohtausten vuoksi) kefriaksonihoidon lopettamista on harkittava.

Vaikea munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Tehon ja turvallisuuden huolellista kliinistä seurantaa suositellaan, jos potilaalla on sekä munuaisten että maksan vaikea vajaatoiminta (ks. kohta 4.2).

Vaikutus serologisten tutkimusten tuloksiin

Kefriaksoni saattaa aiheuttaa väärin positiivisia tuloksia Coombsin kokeessa. Kefriaksoni voi myös aiheuttaa väärin positiivisia tuloksia galaktosemaille (ks. kohta 4.8).

Myös ei-entsymaattisilla menetelmillä tehtävissä virtsan glukoosimääritysissä saatetaan saada väärin positiivisia tuloksia. Virtsan glukoosimääritysiin on kefriaksonihoidon aikana käytettävä entsymaattista menetelmää (ks. kohta 4.8).

Keftriaksoni saattaa virheellisesti alentaa tietyillä glukoosinseurantajärjestelmillä saatavia verensokeriarvoja. Ks. kulloinkin käytettävän järjestelmän käyttöohje. Vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä on käytettävä tarvittaessa.

Vaikutuskirjo

Keftriaksoni on melko kapeakirjoinen, minkä vuoksi se ei välittämättä sovella ainoana lääkkeenä tietyjen infektioiden hoitoon, jollei taudinalleuttaaja ole jo vahvistettu (ks. kohta 4.2).

Yhteisinfekcioissa, joissa epäliltyjen patogeenien joukossa on keftriaksonille resistenttejä mikrobeja, on harkittava myös toisen antibiootin antamista.

Lidokaiinin käyttö

Jos liuottimena käytetään lidokaiiniliuosta, keftriaksoniliuoksen saa antaa ainoastaan injektiona lihakseen. Lidokaiinin valmisteyhteenvedossa olevat vasta-aiheet, varoitukset ja muut olennaiset tiedot on huomioitava ennen käyttöä (ks. kohta 4.3). Lidokaiinia sisältävää keftriaksoniliuosta ei saa koskaan antaa laskimoon.

Sappikivitauti

Jos kaikukuvausessa havaitaan varjostumia, keftriaksoni-kalsiumsaostumien mahdollisuus on huomioitava. Sappikiviksi virheellisesti luultuja varjostumia on havaittu sappirakon kaikukuissa, ja niitä on havaittu useammin silloin, kun keftriaksonin päiväannos on ollut vähintään 1 g. Varovaisuutta on noudatettava etenkin pediatrisilla potilailla. Tällaiset saostumat häviävät keftriaksonihoidon lopettamisen jälkeen. Keftriaksoni-kalsiumsaostumiin on harvinaisissa tapauksissa liittynyt oireita. Oireellisissa tapauksissa suositellaan konservatiivista ei-kirurgista hoitoa, ja keftriaksonihoidon lopettamista on harkittava yksilöllisen hyöty-riskiarvion perusteella (ks. kohta 4.8).

Kolestaasi

Keftriaksonihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu haimatulehdustapauksia, jotka ovat saattaneet johtua sappitukoksesta (ks. kohta 4.8). Useimmilla näistä potilaista oli kolestaasin ja sappilietteen riskitekijöitä, kuten edeltävä suuri hoito, vaikea sairaus tai täydellinen parenteraalinen ravitsemus. Keftriaksoniin liittyvien sappisaostumien mahdollista osuutta haimatulehduksen laukaisijana tai sen kehitymistä edistävänä tekijänä ei voida sulkea pois.

Munuaiskivitauti

Munuaiskivitutitapauksia, jotka korjaantuvat keftriaksonihoidon lopettamisen jälkeen, on raportoitu (ks. kohta 4.8). Oireileville potilaille on tehtävä kaikukuvaus. Jos potilaalla on aiemmin ollut munuaiskivitauti tai hyperkalsiuria, keftriaksonin annon on perustuttava yksilölliseen hyöty-riskiarvioon.

Natrium

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infusiokuiva-aine, liuosta varten

Tämä lääkevalmiste sisältää 83 mg natriumia per injektiopullo, joka vastaa 4,15 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päävittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infusiokuiva-aine, liuosta varten

Tämä lääkevalmiste sisältää 166 mg natriumia per injektiopullo, joka vastaa 8,3 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päävittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kalsiumia sisältäviä laimentimia, kuten Ringerin liuosta tai Hartmannin liuosta, ei saa käyttää keftriaksoni-injektiopullojen kuiva-aineen käyttökuntooon saattamiseen tai käyttökuntooon saatetun sisällön edelleen laimentamiseen laskimoon antoa varten, sillä se voi aiheuttaa saostumista.

Keftriaksonin ja kalsiumin saostuminen on mahdollista myös silloin, jos keftriaksoni sekoittuu kalsiumia sisältävän liuoksen kanssa saman laskimoyhteyden kautta annettaessa. Keftriaksonia ei saa antaa samanaikaisesti kalsiumia sisältävien laskimoon annettavien liuosten kanssa. Tämä koskee myös kalsiumia sisältäviä jatkuvia infusioita, kuten letkuhaaran kautta annettavia parenteraalisia

ravintoliuoksia. Muille kuin vastasyntyneille potilaille kefriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksiä voidaan kuitenkin antaa peräkkäin, jos infuusioletkut huuhdellaan huolellisesti yhteensovivalla nesteellä infuusioiden välillä. *In vitro*-tutkimukset aikuisten ja vastasyntyneiden (napanuoran verestä saadulla) plasmalla osoittivat kefriaksonin ja kalsiumin saostumisen riskin olevan suurempi vastasyntyneillä (ks. kohdat 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 ja 6.2).

Samanaikainen käyttö suun kautta annettavien antikoagulantien kanssa saattaa lisätä K-vitamiinia estäävää vaikutusta ja verenvuotoriskiä. INR-arvon tiheä seuraaminen ja K-vitamiinin estäjän annostuksen säätäminen sen mukaan on suositeltavaa sekä kefriaksonihoidon aikana että hoidon jälkeen (ks. kohta 4.8).

Aminoglykosidien munuaistoksisuuden mahdollisesta lisääntymisestä samanaikaisessa käytössä kefalosporiinien kanssa on ristiriitaista näyttöä. Aminoglykosidipitoisuusien (ja munuaisten toiminnan) seurannasta annettuja kliinisiä suosituksia on tällaisissa tapauksissa noudatettava huolellisesti.

Kloramfenikolilla ja kefriaksonilla on *in vitro*-tutkimuksessa havaittu keskenään antagonistisia vaiktuksia. Tämän löydöksen klinistä merkitystä ei tunneta.

Yhteisvaiktuksia kefriaksonin ja suun kautta annettavien kalsiumia sisältävien valmisteiden välillä tai lihakseen annettavan kefriaksonin ja kalsiumia sisältävien (laskimoon tai suun kautta annettavien) valmisteiden välillä ei ole raportoitu.

Kefriaksoni saattaa aiheuttaa väärää positiivisia tuloksia Coombsin kokeessa.

Kuten muutkin antibiootit, kefriaksoni saattaa aiheuttaa väärää positiivisia tuloksia galaktosemaille.

Myös ei-entsymaattisilla menetelmillä tehtävissä virtsan glukoosimäärytyksissä voidaan saada väärää positiivisia tuloksia. Virtsan glukoosimäärytyksiin on kefriaksonihoidon aikana siksi käytettävä entsymaattista menetelmää.

Suurten kefriaksoniannosten ja voimakkaiden diureettien (esim. furosemidin) samanaikaisen annon jälkeen ei ole havaittu munuaisten toiminnan heikentymistä.

Probenesidin samanaikainen anto ei vähennä kefriaksonin eliminoitumista.

4.6 Hedelmällisyys, ras kaus ja imetys

Raskaus

Kefriaksoni läpäisee veri-istukkaesteen. On vain vähän tietoja kefriaksonin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuuria alkion ja sikiön kehitykseen tai perinataaliseen tai postnataaliseen kehitykseen kohdistuvia toksisia vaiktuksia (ks. kohta 5.3). Kefriaksonia saa antaa raskauden aikana ja etenkin ensimmäisellä raskauskolmanneksella vain, jos hoidon hyödyt arvioidaan riskejä suuremmiksi.

Imetys

Kefriaksoni erittyy ihmisen rintamaitoon pieninä pitoisuksina, mutta terapeutillisilla annoksilla sen ei odoteta vaikuttavan imetettäviin lapsiin. Ripulin ja limakalvojen sieni-infektioiden riskiä ei kuitenkaan voida poissulkea. Myös herkistymisen mahdollisuus on huomioitava. On päättävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko kefriaksonihoidoita ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Lisääntymistä koskevissa eläinkokeissa ei ole havaittu vaiktuksia urosten tai naaraiden hedelmällisyteen.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Keftriaksonihoidon aikana saattaa esiintyä haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn (esim. huimaus) (ks. kohta 4.8). Potilaita on neuvottava noudattamaan varovaisuutta ajamisen tai koneiden käytön yhteydessä.

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät keftriaksonin käytössä raportoidut haittavaikutukset ovat eosinofilia, leukopenia, trombosytopenia, ripuli, ihottuma ja maksaentsyyymiаровojen kohoaminen.

Keftriaksonin haittavaikutusten yleisyydet perustuvat kliinisten tutkimusten tietoihin.

Alla olevassa taulukossa käytetyt MedDRA-yleisyysluokat ovat: hyvin yleinen ($\geq 1/100$), yleinen ($\geq 1/100, < 1/10$), melko harvinainen ($\geq 1/1\,000, < 1/100$), harvinainen ($\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$), hyvin harvinainen ($< 1/1\,000$) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmäluokka	Yleinen	Melko harvinainen	Harvinainen	Tunte maton ^a
Infektiot		Sukkuolielinten sieni-infektiō	Pseudo-membranoottinen koliitti ^b	Superinfektiō ^b
Veri ja imukudos	Eosinofilia Leukopenia Trombosytopenia	Granulosytopenia Anemia Hyytymishäiriöt		Hemolyttinen anemia ^b Agranulosytoosi
Immuuni-järjestelmä				Anafylaktinen sokki Anafylaktinen reaktio Anafylaktoidinen reaktio Yliherkkyybs ^b Jarisch-Herxheimerin reaktio ^b
Hermosto		Päänsärky Huimaus	Enkefalopatia	Kouristuskohtaus
Kuulo ja tasapainoelin				Kiertohuimaus
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina			Bronkospasmi	
Ruoansulatuselimistö	Ripuli ^b Löysä uloste	Pahoinvointi Oksentelu		Haimatulehdus ^b Suutulehdus Kielitulehdus
Maksa ja sappi	Maksaentsyyymiаровojen kohoaminen			Sappisaostumat ^b Kernikterus Maksatulehdus ^c Kolestaattinen maksatulehdus ^{b,c}

Iho ja ihonalainen kudos	Ihottuma	Kutina	Nokkosihottuma	Stevens-Johnsonin oireyhtymä ^b Toksinen epidermaalinen nekrolyysi ^b Erythema multiforme Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi Yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS) ^b
Munuaiset ja virtsatiet			Hematuria Glykosuria	Oliguria Munuaissaostumat (korjautuva)
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat		Laskimotulehdus Injektiokohdan kipu Kuumu	Turvotus Vilunväristykset	
Tutkimukset		Veren kreatiini- pitoisuuden kohamisen		Coombsin kokeen väärä positiivinen tulos ^b Galaktosemia- kokeen väärä positiivinen tulos ^b Ei- entsymaattisella menetelmällä tehtävän virtsan glukoosi- määritynä väärä positiivinen tulos ^b

^a Perustuu markkinoille tulon jälkeisiin raportteihin. Koska nämä haittavaikutukset ovat vapaaehtoisesti raportoituja eikä populaation koosta ole varmuutta, yleisyyden luotettava arvioiminen ei ole mahdollista, ja yleisyyssluokaksi on näin ollen ilmoitettu tuntematon.

^b Ks. kohta 4.4

^c Korjautuu yleensä keftriaksonihoidon lopettamisen jälkeen.

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Infektiot

Raportit keftriaksonin käytön jälkeisestä ripulista saattavat liittyä *Clostridioides difficile*-infektioon. Asianmukainen nesteytys ja elektrolyyttien anto on aloitettava (ks. kohta 4.4).

Keftriaksoni-kalsiumsuolan saostuminen

Keskosilla ja täysiaikaisilla vastasyntyneillä (ikä < 28 vuorokautta) on harvinaisissa tapauksissa raportoitu valkeita ja joissakin tapauksissa kuolemaan johtaneita haittavaikutuksia laskimoon annetun keftriaksonia ja kalsiumia sisältävän hoidon jälkeen. Keftriaksoni-kalsiumsuolan saostumia on havaittu kuolleiden potilaiden keuhkoissa ja munuaississa. Vastasyntyneiden suuri saostumariski johtuu pienestä verimääristä ja keftriaksonin pidemmästä puoliintumisajasta aikuisiin verrattuna (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2).

Tapausia, joissa virtsateihin on muodostunut kefriaksonisaostumia, on raportoitu. Useimmat niistä ovat olleet lapsilla, jotka saivat hoitoa suurilla annoksilla (esim. ≥ 80 mg/kg/vrk tai yli 10 gramman kokonaisannos) tai joilla oli muita riskitekijöitä (esim. kuivuminen, vuoteenomana oleminen). Tämä tapahtuma voi olla oireeton tai oireellinen, ja se saattaa johtaa virtsanjohtimen tukkeumaan tai postrenaaliseen akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan, mutta se korjautuu yleensä kefriaksonihoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Kefriaksoni-kalsiumsuolan saostumista sappirakossa on myös havaittu, pääasiassa potilailla, jotka ovat saaneet hoitoa tavanomaisia, suositeltuja annoksia suuremmilla annoksilla. Saostumien ilmaantuvuus laskimonsisäistä hoitoa saaneilla lapsilla on vaihdellut eri prospektiivistien tutkimusten välillä, ja se on joissakin tutkimuksissa ylittänyt 30 %. Ilmaantuvuus vaikuttaa olevan pienempi hitaiden (20–30 minuutin kestoisten) infuusioiden yhteydessä. Tämä vaikutus on yleensä oireeton, mutta saostumiin on harvinaisissa tapauksissa liittynyt kliinisä oireita, kuten kipua, pahoinvointia ja oksentelua. Tällaisissa tapauksissa suositellaan oireenmukaista hoitoa. Saostumat korjautuvat yleensä kefriaksonihoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Kefriaksonipitoisuutta ei voi pienentää hemodialyssilla tai peritoneaalidialyssilla. Erityistä vastalääkettä ei ole saatavilla. Yliannostusta on hoidettava oireenmukaisesti.

5. FARMAKOLOGISET OMNAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet, kolmannen sukupolven kefalosporiinit, ATC-koodi: J01DD04

Vaikutusmekanismi

Kefriaksoni estää bakteerin soluseinän synteesiä sitoutumalla penisilliiniä sitoviin proteiineihin. Tämä johtaa soluseinän (peptidoglykaanin) biosynteesin keskeytymiseen ja bakteerisolun hajoamiseen ja kuolemaan.

Resistenssi

Bakteerien resistenssi kefriaksonille saattaa johtua yhdestä tai useammasta seuraavista mekanismeista:

- beetalaktamaasien aiheuttama hydrolyysi, mukaan lukien laajakirjoiset beetalaktamaasit (ESBL), karbapenemaasit ja AmpC-entsyymit, jotka saattavat indusoitua tai derepressoitua pysyvästi tietyissä aerobisissa gramnegatiivisissa bakterilajeissa
- penisilliiniä sitovien proteiinien heikentynyt affineetti kefriaksoniin
- gramnegatiivisten bakteerien ulkokalvon läpäisemättömyys
- bakteerien ulospumppausmekanismit (effluksimekanismit).

Herkkyysmääritysten rajat

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) asettamat pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) herkkyysrajat on lueteltu European Medicines Agency (EMA) verkkosivulla: [https://www.ema.europa.eu/en/evaluation-medicinal-products-indicated-treatment-bacterial-infections-scientific-guideline#minimum-inhibitory-concentration-\(mic\)-breakpoints-section](https://www.ema.europa.eu/en/evaluation-medicinal-products-indicated-treatment-bacterial-infections-scientific-guideline#minimum-inhibitory-concentration-(mic)-breakpoints-section)

Kliininen teho spesifisiä taudinaileuttaajia vastaan

Tiettyjen lajien hankitun resistenssin esiintyyvys saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten paikallisen resistenssitilanteen tunteminen on tärkeää, varsinkin vaikeita infektoita hoidettaessa.

Asiantuntija-apua on tarvittaessa pyydettävä, mikäli paikallinen resistenssitilanne tekee kefriaksonin käytöstä ongelmallista ainakin joidenkin infektiotyyppejä hoidossa.

Yleisesti herkät lajit

Grampositiiviset aerobit

Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät)^f

Koagulaasinegatiiviset stafylokokit (metisilliinille herkät)^f

Streptococcus pyogenes (ryhmä A)

Streptococcus agalactiae (ryhmä B)

Streptococcus pneumoniae

Viridans-ryhmän streptokokit

Gramnegatiiviset aerobit

Borrelia burgdorferi

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoea

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Treponema pallidum

Lajit, joiden hankittu resistenssi voi aiheuttaa ongelmia

Grampositiiviset aerobit

Staphylococcus epidermidis⁺

Staphylococcus haemolyticus⁺

Staphylococcus hominis⁺

Gramnegatiiviset aerobit

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli[%]

Klebsiella pneumoniae[%]

Klebsiella oxytoca[%]

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Serratia marcescens

Anaerobit

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Clostridium perfringens

Luontaisesti resistentit mikrobit

Grampositiiviset aerobit

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Gramnegatiiviset aerobit

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobit

Clostridioides difficile

Muut

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Ureaplasma urealyticum

^f Kaikki metisilliinille resistentit stafylokokit ovat resistenttejä keftriaksonille.

⁺ Resistenssin esiintyvyys > 50 % vähintään yhdellä alueella

[%] Laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavat kannat ovat aina resistenttejä.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Lihakseen anto

Injektiona lihakseen annetun keftriaksonin keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa on noin puolet samansuuruisen laskimoon annetun annoksen pitoisuudesta. Lihakseen annetun 1 g:n kerta-annoksen jälkeinen huippupitoisuus plasmassa on noin 81 mg/l, ja se saavutetaan 2–3 tunnissa.

Pitoisuus-aikakäyrän alle jävä pinta-ala (AUC) on lihakseen annon jälkeen sama kuin samansuuruisen laskimoon annetun annoksen jälkeen.

Laskimoon anto

Boluksena laskimoon annettujen 500 mg:n ja 1 g:n keftriaksoniannosten keskimääräiset huippupitoisuudet plasmassa ovat noin 120 mg/l ja 200 mg/l. Infuusiona laskimoon annettujen 500 mg:n, 1 g:n ja 2 g:n keftriaksoniannosten huippupitoisuudet plasmassa ovat noin 80 mg/l, 150 mg/l ja 250 mg/l.

Jakautuminen

Keftriaksonin jakautumistilavuus on 7–12 l. Pitoisuksia, jotka ylittävät selvästi pienimmän bakteerien kasvua estävän lääkeaine pitoisuuden useimpien oleellisten taudinaheuttajien osalta, on havaittavissa keuhkoissa, sydämessä, sappiteissä/maksassa, risoissa, välikorvan ja nenän limakalvoilla, luissa sekä aivo-selkäydinnesteessä, keuhkopussinesteessä, eturauhaseritteessä ja nivelloiteessa. Keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa (C_{max}) suurenee noin 8–15 % toistuvassa annossa, ja vakaan tilan pitoisuus saavutetaan useimmitten 48–72 tunnissa antoreitin mukaan.

Tiettyjen kudosten läpäiseminen

Keftriaksoni läpäisee aivo-selkäydinkalvot. Läpäisy on suurinta, kun kalvot ovat tulehtuneita.

Keftriaksonin keskimääräisen huippupitoisuuden aivo-selkäydinnesteessä potilailla, joilla on bakteeriperäinen aivokalvotulehdus, on raportoitu olevan enimmillään 25 % pitoisuudesta plasmassa, verrattuna 2 %:iin potilailla, joiden aivokalvot eivät ole tulehtuneet. Keftriaksonin huippupitoisuus aivo-selkäydinnesteessä saavutetaan noin 4–6 tuntia laskimoon annetun injektion jälkeen. Keftriaksoni läpäisee veri-istukkaesteen ja erittyy pieninä pitoisuksina rintamaitoon (ks. kohta 4.6).

Proteiineihin sitoutuminen

Keftriaksoni sitoutuu palautuvasti albumiiniin. Plasman proteiineihin sitoutuminen on noin 95 %, kun keftriaksonin pitoisuus plasmassa on alle 100 mg/l. Sitoutuminen on saturoituvaa ja sitoutunut osuus pienenee pitoisuuden nostessa (enimmillään 85 %, kun pitoisuus plasmassa on 300 mg/l).

Biotransformaatio

Keftriaksoni ei metaboloidu systeemisesti vaan muuntuu suolistoflooran vaikutuksesta inaktiiviseksi metaboliiteiksi.

Eliminaatio

Kokonaiskeftriaksonin (sitoutuneen ja sitoutumattoman keftriaksonin) plasmapuhdistuma on 10–22 ml/min. Munuaispuhdistuma on 5–12 ml/min. Keftriaksonista 50–60 % erityy muuttumattomana virtsaan, pääasiassa glomerulussuodatuksen kautta, ja 40–50 % erityy muuttumattomana sappeen. Aikuisilla kokonaiskeftriaksonin eliminaation puoliintumisaika on noin 8 tuntia.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta sairastavat potilaat

Keftriaksonin farmakokinetiikka muuttuu minimaalisesti potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, ja puoliintumisaika pitenee vain hieman (alle kaksinkertaiseksi) vaikeakin munuaisten vajaatoiminta sairastavilla potilailla.

Suhteellisen vähäinen puoliintumisajan piteneminen munuaisten vajaatoiminnassa selittyy muun kuin munuaisten kautta tapahtuvan puhdistuman kompensoivasta lisääntymisestä, joka johtuu proteiineihin sitoutumisen vähentymisestä ja vastaavasta kokonaiskeftriaksonin ei-renaalisen puhdistuman lisääntymisestä.

Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla keftriaksonin eliminaation puoliintumisaika ei pitene, mikä johtuu munuaispuhdistuman kompensoivasta lisääntymisestä ja keftriaksonin vapaan fraktion lisääntymisestä. Näistä jälkimmäinen aiheuttaa osaltaan havaitun paradoksaalisen kokonaispuhdistuman lisääntymisen, johon liittyy jakautumistilavuuden vastaava suureneminen.

Iäkkääät potilaat

Keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika yli 75-vuotiailla iäkkäillä potilailla on tavallisesti 2–3 kertaa pidempi kuin nuorilla aikuisilla.

Pediatriset potilaat

Keftriaksonin puoliintumisaika on pidempi vastasyntyneillä kuin lapsilla ja aikuisilla. Syntymän jälkeisten 14 vuorokauden aikana tekijät, kuten glomerulussuodatuksen vähentyminen ja proteiineihin sitoutumisen muutokset, saattavat suurentaa vapaan keftriaksonin pitoisuutta entisestään.

Keftriaksonin puoliintumisaika lapsilla on lyhyempi kuin vastasyntyneillä ja aikuisilla.

Kokonaiskeftriaksonin plasmapuhdistuma ja jakautumistilavuus ovat suurempia vastasyntyneillä, imeväisillä ja lapsilla verrattuna aikuisiin.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Keftriaksonin farmakokinetiikka on ei-lineaarista. Kaikki keftriaksonin kokonaispitoisuuteen perustuvat farmakokineettiset perusparametrit, lukuun ottamatta eliminaation puoliintumisaikaa, ovat annosriippuvaisia ja suurenevät vähemmän kuin suhteessa annokseen. Ei-lineaarisuus johtuu plasman proteiineihin sitoutumisen saturoitumisesta, ja se on koskee näin ollen plasman kokonaiskeftriaksonin pitoisuutta, mutta ei vapaan (sitoutumattoman) keftriaksonin pitoisuutta.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Kuten muillakin betalaktaameilla, farmakokineettis-farmakodynaaminen indeksi, joka korreloii parhaiten tehon kanssa *in vivo*, on prosentiosuus antovälistä, jolloin sitoutumattoman keftriaksonin pitoisuus ylittää pienimmän bakteerien kasvun estävän pitoisuuden (MIC) yksittäisten kohdelajien osalta (%T > MIC).

5.3 Prekliinis et tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa suurten keftriaksoni-kalsiumsuola-annosten havaittiin johtavan konkrementtien ja saostumien muodostumiseen koirien ja apinoiden sappirakoissa. Vaikutus oli korjautuva. Eläinkokeissa ei havaittu näyttöä lisääntymistoksisuudesta tai genotoksisuudesta. Keftriaksonilla ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointi

Ympäristöriskien arviointitutkimukset ovat osoittaneet, että keftriaksoni saattaa olla myrkyllistä ympäristölle (ks. kohta 6.6).

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Ei ole.

6.2 Yhteensopimattomuudet

Kirjallisuudessa esitettyjen raporttien mukaan keftriaksoni ei ole yhteensoviva amsakriiniin, vankomysiiniin, flukonatsolin ja aminoglykosidien kanssa.

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

Etenkään kalsiumia sisältäviä laimentimia (esim. Ringerin liuosta tai Hartmannin liuosta) ei saa käyttää keftriaksoni-injektiopullojen kuiva-aineen käyttökuntaan saattamiseen tai käyttökuntaan saatetun sisällön edelleen laimentamiseen laskimoon antoa varten, sillä se voi aiheuttaa saostumista. Keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia – mukaan lukien täydelliseen parenteraaliseen ravitsemukseen käytettävät liuoksia – ei saa sekoittaa keskenään tai antaa samanaikaisesti (ks. kohdat 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.8).

Jos hoito koostuu keftriaksonin ja muiden antibioottien yhdistelmästä, lääkkeitä ei saa antaa samalla ruiskulla tai samassa infuusioliuoksessa.

6.3 Kestoaika

2 vuotta.

Kun valmiste on saatettu käyttökuntaan 10 mg/ml (1 %) lidokaainihydrokloridiliuoksella lihakseen annettavaa injektiota varten

Kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 6 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologisesta näkökulmasta valmiste on käytettävä välittömästi, ellei käyttökuntaan saattamiseen käytettävä menetelmä poissulje mikrobiologisen kontaminaation riskiä. Jos liuosta ei käytetä heti, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Kun valmiste on saatettu käyttökuntaan laskimoon annettavaa injektiota varten

Käytönaikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 48 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa ja 12 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologisesta näkökulmasta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä heti, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä ne normaalisti saa yliittää 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei käyttökuntaan saattaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Kun valmiste on saatettu käyttökuntaan laskimoon annettavaa infuusiota varten

Käyttökuntaan saatettu liuos on laimennettava heti käyttökuntaan saattamisen jälkeen.

Kun käyttökuntaan saatettu liuos on laimennettu laskimoon annettavaa infuusiota varten
Käytönaikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 48 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa ja 12 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologisesta näkökulmasta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos laimennettua liuosta ei käytetä heti, säilytsaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä ne normaalisti saa yliittää 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloidussa ja validoidussa aseptisissa olosuhteissa.

6.4 Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.
Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntaan saatetun ja laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakauskoko (pakauskoot)

Ceftriaxone Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Jauhe väritömissä lasisessa injektiopullossa, joka on suljettu harmaalla bromobutyylkumitulpalla sekä alumiinikorkilla, jonka päällä on tummansininen muovinen flip-off-korkki.

Ceftriaxone Kalceks 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Jauhe väritömissä lasisessa injektiopullossa, joka on suljettu harmaalla bromobutyylkumitulpalla sekä alumiinikorkilla, jonka päällä on oranssi muovinen flip-off-korkki.

Injektiopullot on pakattu pahvikoteloihin.

Pakauskoot: 1 tai 10 injektiopulhoa.

Kaikkia pakauskokoa ei vältämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiseelle ja muut käsittelyohjeet

Vain kertakäytöön.

Käyttökuntaan saatettujen ja laimennettujen liuosten säilytys, ks. kohta 6.3.

Yhteensopivuus seuraavien liuosten kanssa on osoitettu:

- injektionesteisiin käytettävä vesi;
- 10 mg/ml (1 %) lidokaiinihydrokloridiliuos (vain lihakseen);
- 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuos;
- 50 mg/ml (5 %) glukoosiliuos;
- 100 mg/ml (10 %) glukoosiliuos;
- 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridi- ja 25 mg/ml (2,5 %) glukoosiliuos.

Injektiolihakseen

Lihakseen annettavaa injektiota varten 1 g keftriaxonolia liuotetaan 3,5 ml:aan 1 % lidokaiinihydrokloridiliuosta, tai 2 g keftriaxonolia liuotetaan 7 ml:aan 1 % lidokaiinihydrokloridiliuosta.

Liuos on annettava syvänä injektiona lihakseen. Jos annos on suurempi kuin 1 g, se on jaettava ja pistettävä useampaan kuin yhteen kohtaan (ks. kohta 4.2).

Ceftriaxone Kalceks -valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa samassa ruiskussa, lukuun ottamatta 1 % lidokaiinihydrokloridiliusta (vain lihakseen annettavat injektiot).

Koska liuottimena käytetään lidokaiinia, käyttövalmista liuosta ei saa antaa laskimoon.

Injektiolaskimoon

Laskimoon annettavaa injektiota varten 1 g keftriaksonia liuotetaan 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävä vettä. Injektio annetaan joko suoraan laskimoon tai 5 minuutin kestoisena injektiona infuusioletkun kautta.

Keftriaksonin pitoisuus lopullisessa injektiona laskimoon annettavassa liuoksessa on 93 mg/ml.

Infuusio laskimoon

Laskimoon annettavaa infuusiota varten 1 g tai 2 g keftriaksonia liuotetaan ja tarvittaessa laimennetaan edelleen jollakin edellä luetelluista yhteensopivista, kalsiumia sisältämättömistä liuoksista (lukuun ottamatta lidokaiinihydrokloridiliuosta, koska lidokaiini liuoksia ei saa koskaan antaa laskimoon).

Keftriaksonin pitoisuus lopullisessa infuusiona laskimoon annettavassa liuoksessa on 48 mg/ml:

Ceftriaxone Kalceks -kuiva-aine	Laimentimen määrä	Keftriaksonin pitoisuus lopullisessa liuoksessa
1 g	20 ml	48 mg/ml
2 g	40 ml*	48 mg/ml

* Kuiva-aine saatetaan ensin käyttökuntaan 20 ml:lla yhteensopivaa laimenninta. Käyttökuntaan saatettu liuos laimennetaan sen jälkeen edelleen 20 ml:lla yhteensopivaa laimenninta 48 mg/ml:n pitoisuuteen käyttämällä asianmukaista antovälinettä (esim. infuusipumppu, infuusipussi).

Kunkin annoksen annon jälkeen infuusioletku on suositeltavaa huuhdella 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuksella, jotta potilas saa varmasti koko annoksen.

Infuusio on annettava vähintään 30 minuutin kestoisena.

Vastasyntyneillä laskimoon annettavat annokset on annettava 60 minuutin kestoisina infuusioina kernikteruksen riskin minimoimiseksi (ks. lisätiedot kohdassa 4.2).

Liuoksen väri käyttökuntaan saattamisen / laimentamisen jälkeen on hieman kellertävä tai ruskehtavan keltainen, säilytsajan, pitoisuuden ja käytetyn liuottimen mukaan, mutta tällä ei ole vaikutusta lääkevalmisteen tehoon.

Käyttökuntaan saatut/laimennetut liuokset on tarkastettava silmämäärisesti ennen käyttöä. Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta eikä siinä näy hiukkasia. Käyttökuntaan saatettu valmiste on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämätön liuos on hävitettävä.

Tämä lääkevalmiste saattaa olla vaarallinen ympäristölle (ks. kohta 5.3).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jätte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

AS KALCEKS

Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Latvia

Puh: +371 67083320

Sähköposti: kalceks@kalceks.lv

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

Ceftriaxone Kalceks 1 g: MTnr 39774

Ceftriaxone Kalceks 2 g: MTnr 39775

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 22.12.2022

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

22.01.2024

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Varje injektionsflaska innehåller 1 g ceftriaxon (som ceftriaxonatrium).
Natriuminnehåll per injektionsflaska: 83 mg (motsvarande 3,6 mmol).

Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Varje injektionsflaska innehåller 2 g ceftriaxon (som ceftriaxonatrium).
Natriuminnehåll per injektionsflaska: 166 mg (motsvarande 7,2 mmol).

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.
Nästan vitt till gulaktigt pulver.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Ceftriaxone Kalceks är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn inklusive fullgångna nyfödda (från födseln):

- bakteriell meningit;
- samhällsförvärvid pneumoni;
- sjukhusförvärvid pneumoni;
- akut otitis media;
- intraabdominella infektioner;
- komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit);
- infektioner i ben och leder;
- komplicerade infektioner i ben och leder;
- gonorré;
- syfilis;
- bakteriell endokardit.

Ceftriaxone Kalceks kan användas:

- för behandling av akuta exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom hos vuxna;
- för behandling av disseminerad borrelios (tidig (stadium II) och sen (stadium III)) hos vuxna och barn inklusive nyfödda från 15 dagars ålder;
- för preoperativ profylax mot infektion i område för kirurgiskt ingrepp;
- vid behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion;
- vid behandling av patienter med bakteriemi som förekommer i samband med, eller är misstänkt vara associerad med, någon av de infektioner som anges ovan.

Ceftriaxone Kalceks ska administreras tillsammans med andra antibakteriella läkemedel när tänkbara orsakande bakterier inte omfattas av dess spektrum (se avsnitt 4.4).

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella läkemedel.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Doseringen styrs av infektionens svårighetsgrad, lokalisering och typ, den orsakande mikroorganismens känslighet samt patientens ålder och lever- och njurfunktion.

Doserna som rekommenderas i tabellerna nedan är de doser som generellt rekommenderas vid dessa indikationer. I särskilt svåra fall bör doser i den övre delen av det rekommenderade intervallet övervägas.

Vuxna och barn över 12 år ($\geq 50\text{ kg}$)

Ceftriaxon-dos*	Behandlingsfrekvens**	Indikationer
1-2 g	En gång dagligen	Samhällsförvärvad pneumoni
		Akuta exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom
		Intraabdominella infektioner
		Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)
2 g	En gång dagligen	Sjukhusförvärvad pneumoni
		Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
		Infektioner i ben och leder
2-4 g	En gång dagligen	Behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion
		Bakteriell endokardit
		Bakteriell meningit

* Vid fastställd bakteriemi bör doser i den övre delen av det rekommenderade intervallet övervägas.

** Administrering två gånger dagligen (var 12:e timme) kan övervägas då doser över 2 g dagligen ges.

Indikationer för vuxna och barn över 12 års ålder ($\geq 50\text{ kg}$) som kräver specifika doseringsscheman:

- Akut otitis media
En enstaka intramuskulär dos av ceftriaxon 1-2 g kan ges.
Begränsade data tyder på att i de fall patienten är svårt sjuk eller tidigare behandling har misslyckats, kan ceftriaxon vara effektivt när det ges som en intramuskulär dos på 1-2 g dagligen under 3 dagar.
- Preoperativ profylax mot infektion i område för kirurgiskt ingrepp
2 g som en enstaka preoperativ dos.
- Gonorré
500 mg som en enstaka intramuskulär dos.
- Syfilis
De doser som generellt rekommenderas är 500 mg-1 g en gång dagligen utökad till 2 g en gång dagligen för neurosyfilis under 10-14 dagar. Doseringsrekommendationerna vid syfilis, inklusive neurosyfilis, är baserade på begränsade data. Hänsyn bör tas till nationella och lokala riktlinjer.

- Disseminerad borrelios (tidig [stadium II] och sen [stadium III])
2 g en gång dagligen under 14-21 dagar. De rekommenderade behandlingstiderna varierar och hänsyn bör tas till nationella och lokala riktlinjer.

Pediatrisk population

Nyfödda, spädbarn och barn 15 dagar till 12 års ålder (< 50 kg)

För barn med en kroppsvikt på 50 kg eller mer ska vuxendoserna ges.

Ceftriaxon-dos*	Behandlingsfre kvens**	Indikationer
50-80 mg/kg	En gång dagligen	Intraabdominella infektioner
		Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)
		Samhällsförvärvad pneumoni
		Sjukhusförvärvad pneumoni
50-100 mg/kg (max 4 g)	En gång dagligen	Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
		Infektioner i ben och leder
		Behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion
80-100 mg/kg (max 4 g)	En gång dagligen	Bakteriell meningit
100 mg/kg (max 4 g)	En gång dagligen	Bakteriell endokardit

* Vid fastställd bakteriemi bör doser i den övre delen av det rekommenderade intervallet övervägas.

** Administrering två gånger dagligen (var 12:e timme) kan övervägas då doser över 2 g dagligen ges.

Indikationer för nyfödda, spädbarn och barn 15 dagar till 12 års ålder (< 50 kg) som kräver specifika doseringsscheman:

- Akut otitis media
För initial behandling av akut otitis media kan en enstaka intramuskulär dos av ceftriaxon 50 mg/kg ges. Begränsade data tyder på att i de fall barnet är svårt sjukt eller initial behandling har misslyckats, kan ceftriaxon vara effektivt när det ges som en intramuskulär dos på 50 mg/kg dagligen under 3 dagar.
- Preoperativ profylax mot infektion i område för kirurgiskt ingrepp
50-80 mg/kg som en enstaka preoperativ dos.
- Syfilis
De doser som generellt rekommenderas är 75-100 mg/kg (max 4 g) en gång dagligen under 10-14 dagar. Doseringsrekommendationerna vid syfilis, inklusive neurosyfilis, är baserade på mycket begränsade data. Hänsyn bör tas till nationella och lokala riktlinjer.
- Disseminerad borrelios (tidig [stadium II] och sen [stadium III])
50-80 mg/kg en gång dagligen under 14-21 dagar. De rekommenderade behandlingstiderna varierar och hänsyn bör tas till nationella och lokala riktlinjer.

Nyfödda 0-14 dagar

Ceftriaxon är kontraindicerat hos för tidigt födda upp till en postmenstruell ålder av 41 veckor (gestationsålder + kronologisk ålder).

Ceftriaxon-dos*	Behandlingsfrekvens	Indikationer
20-50 mg/kg	En gång dagligen	Intraabdominella infektioner
		Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
		Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)
		Samhällsförvärvad pneumoni
		Sjukhusförvärvad pneumoni
		Infektioner i ben och leder
		Behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion
50 mg/kg	En gång dagligen	Bakteriell meningit
		Bakteriell endokardit

* Vid fastställd bakteriemi bör doser i den övre delen av det rekommenderade intervallet övervägas.
En maximal daglig dos på 50 mg/kg bör inte överskridas

Indikationer för nyfödda 0-14 dagar som kräver specifikt doseringsschema.

- Akut otitis media
För initial behandling av akut otitis media kan en enstaka intramuskulär dos av ceftriaxon 50 mg/kg ges.
- Preoperativ profylax mot infektion i område för kirurgiskt ingrepp 20-50 mg/kg som en enstaka preoperativ dos.
- Syfilis
Den dos som generellt rekommenderas är 50 mg/kg en gång dagligen under 10-14 dagar. Doseringsrekommendationerna vid syfilis, inklusive neurosyfilis, är baserade på mycket begränsade data. Hänsyn bör tas till nationella och lokala riktlinjer.

Behandlingstid

Behandlingstiden varierar beroende på sjukdomsförloppet. Som med antibiotikabehandling i allmänhet, bör administrering av ceftriaxon fortsätta under 48-72 timmar efter att patienten blivit feberfri, eller efter att bevis på att inga bakterier kvarstår har erhållits.

Äldre

Den rekommenderade doseringen för vuxna kräver ingen modifiering hos äldre patienter, förutsatt att njur- och leverfunktion är tillfredsställande.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Tillgängliga data indikerar inget behov av dosjustering vid mild till måttligt nedsatt leverfunktion, förutsatt att njurfunktionen inte är nedsatt.

Det finns inga studiedata på patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Det finns inget behov av att minska dosen av ceftriaxon hos patienter med nedsatt njurfunktion, förutsatt att leverfunktionen inte är nedsatt. Enbart i fall av preterminal njursvikt (kreatininclearance < 10 ml/min) får ceftriaxon dosen inte överstiga 2 g dagligen. Hos patienter som genomgår dialys krävs ingen ytterligare extra dosering efter dialysen. Ceftriaxon avlägsnas inte genom peritoneal- eller hemodialys. Noggrann klinisk monitorering för säkerhet och effekt rekommenderas.

Patienter med svårt nedsatt lever- och njurfunktion

Hos patienter med både svårt nedsatt njur- och leverfunktion rekommenderas noggrann klinisk övervakning av säkerhet och effekt.

Administreringssätt

Intravenös, intramuskulär användning.

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning kan användas för i.m. injektion, långsam i.v. injektion och i.v. infusion.

Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning kan användas för i.m. injektion och i.v. infusion.

Intramuskulär användning

Ceftriaxone Kalceks kan administreras som en djup intramuskulär injektion. Intramuskulära injektioner ska injiceras i en relativt stor muskel och bör inte överskrida 1 g per injektionsställe. Doser större än 1 g bör delas upp och injiceras på mer än en plats (se avsnitt 6.6). Doser högre än 2 g ska ges intravenöst. Intramuskulär administrering ska övervägas då intravenös administrering inte är möjlig eller mindre lämplig för patienten.

Då lidokain används som lösningsmedel ska den resulterande lösningen aldrig administreras intravenöst (se avsnitt 4.3). Informationen som finns i produktresumén för lidokain bör tas i beaktande.

Intravenös användning

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning kan administreras som en intravenös infusion under minst 30 minuter (att föredra), eller som en långsam intravenös injektion under 5 minuter. Intravenös intermittent injektion ska ges under 5 minuter, företrädesvis i större vene.

Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning kan administreras som en intravenös infusion under minst 30 minuter.

Intravenösa doser på 50 mg/kg eller mer hos spädbarn och barn upp till 12 års ålder ska ges som infusion. Hos nyfödda ska intravenösa doser ges under 60 minuter för att minska risken för bilirubinencefalopati (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Ceftriaxon är kontraindicerat hos nyfödda (≤ 28 dagar) om de kräver (eller förväntas kräva) behandling med kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inklusive kontinuerliga kalciuminnehållande infusionser såsom parenteral nutrition, på grund av risken för utfällning av ett ceftriaxonkalcium (se avsnitt 4.3).

Spädningsmedel som innehåller kalcium (t.ex. Ringerlösning eller Hartmanns lösning) ska inte användas för att rekonstituera injektionsflaskor med ceftriaxon eller för att ytterligare späda ut en rekonstituerad injektionsflaska för intravenös administrering eftersom en fällning kan bildas. Utfällning av ceftriaxon-kalcium kan också uppstå när ceftriaxon blandas med lösningar som innehåller kalcium och ges i samma infusionsinfart. Lösningar innehållande ceftriaxon och kalcium får därför inte blandas eller administreras samtidigt (se avsnitt 4.3, 4.4 och 6.2).

För preoperativ profylax av infektioner på operationsstället bör ceftriaxon administreras 30-90 minuter före operation.

Färgen på lösningen efter beredning/spädning är svagt gulaktig till brungul, beroende på förvaringstid, koncentration och använda lösningsmedel, men detta påverkar inte läkemedlets effekt.

Anvisningar om beredning/spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ceftriaxon, mot någon annan céfalosporin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Anamnes med allvarlig överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion) mot någon annan typ av antibakteriella betalaktammedel (penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer).

Ceftriaxon är kontraindicerat hos:

- för tidigt födda upp till en postmenstruell ålder av 41 veckor (gestationsålder + kronologisk ålder)*;
- fullgångna nyfödda (upp till 28 dagars ålder):
 - med hyperbilirubinemni, guldot, eller som är hypoalbuminemiska eller acidotiska eftersom dessa är tillstånd där det är troligt att bilirubinbindningen är försämrad*;
 - om de kräver (eller förväntas kräva) intravenös kalciumbehandling eller kalciuminnehållande infusioner på grund av risken för utfällning av ett ceftriaxonkalciumsalt (se avsnitt 4.4, 4.8 och 6.2).

* *In vitro*-studier har visat att ceftriaxon kan tränga undan bilirubin från dess bindningsställe till serumalbumin vilket leder till en möjlig risk för bilirubincefalopati hos dessa patienter.

Kontraindikationer med lidokain måste uteslutas innan intramuskulär injektion av ceftriaxon ges när lidokain används som lösningsmedel (se avsnitt 4.4). Se produktresumén för lidokain, speciellt avseende kontraindikationer.

Ceftriaxonlösningar som innehåller lidokain ska aldrig administreras intravenöst.

4.4 Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Som med alla betalaktamantibiotika, har allvarliga och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner rapporterats (se avsnitt 4.8). Vid fall av överkänslighetsreaktioner ska behandling med ceftriaxon omedelbart sättas ut och lämpliga nödåtgärder måste initieras. Innan behandling inleds ska det fastställas huruvida patienten har allvarliga överkänslighetsreaktioner mot ceftriaxon i anamnesen, mot andra cefalosporiner eller mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum. Försiktighet ska iakttas om ceftriaxon ges till patienter som tidigare haft icke-allvarliga överkänslighetsreaktioner mot andra betalaktamer.

Allvarliga hudbiverkningar (Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom/toxisk epidermal nekrolys och läkemedelsreaktion med eosinofi och systemiska symtom (DRESS)), vilka kan vara livshotande eller dödliga har rapporterats i samband med behandling med ceftriaxon; frekvensen av dessa biverkningar är dock inte känd (se avsnitt 4.8).

Jarisch-Herxheimer-reaktion (JHR)

Vissa patienter med spiroket-infektioner kan uppleva en Jarisch-Herxheimer-reaktion (JHR) kort efter att behandlingen med ceftriaxon har påbörjats. JHR är vanligtvis ett övergående tillstånd eller kan hanteras med symptomatisk behandling. Den antibiotiska behandlingen ska inte avslutas om en sådan reaktion uppstår.

Interaktioner med kalciuminnehållande produkter

Fall av dödliga reaktioner med utfällningar av kalciumceftriaxon i lungor och njurar hos prematurer och fullgångna nyfödda före 1 månads ålder har beskrivits. Åtminstone en av dem hade fått ceftriaxon och kalcium vid olika tidpunkter och via olika intravenösa infusionsinfarter. I tillgängliga vetenskapliga data finns det inga rapporter om bekräftade intravaskulära utfällningar hos patienter, annat än nyfödda, som behandlats med ceftriaxon och kalciuminnehållande lösningar eller några andra kalciuminnehållande produkter. *In vitro*-studier har visat att nyfödda har en ökad risk för utfällningar av ceftriaxonkalcium jämfört med andra åldersgrupper.

Hos patienter oavsett ålder ska ceftriaxon inte blandas eller administreras samtidigt med någon kalciuminnehållande intravenös lösning, inte ens via olika infusionsinfarter eller vid olika administrationsställen. Till patienter äldre än 28 dagar kan dock ceftriaxon och kalciuminnehållande lösningar ges efter varandra om olika infusionsinfarter och olika infusionsställen används eller om infusionsinfarterna byts ut eller spolats noggrant med fysiologisk koksaltlösning mellan infusionerna

för att undvika utfällning. Till patienter som får näring tillförd via kontinuerlig infusion av kalciuminnehållande total parenteral nutrition (TPN) bör annan antibiotikabehandling övervägas som inte medför risk för utfällning. Om användning av ceftriaxon anses nödvändig hos patienter som kräver kontinuerlig nutrition kan TPN och ceftriaxon ges samtidigt men via olika infusionsinfarter på olika ställen. Alternativt kan infusionen av TPN avbrytas under tiden ceftriaxon ges, och spolning av infusionsinfarterna utföras mellan lösningarna (se avsnitt 4.3, 4.8, 5.2 och 6.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av ceftriaxon hos nyfödda, spädbarn och barn har faststälts för de doser som beskrivs under Dosering och administreringssätt (se avsnitt 4.2). Studier har visat att ceftriaxon, liksom vissa andra cefalosporiner, kan tränga bort bilirubin från serumalbumin.

Ceftriaxon är kontraindicerat hos prematurer och fullgångna nyfödda som löper risk att utveckla bilirubinencefalopati (se avsnitt 4.3).

Immunmedierad hemolytisk anemi

En immunmedierad hemolytisk anemi har observerats hos patienter som fått cefalosporinantibiotika inklusive ceftriaxon (se avsnitt 4.8). Allvarliga fall av hemolytisk anemi, inklusive dödsfall, har rapporterats under ceftriaxonbehandling hos både vuxna och barn.

Om en patient utvecklar anemi under behandling med ceftriaxon bör diagnosen cefalosporinassocierad anemi övervägas och ceftriaxon sättas ut till dess att orsaken är fastställd.

Långtidsbehandling

Under långvarig behandling bör en komplett blodstatus genomföras regelbundet.

Kolit/överväxt av icke mottagliga mikroorganismer

Antibiotikarelaterad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats för nästan alla antibiotika, inklusive ceftriaxon, och kan variera i allvarlighetsgrad från mild till livshotande. Det är därför viktigt att överväga den diagnosen hos patienter med diarré under eller efter administrering av ceftriaxon (se avsnitt 4.8). Avbrytande av behandling med ceftriaxon och administrering av specifik behandling mot *Clostridiooides difficile* bör övervägas. Läkemedel som hämmar peristaltiken ska inte ges.

Superinfektioner med icke mottagliga mikroorganismer kan förekomma, liksom för andra antibiotika.

Encefalopati

Encefalopati har rapporterats vid användning av ceftriaxon (se avsnitt 4.8), särskilt hos äldre patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2) eller sjukdomar i centrala nervsystemet. Vid misstanke om ceftriaxonassocierad encefalopati (t.ex. sänkt medvetangrad, förändrad mental status, myoklonus, kramper) ska utsättning av ceftriaxon övervägas.

Allvarlig njur- och leverinsufficiens

Vid allvarlig njur- och leversvikt rekommenderas noggrann klinisk monitorering av säkerhet och effekt (se avsnitt 4.2).

Påverkan på serologiska test

Påverkan på Coombs-test kan inträffa, då ceftriaxon kan resultera i falskt positiva testresultat.

Ceftriaxon kan även resultera i falska positiva test för galaktosemi (se avsnitt 4.8).

Icke-enzymatiska metoder för bestämning av glukos i urinen ge falskt positiva resultat. Glukosnivån i urinen under behandling med ceftriaxon bör bestämmas enzymatiskt (se avsnitt 4.8).

Ceftriaxon kan påverka vissa blodglukosövervakningssystem och då ge falskt låga blodglukosvärdet. Se instruktioner för användning för respektive system. Alternativa testmetoder ska användas vid behov.

Antibakteriellt spektrum

Ceftriaxon har ett begränsat spektrum av antibakteriell aktivitet och är eventuellt inte lämpligt som monoterapi för behandling av vissa typer av infektioner om inte patogenen redan har bekräftats (se avsnitt 4.2). Vid polymikrobiella infektioner, där misstänkta patogener inkluderar organismer resistenta mot ceftriaxon, bör administrering av ytterligare ett antibiotikum övervägas.

Användning av lidokain

Om lidokain används som lösningsmedel ska ceftriaxonlösningen endast användas för intramuskulär injektion. Kontraindikationer med lidokain, varningar och annan relevant information som anges i produktresumén för lidokain måste beaktas innan användning (se användning 4.3). Lidokainlösningen ska aldrig administreras intravenöst.

Biliär litiasis

Då skuggor observeras på ultraljud ska möjligheten av utfällningar av kalcium-ceftriaxon tas i beaktande. Skuggor, som har förväxlats med gallstenar, har upptäckts på ultraljud av gallblåsan, vanligtvis efter ceftriaxon doser på 1 g per dag eller mer. Försiktighet ska framför allt iakttas i den pediatriska populationen. Dessa utfällningar försätts in i gallblåsan efter avbruten ceftriaxonbehandling. Dessa resultat förknippas sällan med symptom. I symptomatiska fall rekommenderas traditionell icke-kirurgisk behandling och utsättande av behandling med ceftriaxon bör övervägas av läkaren baserat på specifik risk-/nyttabedömning (se avsnitt 4.8).

Gallstas

Fall av pankreatit, eventuellt med gallvägsobstruktionsetiologi, har rapporterats hos patienter som behandlats med ceftriaxon (se avsnitt 4.8). De flesta patienterna hade riskfaktorer för gallstas och inslämning, t.ex. föregående större behandling, svår sjukdom och total parenteral nutrition. En utlösande eller bidragande roll till ceftriaxonrelaterade gallutfällningar kan inte uteslutas.

Renal litiasis

Fall av renal litiasis har rapporterats, vilken är reversibel efter avbruten behandling med ceftriaxon (se avsnitt 4.8). I symptomatiska fall ska ultraljudsundersökning utföras. Beslut om användning hos patienter med tidigare renal litiasis eller med hyperkalciuri ska tas av läkaren baserat på specifik risk-/nyttabedömning.

Natrium

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller 83 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 4,15 % av WHO:s högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).

Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller 166 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 8,3 % av WHO:s högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Använd inte kalciuminnehållande lösningar, såsom Ringerlösning eller Hartmanns lösning, för att lösa upp ceftriaxonpulver i injektionsflaskor eller för att ytterligare späda ett rekonstituerat innehåll för intravenös administrering, eftersom utfällning kan bildas. Utfällning av ceftriaxon-kalcium kan också uppstå när ceftriaxon blandas med lösningar som innehåller kalcium och ges i samma infusionsinfart. Ceftriaxon får inte administreras samtidigt med kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inklusive kontinuerliga infusioner som innehåller kalcium såsom parenteral nutrition via en trevägsinfart. Till patienter som inte är nyfödda kan ceftriaxon och kalciuminnehållande lösningar dock ges efter varandra, om infusionsinfarterna sköljs noggrant mellan infusionerna med en kompatibel vätska. *In vitro*-studier på plasma från vuxna och navelsträngsblod från nyfödda har visat att nyfödda barn har en ökad risk för utfällning av ceftriaxon-kalcium (se avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 och 6.2).

Samtidig användning av orala antikoagulantia kan förstärka anti-vitamin K-effekten och risken för blödning. Det rekommenderas att INR, International Normalised Ratio, övervakas regelbundet och att

doseringen av anti-vitamin K läkemedel anpassas därefter, både under och efter behandling med ceftriaxon (se avsnitt 4.8).

Det finns motstridiga uppgifter om en potentiell ökning av njurtoxiciteten av aminoglykosider vid användning med cefalosporiner. Den rekommenderade uppföljningen av aminoglykosidnivåer (och njurfunktion) i klinisk praxis ska noggrant följas i sådana fall.

I en *in vitro*-studie har antagonistiska effekter observerats vid kombinationen av kloramfenikol och ceftriaxon. Den kliniska relevansen av detta fynd är okänd.

Det finns inga rapporter om interaktion mellan ceftriaxon och orala kalciuminnehållande produkter eller mellan intramuskulärt administrerat ceftriaxon och kalciuminnehållande produkter (intravenösa eller orala).

Hos patienter som behandlas med ceftriaxon kan Coombs-test leda till falskt positiva resultat.

Ceftriaxon kan, i likhet med andra antibiotikum, resultera i falskt positiva test för galaktosemi.

Likaså kan icke-enzymatiska metoder för bestämning av glukos i urinen ge falskt positivt resultat. Av denna anledning bör glukosnivån i urinen under behandling med ceftriaxon bestämmas enzymatiskt.

Ingen försämring av njurfunktion har observerats efter samtidig administrering av stora doser ceftriaxon och potenta diuretika (t.ex. furosemid).

Samtidig administration av probenecid reducerar inte eliminationen av ceftriaxon.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ceftriaxon passerar placentabariären. Det finns begränsade data från användningen av ceftriaxon hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inte direkt eller indirekt skadliga effekter vad gäller embryonal-/fosterutveckling, perinatal eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Ceftriaxon ska enbart användas under graviditet och särskilt under den första trimestern om nyttan överväger risken.

Amning

Ceftriaxon utsöndras i bröstmjölken i låga koncentrationer men vid terapeutiska doser av ceftriaxon förväntas inga effekter på ammande spädbarn. Risk för diarré och svampinfektion i slemhinnor kan dock inte uteslutas. Möjligheten för sensitivisering bör tas i beaktande. Moderns behov av behandling och fördelarna med amning måste beaktas när beslut fattas om amning ska avbrytas eller om behandling med ceftriaxon ska avbrytas/avstås ifrån.

Fertilitet

Reproduktionstoxikologiska studier på djur har inte visat några tecken på negativa effekter på manlig eller kvinnlig fertilitet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Under behandling med ceftriaxon kan biverkningar förekomma (t.ex. yrsel), vilket kan påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner (se avsnitt 4.8). Patienter ska vara försiktiga vid bilkörning eller hantering av maskiner.

4.8 Biverkningar

De mest frekvent rapporterade biverkningarna för ceftriaxon är eosinofili, leukopeni, trombocytopeni, diarré, utslag och förhöjda leverenzymer.

Data för att fastställa frekvensen av biverkningar för ceftriaxon är hämtade från kliniska studier.

Frekvenserna i tabellen nedan definieras enligt MedDRA enligt följande: vanliga ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$), sällsynta ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem-klass	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Ingen känd frekvens ^a
Infektioner och infestationer		Genital svampinfektion	Pseudomembranös kolit ^b	Superinfektion ^b
Blodet och lymfssystemet	Eosinofili Leukopeni Trombocytopeni	Granulocytopeni Anemi Koagulopati		Hemolytisk anemi ^b Agranulocytos
Immunsystems-sjukdomar				Anafylaktisk chock Anafylaktisk reaktion Anafylaktoid reaktion Överkänslighet ^b Jarisch-Herxheimer-reaktion ^b
Centrala och perifera nervssystemet		Huvudvärk Yrsel	Encefalopati	Kramp
Sjukdomar i öron och balansorgan				Svindel
Respiratoriska, torakala och mediastinala sjukdomar			Bronkospasm	
Magtarmkanalen	Diarré ^b Lös avföring	Illamående Kräkning		Pankreatit ^b Stomatit Glossit
Lever och gallvägar	Förhöjda leverenzymor			Utfällningar i gallblåsan ^b Kärnikterus Leverinflammation ^c Kolestatisk hepatitis ^{b,c}

Sjukdomar i hud och subkutan vävnad	Utslag	Klåda	Urtikaria	Stevens-Johnson-syndrom ^b Toxisk epidermal nekrolysy ^b Erytema multiforme Akut generaliserad exantematös pustulos Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) ^b
Njur- och och urinvägssjukdomar			Hematuri Glukosuri	Oliguri Utfällning i njurarna (reversibel)
Allmänna sjukdomar och tillstånd på administreringställe		Flebit Smärta vid injektionsstället Pyrexia	Ödem Frossa	
Utredningar		Förhöjt blodkreatinin		Falskt positivt Coombs-test ^b Falskt positivt galaktosesemi-test ^b Falskt positivt resultat för icke-enzymatiska metoder för glukosbestämning ^b

^a Baserat på rapporter efter marknadsintroduktion. Då dessa biverkningar rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte möjligt att med säkerhet uppskatta deras frekvens och de kategoriseras därför som att sakna känd frekvens.

^b Se avsnitt 4.4.

^c Vanligtvis reversibel vid utsättning av ceftriaxon

Beskrivning av valda biverkningar

Infektioner och infestationer

Rapporter om diarré efter användning av ceftriaxon kan vara associerade med *Clostridioides difficile*. Lämplig vätske- och elektrolytbehandling bör sättas in (se avsnitt 4.4).

Ceftriaxon-kalciumsalt-utfällningar

Sällsynta, allvarliga och i vissa fall dödliga biverkningar har rapporterats hos prematura och fullgångna nyfödda (< 28 dagars ålder) som behandlats med ceftriaxon och kalcium intravenöst. Utfällningar av ceftriaxon-kalcium-salter har observerats i lungor och njurar efter döden. Den höga risken för utfällningar hos nyfödda beror på deras låga blodvolym och längre halveringstid för ceftriaxon jämfört med vuxna (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Fall av ceftriaxonutfällningar i urinvägarna har rapporterats, främst hos barn som behandlas med antingen höga dagliga doser (t.ex. ≥ 80 mg/kg/dag) eller totala doser som överstiger 10 gram och som

har andra riskfaktorer (t.ex. uttorkning eller sängliggande). Utfällningen kan vara symptomatisk eller asymptomatisk, och kan leda till uretärobstruktion och postrenal akut njursvikt, men är vanligtvis reversibel efter utsättande av ceftriaxon (se avsnitt 4.4).

Utfällning av ceftriaxon-kalciumsalt i gallblåsan har observerats, främst hos patienter som behandlats med doser högre än den rekommenderade standarddosen. Hos barn har prospektiva studier visat en varierande förekomst av utfällning vid intravenös administrering, i vissa studier över 30 %. Incidensen tycks vara lägre med långsam infusion (20-30 minuter). Denna effekt är vanligtvis asymptomatisk, men i sällsynta fall har utfällningen följs av kliniska symptom, såsom smärta, illamående och kräkningar. Symptomatisk behandling rekommenderas i dessa fall. Utfällning är vanligtvis reversibel efter utsättande av ceftriaxon (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

I fall av överdosering kan illamående, kräkningar och diarré uppstå. Ceftriaxonkoncentrationer kan inte minskas genom hemodialys eller peritoneal dialys. Det finns ingen specifik antidot. Behandlingen av överdosering är symptomatisk.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, tredje generationens

cefalosporiner,

ATC-kod: J01DD04

Verkningsmekanism

Ceftriaxon hämmar proteinsyntesen i uppbyggnaden av bakteriens cellvägg genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP). Detta resulterar i en störd cellväggsuppbryggnad (peptidoglykan), vilket leder till bakteriell celllys och celldöd.

Resistens

Bakteriell resistens mot ceftriaxon kan bero på en eller flera av följande mekanismer:

- hydrolyt av betalaktamaser, inklusive bredspektrumbetalaktamaser, karbapenamaser och Amp C-enzym som kan vara inducerade eller stabilt hämmade hos vissa gramnegativa bakteriearter
- minskad affinitet för ceftriaxon hos penicillinbindande proteiner
- impermeabilitet i yttermembranet hos gramnegativa organismer
- effluxpumpar hos bakterier.

Brytpunkter för känslighetstestning

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) har fastställt brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC). Dessa listas på European Medicines Agencys (EMA)

webbplats: [https://www.ema.europa.eu/en/evaluation-medicinal-products-indicated-treatment-bacterial-infections-scientific-guideline#minimum-inhibitory-concentration-\(mic\)-breakpoints-section](https://www.ema.europa.eu/en/evaluation-medicinal-products-indicated-treatment-bacterial-infections-scientific-guideline#minimum-inhibitory-concentration-(mic)-breakpoints-section)

Klinisk effekt mot specifika patogener

Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter och lokal information om resistens är önskvärd, framför allt vid behandling av svåra infektioner. Vid behov ska expertråd sökas då den lokala resistensprevalensen är sådan att nyttan av ceftriaxon vid åtminstone vissa typer av infektioner är tveksam.

Vanligtvis känsliga arter

Grampositiva aerober

Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga)^f

Staphylococci koagulasnegativa (meticillinkänsliga)^f

Streptococcus pyogenes (grupp A)

Streptococcus agalactiae (grupp B)

Streptococcus pneumoniae

Streptococci i viridans-gruppen

Gramnegativa aerober

Borrelia burgdorferi

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoea

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Treponema pallidum

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Grampositiva aerober

Staphylococcus epidermidis⁺

Staphylococcus haemolyticus⁺

Staphylococcus hominis⁺

Gramnegativa aerober

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli[%]

Klebsiella pneumoniae[%]

Klebsiella oxytoca[%]

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Serratia marcescens

Anaerober

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Clostridium perfringens

Naturligt resistenta organismer

Grampositiva aerober

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Gramnegativa aerober

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerober

Clostridioides difficile

Övriga

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Ureaplasma urealyticum

^f Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot ceftriaxon.

⁺ Resistens > 50 % i åtminstone en region

[%] Stammar som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) är alltid resistenta

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Intramuskulär användning

Efter intramuskulär injektion är maximal plasmakoncentration ungefär hälften av den som observeras efter intravenös administrering av motsvarande dos. Maximal plasmakoncentration efter en intramuskulär engångsdos på 1 g ceftriaxon är cirka 81 mg/l och uppnås 2-3 timmar efter administrering.

Arean under plasmakoncentration-tid-kurvan efter intramuskulär administrering är likvärdig med den efter intravenös administrering av en motsvarande dos.

Intravenös användning

Efter intravenös bolusadministration av ceftriaxon 500 mg och 1 g är den maximala plasmakoncentrationen av ceftriaxon ungefär 120 mg/l respektive 200 mg/l. Efter intravenös infusion av ceftriaxon 500 mg, 1 g och 2 g är plasmakoncentrationen av ceftriaxon cirka 80, 150 respektive 250 mg/l.

Distribution

Distributionsvolymen för ceftriaxon är 7-12 liter. Koncentrationer väl över minimala inhibitoriska koncentrationer för de mest relevanta patogenerna är detekterbara i vävnader inklusive lunga, hjärta, gallvägar/lever, tonsiller, mellanörat, nässlekhinnan, ben och i cerebrospinal-, pleura-, prostata- och synovialvätska. En 8-15 % ökning av den maximala plasmakoncentrationen (C_{max}) ses vid upprepad administrering; steady state nås i de flesta fall inom 48-72 timmar beroende på administreringsväg.

Penetration av särskilda vävnader

Ceftriaxon penetrerar meningerna. Penetrationen är som störst då meningerna är inflammerade. Maximal plasmakoncentration i cerebrospinalvätska (CSF) hos patienter med bakteriell meningit rapporteras vara upp till 25 % av plasmakoncentrationerna jämfört med 2 % hos patienter utan inflammerade meninger. Maximal plasmakoncentration i CSF uppnås ungefär 4-6 timmar efter intravenös injektion. Ceftriaxon passerar placentabariären och utsöndras i bröstmjölk i låga koncentrationer (se avsnitt 4.6).

Proteinbindning

Ceftriaxon är reversibelt bundet till albumin. Plasmaproteinbindningsgraden är ungefär 95 % vid plasmakoncentrationer under 100 mg/l. Bindningen är mättnadsbar och den bundna delen minskar med stigande koncentration (upp till 85 % vid en plasmakoncentration av 300 mg/l).

Metabolism

Ceftriaxon metaboliseras inte systemiskt, utan omvandlas till inaktiva metaboliter av tarmfloran.

Eliminering

Total plasmaclearance (bundet och obundet ceftriaxon) är 10-22 ml/min. Renalt clearance är 5-12 ml/min. 50-60 % ceftriaxon utsöndras i oförändrad form i urinen, primärt genom glomerulär filtration, medan 40-50 % utsöndras i oförändrad form via gallan. Halveringstiden för totalt ceftriaxon hos vuxna är ungefär 8 timmar.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion, även de med svårt nedsatt njurfunktion, är farmakokinetiken för ceftriaxon enbart minimalt förändrad med en förlängd halveringstid (mindre än tvåfaldigt).

Den relativt måttliga ökningen av halveringstiden vid nedsatt njurfunktion förklaras av en kompensatorisk ökning av icke-renalt clearance, till följd av en minskad proteinbindning och motsvarande ökning av icke-renal total plasmaclearance av ceftriaxon.

Halveringstiden hos patienter med nedsatt leverfunktion är inte förlängd på grund av en kompensatorisk ökning av renalt clearance. Även detta beror på en ökning av den obundna delen ceftriaxon i plasma, vilket bidrar till den observerade paradoxala ökningen av totalt läkemedelsclearance, med en ökning av distributionsvolym parallellt med totalclearance.

Äldre

Hos äldre personer över 75 år är den genomsnittliga halveringstiden vanligtvis två till tre gånger längre än hos unga vuxna.

Pediatrisk population

Halveringstiden för ceftriaxon är förlängd hos nyfödda. Från födseln till 14 dagars ålder, kan nivåerna av ceftriaxon öka ytterligare på grund av faktorer så som minskad glomerulär filtration och förändrad proteinbindning. Hos barn är halveringstiden kortare än hos nyfödda och vuxna.

Total plasmaclearance och distributionsvolym av ceftriaxon är större hos nyfödda, spädbarn och barn än hos vuxna.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken för ceftriaxon är icke-linjär och alla grundläggande farmakokinetiska parametrar, förutom halveringstiden, är dosberoende om det baseras på totala läkemedelskoncentrationer, och ökar mindre än proportionerligt med dosen. Icke-linjäriteten beror på en mättad proteinbindning och observeras därför enbart för total plasmaceftrixon men inte för fritt (obundet) ceftriaxon.

Farmakokinetisk/farmakodynamiskt förhållande

I likhet med andra betalaktamer, uppvisar det farmakokinetiska-farmakodynamiska indexet att den bästa korrelationen med *in vivo*-effekt är andelen av doseringsintervallet där den obundna koncentrationen förblir över ceftriaxons minsta inhibitoriska koncentration (MIC) för individuella målarter (dvs. %T > MIC).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurstudier visar att höga doser av ceftriaxon kalciumsalt leder till bildning av konkrement och utfällningar i gallblåsan hos hundar och apor, vilket visade sig vara reversibelt. Djurstudier har inte visat några tecken på reproduktions- eller genotoxicitet. Karcinogenitetsstudier av ceftriaxon har inte utförts.

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningsstudier har visat att ceftriaxon har potential att vara giftigt för miljön (se avsnitt 6.6).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänen

Inga.

6.2 Inkompatibiliteter

Baserat på litteraturrapporter är ceftriaxon inte kompatibelt med amsakrin, vankomycin, flukonazol och aminoglykosider.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

I synnerhet ska inte spädningsvätskor innehållande kalcium, (t ex Ringer-lösning, Hartmanns-lösning) användas för att lösa upp ceftriaxonpulver i injektionsflaskor eller ytterligare späda ett rekonstituerat innehåll för intravenös administrering, eftersom utfällning kan bildas. Ceftriaxon får inte blandas eller ges samtidigt med lösningar som innehåller kalcium inklusive total parenteral nutrition (se avsnitt 4.2, 4.3, 4.4 och 4.8).

Om behandlingen består av en kombination av ett annat antibiotikum och ceftriaxon, administrera inte i samma spruta eller infusionslösning.

6.3 Hållbarhet

2 år.

Efter beredning med lidokainhydroklorid 10 mg/ml (1 %) lösning för intramuskulär injektion

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 6 timmar vid 25 °C.

Ur mikrobiologisk perspektiv bör produkten användas omedelbart om inte beredningsmetoden utesluter risk för mikrobiologisk kontamination. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar.

Efter beredning för intravenös injektion

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 48 timmar vid 2 till 8 °C och 12 timmar vid 25 °C.

Ur mikrobiologiskt perspektiv ska färdigblandad produkt användas direkt. Om den inte används direkt är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte blandningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Efter beredning för intravenös infusion

Den rekonstituerade lösningen ska spädas omedelbart efter beredning.

Efter spädning för intravenös infusion

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 48 timmar vid 2 till 8 °C och 12 timmar vid 25 °C.

Ur mikrobiologiskt perspektiv ska färdigblandad produkt användas direkt. Om den inte används direkt är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ceftriaxone Kalceks 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver fylls i en färglös injektionsflaska av glas försluten med grå propp av bromobutylgummi täckt med aluminiumlock och mörkblått lättöppnat plastlock.

Ceftriaxone Kalceks 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver fylls i en färglös injektionsflaska av glas försluten med grå propp av bromobutylgummi täckt med aluminiumlock och orange lättöppnat plastlock.

Injektionsflaskor är förpackade i ytterkartonger.

Förpackningsstorlekar: 1 eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk.

Se avsnitt 6.3 för förvaringsvillkor för de rekonstituerade och utspädda lösningarna.

Kompatibilitet med följande lösningar har visats:

- vatten för injektionsvätskor;
- lidokainhydrokloridlösning 10 mg/ml (1 %) (endast för intramuskulär injektion);
- natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %);
- glukoslösning 50 mg/ml (5 %);
- glukoslösning 100 mg/ml (10 %);
- natriumkloridlösning 4,5 mg/ml (0,45 %) och glukoslösning 25 mg/ml (2,5 %).

Intramuskulär injektion

För intramuskulär injektion, 1 g ceftriaxon löses i 3,5 ml 1 % lidokainhydrokloridlösning, eller 2 g ceftriaxon löses i 7 ml 1 % lidokainhydrokloridlösning.

Lösningen ska ges genom djup intramuskulär injektion. Doser större än 1 g bör delas upp och injiceras på mer än en plats (se avsnitt 4.2).

Ceftriaxone Kalceks ska inte blandas med andra läkemedel i samma spruta, förutom 1 % lidokainhydrokloridlösning (endast för intramuskulär injektion).

Då lidokain används som lösningsmedel ska den resulterande lösningen aldrig administreras intravenöst.

Intravenös injektion

För intravenös injektion löses 1 g ceftriaxon i 10 ml vatten för injektionsvätskor. Injektionen ges direkt i en ven eller via intravenös infusionsslang under 5 minuter.

Koncentrationen av ceftriaxon i den slutliga lösningen för intravenös injektion är 93 mg/ml:

Intravenös infusion

För intravenös infusion löses 1 g eller 2 g ceftriaxon och späds vid behov ytterligare med någon av de kompatibla kaliumfria lösningarna som anges ovan (förutom lidokainhydrokloridlösning eftersom lidokainlösningar aldrig ska administreras intravenöst).

Koncentrationen av ceftriaxon i den slutliga lösningen för intravenös infusion är 48 mg/ml:

Ceftriaxone Kalceks pulver	Volym spädningsmedel	Koncentration av ceftriaxon i den slutliga lösningen
1 g	20 ml	48 mg/ml
2 g	40 ml*	48 mg/ml

* Först rekonstitueras pulvret i 20 ml kompatibelt spädningsmedel. Den rekonstituerade lösningen späds ytterligare med 20 ml kompatibelt spädningsmedel till koncentrationen 48 mg/ml med lämplig administreringsanordning (t.ex. infusionspump, infusionspåse).

Det rekommenderas att den intravenösa infusionsslangen spolas efter varje administrering med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning för att säkerställa administrering av hela dosen.

Infusionen ska administreras under minst 30 minuter.

Hos nyfödda ska intravenösa doser ges under 60 minuter för att minimera risken för bilirubinencefalopati (se avsnitt 4.2 för ytterligare information).

Färgen på lösningen efter beredning/spädning är svagt gulaktig till brungul, beroende på förvaringstid, koncentration och använda lösningsmedel, men detta påverkar inte läkemedlets effekt.

Rekonstituerade/utspädda lösningar bör inspekteras visuellt innan de används. Endast klara lösningar fria från synliga partiklar ska användas. Den färdigberedda produkten är endast avsedd för engångsbruk och oanvänt lösning ska kasseras.

Detta läkemedel kan utgöra en risk för miljön (se avsnitt 5.3).

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AS KALCEKS

Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lettland

Tfn.: +371 67083320

E-post: kalceks@kalceks.lv

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ceftriaxone Kalceks 1 g: MTnr 39774

Ceftriaxone Kalceks 2 g: MTnr 39775

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22.12.2022

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

22.01.2024