

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg/ml (1,36 % w/v) Clear-Flex, peritoneaalidialyysineste
Physioneal 35 Glucose 22,7 mg/ml (2,27 % w/v) Clear-Flex, peritoneaalidialyysineste
Physioneal 35 Glucose 38,6 mg/ml (3,86 % w/v) Clear-Flex, peritoneaalidialyysineste

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Ennen sekoitusta

1000 ml elektrolyytiliuosta (suuri pussikammio "A") sisältää			
	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
Vaikuttavat aineet:			
Glukoosimonohydraatti	20,0 g	33,3 g	56,6 g
vastaten vedetöntä glukoosia	18,2 g	30,3 g	51,5 g
Kalsiumklorididihydraatti		0,343 g	
Magnesiumkloridiheksahydraatti		0,068 g	

1000 ml puskuriliuosta (pieni pussikammio "B") sisältää			
Vaikuttavat aineet:			
Natriumkloridi		21,12 g	
Natriumvetykarbonaatti		9,29 g	
Natrium-(S)-laktaattiliuos, mikä vastaa natrium-(S)-laktaattia		4,48 g	

Sekoituksen jälkeen

1000 ml liuosta sisältää			
	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
Vaikuttavat aineet:			
Glukoosimonohydraatti	15,0 g	25,0 g	42,5 g
vastaten vedetöntä glukoosia	13,6 g	22,7 g	38,6 g
Natriumkloridi		5,67 g	
Kalsiumklorididihydraatti		0,257 g	
Magnesiumkloridiheksahydraatti		0,051 g	
Natriumvetykarbonaatti		2,10 g	
Natrium-(S)-laktaattiliuos, mikä vastaa natrium-(S)-laktaattia		1,12 g	

1000 ml lopullista liuosta sekoituksen jälkeen vastaa 750 ml liuosta A ja 250 ml liuosta B.

Lopullisen liuoksen koostumus mmol/l sekoituksen jälkeen			
Vedetön glukoosi ($C_6H_{12}O_6$)	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
	75,5 mmol/l	126 mmol/l	214 mmol/l
Na ⁺	132 mmol/l		
Ca ⁺⁺	1,75 mmol/l		
Mg ⁺⁺	0,25 mmol/l		
Cl ⁻	101 mmol/l		
HCO ₃ ⁻	25 mmol/l		
C ₃ H ₅ O ₃ ⁻	10 mmol/l		

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Numero 35 valmisteen nimessä tarkoittaa liuoksen puskurien kokonaispitoisuutta 10 mmol/l laktaattia + 25 mmol/l vetykarbonaattia = 35 mmol/l.

3. LÄÄKEMUOTO

Peritoneaalidialyyzineste

Sterili, kirkas, väritön liuos.

Lopullisen liuoksen pH on 7,4.

	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
Osmolaarisuus (mOsmol/l)	345	396	484

4. KLIININSET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Physioneal 35 on tarkoitettu peritoneaalidialyyssiin seuraavissa tiloissa:

- akuutti ja krooninen munuaisten vajaatoiminta
- vakava veden retentio
- vakava elektrolyytien epätasapaino
- dialysoituvien lääkkeiden aiheuttama myrkkytys, milloin muuta sopivampaa hoitoa ei ole saatavilla.

Vetykarbonaatti/laktaattipuskuria sisältävät Physioneal 35 peritoneaalidialyyzinesteet, joilla on fysiologinen pH, ovat erityisesti tarkoitettu niille potilaille, joille pelkkää laktaattipuskuria sisältävistä peritoneaalidialyyzinesteistä, joissa on alhainen pH, aiheutuu sisäänvalutuksessa mahakipua tai epämukavuutta.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Lääkäri valitsee hoitomuodon, hoitotilheyden, antomäärän, sisälläoloajan ja dialysisin pituuden.

Vaikean kuivumisen ja hypovolemian vaaran välttämiseksi sekä proteiinihukan minimoimiseksi on syytä valita osmolaarisuudeltaan matalin peritoneaalidialyyzineste, joka riittää kyseisen vaihdon nesteenpoistotarpeeseen.

Aikuiset

- Jatkuvassa ambulatorisessa peritonealidialyssissä (CAPD) peritonealidialyssineste vaihdetaan tavallisesti neljä kertaa vuorokaudessa (24 tunnin aikana). Automaattisessa peritonealidialyssissä (APD) peritonealidialyssineste vaihdetaan tavallisesti 4-5 kertaa yöllä ja enintään kaksi kertaa päivällä. Täyttilavuus riippuu potilaan koosta. Tavallinen täyttilavuus on 2,0 - 2,5 litraa.

Iäkkääät potilaat

- Kuten aikuiset

Pediatriset potilaat

- Physioneal 35 -valmisten tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu lapsilla. Sen vuoksi Physioneal 35 -valmisen kliinistä hyötyä on verrattava lapsipotilaiden mahdollisiin haittavaikutusriskeihin. Physioneal 35 -valmistetta ei suositella lapsille, joiden tarvitsema täyttilavuus on alle 1600 ml, koska väärän infuusion haittseminen on vaikeaa (annostelu vain pienestä pussikammiosta). Ks. kohta 4.4.

Antotapa

Ennen lääkkeen käsiteltävää tai antoa huomioon otettavat varotoimet.

- Physioneal 35 on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan vatsaonteloon. Ei saa antaa laskimoon.
- Peritonealidialyssinesteet voidaan lämmittää päälyspussissa 37 °C:een epämiellyttävien tuntemusten välttämiseksi. Lämmittämiseen on käytettävä kuivaa lämpöä (esimerkiksi lämpötyynyä tai lämpölevyä). Liuosta ei saa lämmittää vedessä tai mikroaltaounissa potilaalle aiheutuvien mahdollisten vahinkojen tai epämiellyttävien tuntemusten vuoksi.
- Aseptista tekniikkaa tulee noudattaa koko pussinvaihdon ajan.
- Älä käytä liuosta, jos sen väri on muuttunut, se on sameaa, siinä on hiukkasia, jos pussi vuotaa kammioiden väliin tai ulkopuolelle, tai saumat eivät ole ehjät.
- Tarkista, että ulosvalutusnesteeessä ei esiinny fibrinää tai sameutta, sillä ne saattavat olla peritonitiin merkkejä.
- Kerta-antoon.
- Kun päälyspussi on poistettu, pitkä sauma (pussikammioiden välinen sauma) avataan heti, ja kammioiden luokset sekoitetaan. Sitten avataan lyhyt SafetyMoon-sauma (liitäntäportisauma), jotta sekoitettu liuos voidaan annostella. Peritonealidialyssineste on valutettava sisään 24 tunnin kuluessa sekoituksesta.
- Lisää käyttö- ja käsitteleyohjeita on kohdassa 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsitteleyohjeet.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1. mainituille apuaineille.

Physioneal 35 -valmiste on vasta-aiheinen potilaille, joilla on

- pysyviä mekaanisia vikoja, jotka estävät tehokkaan peritonealidialyssin tai lisäävät infektoriskiä,
- todettu vähentynyt vatsakalvon toiminta tai laajoja kiinnikkeitä, jotka haittaavat vatsakalvon toimintaa.

4.4 Varoituset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Käyttö potilailla, joilla on jokin vatsanalueen poikkeama

- Peritonealidialyysi on tehtävä varoen potilailla, joilla on
 - vatsassa leikkauksen, synnynnäisen epämuodostuman tai vamman aiheuttama vatsakalvon tai pallean repeämä, joka ei ole vielä parantunut, vatsan alueen kasvaimia, vatsanpeitteiden infektio, tyriä, ulostefisteli, kolostomia tai iliostomia, toistuvia divertikuliittijaksoja, tulehdusellinen tai iskeeminen suolisairaus, suuret polykystiset munuaiset tai muita tiloja, jotka heikentävät vatsanpeitteitä, vatsan seinämää tai vatsaonteloa, ja
 - muita sairaustiloja, kuten lähiaikoina istutettu aorttasiiire ja vaikea keuhkosairaus.

Kapseloiva vatsakalvon kovettuma (EPS)

- Kapseloiva vatsakalvon kovettuma (EPS) on tunnettu, harvinainen peritonealidialyssihoidon komplikaatio. Sitä on raportoitu potilailla, jotka ovat käyttäneet peritonealidialyssinesteitä, myös joillakin Physioneal 35 -valmistetta osana peritonealidialyssihoidoa käyttävillä.

Peritoniiitti

- Mahdollisen peritoniiitin hoitoon käytettävä antibiootti ja sen annostus on määrättävä tunnistetun eristetyn organismin (organismien) ja herkkyystutkimusten perusteella aina kun mahdollista. Ennen organismin (organismien) tunnistusta potilaalle voidaan antaa lajakirjoisia antibiootteja.

Yliherkkyys

- Potilailla, joilla on todettu maissiallergia tai allergia maissituotteille, on käytettävä harkiten glukoosiliuksia, jotka ovat peräisin maissin hydrolysoidusta tärkkelyksestä. Viljan (maissin) tärkkelyksestä johtuvia yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien anafylaktinen reaktio, saattaa ilmetä. Lopeta nesteen sisäänvalutus välittömästi ja valuta neste ulos vatsaontelosta epäiltyjen yliherkkyysreaktio-oireiden ilmaantuessa. Aloita suositellut hoitoon liittyvät vastatoimet kliinisen tarpeen mukaan.

Käyttö potilailla, joiden laktaattipitoisuudet ovat kohonneet

- Potilailla, joilla laktaatin pitoisuus veressä on suurentunut, on käytettävä laktaattiliuksia harkiten. Potilailla, joilla on tunnettu kohonnut riski maitohappoasidoosiin (esim. vakava alhainen verenpaine, verenmyrkytys, akuutti munuaisten vajaatoiminta, synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt, hoito metformiini- ja nukleosidi/nukleotidi-käänteiskopiojaentsyymin estääjä (NRTI)-lääkkeillä) pitää seurata tarkoin maitohappoasidoosin varalta ennen laktaattipohjaisen peritonealidalyysioidon aloittamista ja sen aikana.

Yleinen seuranta

- Määrättäässä liuosta yksittäiselle potilaalle pitää tarkoin miettiä dialyysioidon ja potilaan muiden sairauksien hoitojen välistä mahdollista yhteisvaikutusta. Kaliumin pitoisuutta seerumissa tulee seurata tarkoin sydänglykosideja käytävällä potilaalla.
- Potilaan nestetasapaino kirjataan huolellisesti ja potilaan painoa on seurattava tarkoin liallisen nestehukan tai nesteenkertymisen sekä niiden vakavien seuraamusten kuten kongesttiivisen sydämen vajaatoiminnan, hypovolemian ja sokin estämiseksi.
- Peritonealidalyysisä voi poistua proteiineja, aminohappoja ja vesiliukoisia vitamiineja tai lääkkeitä ja näiden korvaushoitoa voidaan tarvita.
- Elektrolyytien (erityisesti vetykarbonaatin, magnesiumin, kaliumin, kalsiumin ja fosfaatin) pitoisuuksia seerumissa, veren kemiallista koostumusta (myös lisäkilpirauhashormoni ja lipidparametrit) ja muita veriarvoja on tarkkailtava säännöllisin välajoin.

Metabolinen alkaloosi

- Potilaalla, joilla vetykarbonaatin pitoisuus plasmassa on yli 30mmol/l, mahdollisen metabolisen alkaloosin riskiä on punnittava valmisteen käytöstä saatavaan hyötyyn nähden.

Ylitäytö

- Physioneal 35 peritonealidalyysisinesteiden liian suuren määän valuttaminen vatsaonteloon voi aiheuttaa vatsan pingotusta, vatsakipua ja/tai hengitysvaikeuksia.
- Jos Physioneal 35 peritonealidalyysisinestettä on valutettu sisään liian suuri määärä, valutetaan neste ulos vatsaontelosta.

Vahvennan glukoosipitoisuuden käyttö

- Glukoosipitoisuudeeltaan vahvan Physioneal 35 peritonealidalyysisinesteen liallinen käyttö dialyysioidossa voi aiheuttaa potilaalla liallista nesteen poistumista.

Kaliumin lisäys

- Hyperkalemiariskin vuoksi Physioneal 35 peritonealidalyysisinesteissä ei ole kaliumia.
- Tilanteissa, joissa kaliumin pitoisuus potilaan seerumissa on normaali tai pienentynyt, kaliumlisä (4 mEq/l pitoisuuteen asti) voi olla aiheellista vaikean hypokalemian välttämiseksi. Kaliumlisän annon tulee perustua huolelliseen seerumin kaliumpitoisuuden ja kokonaiskaliumpitoisuuden määritykseen ja lääkärin on valvottava hoitoa.

Käyttö diabetespotilailla

- Diabetespotilaiden verensokeria on tarkkailtava ja insuliiniannosta tai muuta hyperglykemiahoidoja muutetava tarpeen mukaan.

Väääränlainen antotapa

- Jos letkujen sulkijoita käytetään väärin tai letkuja huuhdellaan väärässä järjestyksessä, vatsaonteloon voi päästää ilmaa, mikä saattaa aiheuttaa vatsakipua ja/tai peritoniitin.
- Potilaat on opastettava avaamaan sekä pitkä sauma että lyhyt sauma ennen sisääervalutusta. Jos vain lyhyt SafetyMoon-sauma avataan, sekoittamaton liuos voi aiheuttaa mahakipua, hypernatremiaa ja vaikkeaa metaboliista alkaloosia. Jos potilas on valuttanut sisään sekoittamatonta liuosta, hänen pitää valuttaa heti liuos ulos ja valuttaa sisään uusi sekoitettu liuos.

Pediatriset potilaat

- Lääkkeen tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu lapsipotilailla.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa ja sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Physioneal 35 -valmisteella.

Dialysoituvien lääkkeiden pitoisuus veressä voi pienentyä dialysisissä. Mahdollista poistumien vuoksi tarvittavaa korvaushoitoa on harkittavaa.

Sydänglykosideja käyttävien potilaiden kaliumin pitoisuksia plasmassa on seurattava huolellisesti digitalismyrkytysvaaran varalta. Kaliumlisä voi olla tarpeen.

4.6 Heidelmällisyys, raskaus ja imetyks

Raskaus

Physioneal 35 -valmisten käytöstä raskauden aikana ei ole, tai on vain vähän kliinistä tietoa.

Physioneal 35 -valmisten käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetyks

Physioneal 35 -valmisten metaboliittien eritymistä äidinmaitoon ei tunneta.

Mahdollista riskiä vastasyntyneille/lapsille ei voida pois sulkea. Imettämisen lopettamisen ja Physioneal 35 -valmisten käytön keskeyttämisen välillä on tehtävä arvionti ottaen huomioon imetykseen liittyvä hyöty lapselle ja hoitoon liittyvä hyöty äidille.

Hedelmällisyys

Physioneal 35 -valmisten vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tutkimustietoa.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Peritoneaalidialyssillä hoidettavilla munuaisten vajaatoimintapotilailla voi esiintyä haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Seuraavassa luetellut haittavaikutukset (esiintyivät vähintään 1 %:lla potilaista) raportoitiin kliinisissä tutkimuksissa ja myynnin aloittamisen jälkeen.

Haittavaikutusten yleisyyss on luokiteltu seuraavasti: Hyvin yleinen ($>1/10$; yleinen $\geq 1/100$ - $<1/10$); melko harvinainen ($\geq 1/1,000$ to $<1/100$); harvinainen ($\geq 1/10,000$ - $<1/1,000$; hyvin harvinainen ($<1/10,000$); tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviontiin).

Elinluokitus (SOC)	Haittavaikutus	Yleisyyss
VERI JA IMUKUDOS	Eosinofilia	Tuntematon

AINEENVAIHUNTA JA RAVITSEMUS	Hypokalemia Nesteretentio Hyperkalsemia Hypervolemia Anoreksia Dehydraatio Hyperglykemia Maitohappoasidoosi	Yleinen Yleinen Yleinen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen
PSYYKKISET HÄIRIÖT	Unettomuuus	Melko harvinainen
HERMOSTO	Huumaus Päänsärky	Melko harvinainen Melko harvinainen
VERISUONISTO	Hypertensio Hypotensio	Yleinen Melko harvinainen
HENGITYSELIMET, RINTAKEHÄ JA VÄLIKARSINA	Dyspnea Yskä	Melko harvinainen Melko harvinainen
RUOANSULATUS-ELIMISTÖ	Peritoniiitti Vatsakalvon vajaatoiminta Vatsakipu Dyspepsia Ilmavaivat Pahoinvoiointi Kovettumista aiheuttava kapseloiva peritoniiitti Samea ulosvalutusneste	Yleinen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Tuntematon Tuntematon
IHO JA IHONALAINEN KUDOS	Angioedeema Ihottuma	Tuntematon Tuntematon
LUUSTO, LIHAKSET JA SIDEKUDOS	Lihas- ja luustokipu	Tuntematon
YLEISOIREET JA ANTOPAIKASSA TODETTAVAT HAITAT	Turvotus Heikkous Vilunväristykset Kasvojen turvotus Tyrä Huonovointisuus Jano Kuume	Yleinen Yleinen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Melko harvinainen Tuntematon
TUTKIMUKSET	Painonrousus pCO ₂ nousu	Yleinen Melko harvinainen

Muut peritoneaalidialyssin toimenpiteeseen liittyvät haittavaikutukset: bakteerin aiheuttama vatsakalvotulehdus, infektiota katetrin ympärillä, katetriin liittyvä komplikaatio.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

4.9 Yliannostus

Mahdollisia yliannostuksen seurauksia ovat hypervolemia, hypovolemia, elektrolyyttihäiriöt tai (diabetespotilailla) hyperglykemia. Ks. kohta 4.4.

Yliannostuksen hoito:

Hypervolemiaa voidaan hoitaa käyttämällä hypertension peritonealidalyysinestettä ja nesteen säännöstelyllä.

Hypovolemiaa voidaan hoitaa suun kautta tai laskimoon annettavalla korvausnesteellä, riippuen kuivumisen määräästä.

Elektrolyttien epätasapaino hoidetaan veritutkimuksen vahvistaman spesifin elektrolyyttihäiriön mukaisesti. Toidennäköisin häiriö hypokalemia hoidetaan hoitavan lääkärin määräämällä suun kautta annettavalla kaliumilla tai peritonealidalyysinesteeseen lisättävällä kaliumkloridilla.

Hyperglykemia (diabeetikoilla) hoidetaan muuttamalla insuliiniannosta hoitavan lääkärin määräyksen mukaisesti.

Kohdassa 4.4. on tietoa Physioneal 35-valmisten liiallisesta valuttamisesta vatsaonteloon.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Peritonealidalyysinestet, hypertoniset liuokset. ATC koodi: B05DB

Toimintamekanismi

Munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille peritonealidalyysi on menetelmä, jolla poistetaan typen ai-neenvaihdunnassa syntyiä toksisia, normaalista munuaisten kautta erittyviä aineita ja jolla autetaan neste- ja elektrolyyttitasapainon sekä happo-emästasapainon säättelyä.

Menetelmässä valutetaan peritonealidalyysinestettä katetrin avulla vatsaonteloon.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Glukoosiliuos on plasman suhteena hyperosmolaarinen, ja se saa aikaan osmoottisen gradientin, mikä vetää nesteettä plasmasta peritonealidalyysinesteesseen. Aineet siirtyvät dialysinesteen ja potilaan vatsakalvon hiussuon-ten välillä osmoosin ja diffuusion periaatteiden mukaisesti. Oltuaan vatsaontelossa sisälläoloajan neste on kyllästyntynyt toksista aineista ja se on vaihdettava. Lukun ottamatta vetykarbonaatin esiasteena olevaa laktaattia, liuoksen elektrolyttisisältö on suunniteltu normalisoimaan plasman elektrolyyttipitoisuutta. Veressä suurina pitoisuuksina esiintyvä typen kuona-aineet siirtyvät vatsakalvon läpi dialysinesteesseen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Yli 30 % kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista oli yli 65-vuotiaita. Tästä ryhmästä saadut tutkimustulokset eivät eroa muista potilaista saaduista tutkimustuloksista.

In vitro ja *ex vivo* -tutkimuksissa Physioneal 35 on osoittautunut paremmin biologisesti yhteensovivaksi kuin vakio laktaattipuskuria sisältävät liuokset. Tämän lisäksi rajoitetulla potilasmäärellä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa potilaat, joilla on mahakipua nesteen sisäänvalutuksessa, ovat saaneet helpotusta oireeseensa. Tois-taiseksi ei kuitenkaan ole saatavilla tutkimustuloksia, jotka osoittaisivat yleensä kliinisten haittavaikutusten vä-hentyneen tai että tällaisten liuosten käytöllä olisi pitkän aikavälin hyötyä.

5.2 Farmakokinetiikka

Vatsaonteloon annettu glukoosi, elektrolytit ja vesi absorboituvat vereen ja metaboloituvat tavallista tietä. Glukoosi metaboloituu (1 g glukoosia = 4 kilokaloria tai 17 kilojoulea) hiiliidioksidiksi ja vedeksi.

5.3 Prekliinis et tie dot turvallisuudesta

Physioneal 35 -valmisteella ei ole tehty non-klinisiä tutkimuksia.

6. FARMASEUTTiset tiedot

6.1 Apuaineet

Laimea kloorivetyhappo (pH:n säätöön)

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Infusionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin kohdassa 6.3 mainitujen lääkevalmisteiden kanssa.

Aminoglykosideja (esim. netilmisiini, gentamisiini, tobramysiini) ei pidä sekoittaa penisilliinien kanssa kemiallisen yhteensopimattomuuden takia.

6.3 Kestoaika

2 vuotta.

Avaamisen/laimentamisen jälkeen:

Seuraavat lääkkeet ovat valmisteeseen lisättynä osoittautuneet kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiileiksi 24 tuntia 25 °C:ssa: kefatsoliini (750 mg/l), hepariini (2500 IU/l), pienimolekyylinen hepariini (Innohep 2500 IU/l), netilmisiini (60 mg/l) ja vankomysiini (1000 mg/l).

Insuliini (Actrapid 4 IU/l, 10 IU/l, 20 IU/l ja 40 IU/l) on valmisteeseen lisättynä osoittautunut kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiiliksi 6 tuntia 25 °C:ssa.

Gentamisiini (60 mg/l) ja tobramysiini (60 mg/l) voidaan lisätä valmisteeseen vain jos valmiste käytetään välittömästi lisäyksen jälkeen.

Mikrobiologiselta kannalta katsoen valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä saa normaalista ylittää 24 tuntia, ellei valmistus/laimentaminen (jne.) ole tapahtunut kontrolloidussa ja validoidussa aseptisissa olosuhteissa.

6.4 Säilytys

Säilytä yli 4 °C.

Käyttökuntaan saatetun lääkevalmisten säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Physioneal 35 on kaksikammiosessa Clear-Flex-pussissa, joka on valmistettu polypropyleenista, polyamidista ja polypropyleeni-, SEBS- ja polyetyleeniseoksesta. Suuressa pussikammiossa on injektioportti glukoosielektrolyytiliuokseen tehtäviä lääkelisäyksiä varten. Pienessä pussikammiossa on portti, johon sopiva annostelulaite kiinnitetään ennen dialyysitoimenpiteitä.

Pussi on läpinäkyvä päälyspussin sisällä. Päälyspussi on monikerroksista polymeria.

Pussin sisältö sekoituksen jälkeen: 1500 ml (1125 ml liuosta A ja 375 ml liuosta B), 2000 ml (1500 ml liuosta A ja 500 ml liuosta B), 2500 ml (1875 ml liuosta A ja 625 ml liuosta B), 3000 ml (2250 ml liuosta A ja 750 ml liuosta B), 4500 ml (3375 ml liuosta A ja 1125 ml liuosta B), 5000 ml (3750 ml liuosta A ja 1250 ml liuosta B.)

Vakiopussi on kaksikammioinen pussi (suuri kammio A ja pieni kammio B, ks. kohta 2), jota käytetään automatisessa peritoneaalidialyyssä (APD). Duopussissa on kaksikammioinen vakiopussi (suuri kammio A ja pieni kammio B, ks. kohta 2), integroitu liitäntäjärjestelmä ja tyhjennyspussi, ja sitä käytetään CAPD-hoidossa (*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis*).

Physioneal 35:n rekisteröidyt pakkauskoot on listattu alla. Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole kaupan.

1,5 litraa x 5 (laatikossa) tai 1,5 litraa x 6 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin
1,5 litraa x 5 (laatikossa) tai 1,5 litraa x 6 (laatikossa)	duopussi	kierreliitin

2,0 litraa x 4 (laatikossa) tai 2,0 litraa x 5 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin
2,0 litraa x 4 (laatikossa) tai 2,0 litraa x 5 (laatikossa)	duopussi	kierreliitin

2,5 litraa x 3 (laatikossa) tai 2,5 litraa x 4 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin
2,5 litraa x 3 (laatikossa) tai 2,5 litraa x 4 (laatikossa)	duopussi	kierreliitin

3,0 litraa x 3 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin
3,0 litraa x 3 (laatikossa)	duopussi	kierreliitin

4,5 litraa x 2 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin

5,0 litraa x 2 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin
5,0 litraa x 2 (laatikossa)	vakiopussi	kierreliitin + HomeChoice APD-letkusto, jossa kierreliitin + suojakuori + minicap

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Yksityiskohdat annosta, ks. kohta 4.2.

- Ptilaille opastetaan yksityiskohtaisesti peritoneaalidialyyssipussin vaihto erityiskoulutuksessa ennen kuin ptilaat käyttää kotona peritoneaalidialyyssinesteitä.
- Päälyspussin poistamisen jälkeen avaa heti (kammioiden välinen) pitkä sauma ja sekoita liuokset keskenään. Sen jälkeen avaa lyhyt SafetyMoon -sauma (liitäntäporttisauma), jotta voit valuttaa sekoitetun liuoksen sisään. Peritoneaalidialyyssineste pitää käyttää 24 tunnin kuluessa sekoittamisesta. Ks. kohta 4.2.
- Lääkkeet pitää lisätä lääkkeenlisäysportin kautta suureen kammioon ennen kammioiden välissä olevan sauman avaamista. Lääkkeiden yhteensopivuus on tarkistettava ennen lisäystä ja liuoksen pH ja vaikuttavat aiheet on huomioitava. Valmiste on käytettävä heti lääkkeen lisäyksen jälkeen.
- Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
- Jos pakaus on vahingoittunut, se on hävitettävä.
- Liuoksessa ei ole bakteeriendotoksiimeja.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Baxter Oy
PL 119 (Tammasaarenkatu 1)
00181 Helsinki

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg/ml (1,36 % w/v) Clear-Flex: 19152

Physioneal 35 Glucose 22,7 mg/ml (2,27 % w/v) Clear-Flex: 19153

Physioneal 35 Glucose 38,6 mg/ml (3,86 % w/v) Clear-Flex: 19154

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 6.9.2004

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 24.10.2008

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

16.08.2021

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg/ml (1,36% w/v) Clear-Flex, peritonealdialysvätska
Physioneal 35 Glucose 22,7 mg/ml (2,27% w/v) Clear-Flex, peritonealdialysvätska
Physioneal 35 Glucose 38,6 mg/ml (3,86% w/v) Clear-Flex, peritonealdialysvätska

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Före blandning

1000 ml elektrolytlösning (stora kammaren "A") innehåller:			
Aktiva ämnen: Glukosmonohydrat ekvivalent med glukosanhydrat	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
	20,0 g 18,2 g	33,3 g 30,3 g	56,6 g 51,5 g
Kalciumkloriddihydrat		0,343 g	
Magnesiumkloridhexahydrat		0,068 g	
1000 ml bufferlösning (lilla kammaren "B") innehåller:			
Aktiva ämnen: Natriumklorid Natriumvätekarbonat Natrium (S)-laktatlösning ekvivalent med natrium (S)-laktat		21,12 g 9,29 g 4,48 g	

Efter blandning

1000 ml av den blandade lösningen innehåller:			
Aktiva ämnen: Glukosmonohydrat ekvivalent med glukosanhydrat	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
	15,0 g 13,6 g	25,0 g 22,7 g	42,5 g 38,6 g
Natriumklorid		5,67 g	
Kalciumkloriddihydrat		0,257 g	
Magnesiumkloridhexahydrat		0,051 g	
Natriumvätekarbonat		2,10 g	
Natrium (S)-laktatlösning ekvivalent med natrium (S)-laktat		1,12 g	

1000 ml lösning efter blandning motsvarar 750 ml av lösning A och 250 ml av lösning B.

Lösningens sammansättning efter blandning i mmol/l			
Glukosanhydrat ($C_6H_{12}O_6$)	13,6 mg/ml (1,36 % w/v)	22,7 mg/ml (2,27 % w/v)	38,6 mg/ml (3,86 % w/v)
	75,5 mmol/l	126 mmol/l	214 mmol/l
Na ⁺		132 mmol/l	
Ca ⁺⁺		1,75 mmol/l	
Mg ⁺⁺		0,25 mmol/l	
Cl ⁻		101 mmol/l	
HCO ₃ ⁻		25 mmol/l	
C ₃ H ₅ O ₃ ⁻		10 mmol/l	

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1

Siffran "35" i namnet specificerar lösningens buffertkoncentration (10 mmol/l laktat + 25 mmol/l vätekarbonat = 35 mmol/l).

3. LÄKEMEDELSFORM

Peritonealdialysvätska.

Steril, klar, färglös vätska.

pH för den färdigblandade lösningen är 7,4.

	1,36 %	2,27 %	3,86 %
Osmolaritet (mOsmol/l)	345	396	484

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Physioneal 35 Glucose är indicerad för peritonealdialys vid:

- akut och kronisk njursvikt
- allvarlig vattenretention
- allvarlig elektrolyttörning
- läkemedelsförgiftning av dialyserbara läkemedel, när bättre behandlingsalternativ inte är tillgängliga

Vätekarbonat/laktat baserade Physioneal 35 peritonealdialysvätskor med ett fysiologiskt pH är framförallt indicerat hos patienter där lösningar baserade på enbart laktatbuffert, med lågt pH, orsakar buksmärta eller obehag vid itappning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingsmetod, behandlingsfrekvens, utbytt volym, dialysintervall och behandlingstid ska inledas och övervakas av läkaren.

För att undvika risken för allvarlig dehydrering, hypovolemi och för att minimera proteinförlust, rekommenderas att välja den peritonealdialysvätska med längsta osmolaritet förenlig med den mängd vätska som ska avlägsnas vid varje byte.

Vuxna

Patienter med kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) genomför i genomsnitt 4 cykler per dygn (24 timmar). Patienter med automatiserad peritonealdialys (APD) genomför i genomsnitt 4-5 cykler per natt och upp till 2 cykler per dag. Fyllnadsvolymen är beroende av kroppsstorlek, normalt från 2-2,5 liter.

Äldre

Som för vuxna.

Pediatriska patienter

Säkerhet och effekt av Physioneal 35 Glucose hos pediatriska patienter har inte fastställts. De kliniska förde-larna med Physioneal 35 Glucose måste därför vägas mot risken för biverkningar hos denna patientkategori. An-vändning av Physioneal 35 i **Clear-Flex-påse** rekommenderas inte till barn som kräver mindre än 1600 ml som fyllnadsvolym beroende på risken att inte upptäcka en felaktig infundering (administrering enbart från den lilla kammaren). Se avsnitt 4.4.

Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid hantering eller administrering av läkemedlet:

- Physioneal 35 Glucose är endast för intraperitoneal administrering. Ej för intravenös injektion.
- Peritonealdialysvätska kan värmas i ytterpåsen till 37 °C för större patientkomfort. Endast torr värme (värmedyna, värmeplatta eller dylikt) får användas. Vätskan får inte värmas i vatten eller mikrovågsugn på grund av risk för skada eller obehag för patienten.
- Aseptisk teknik ska användas under hela peritonealdialysbehandlingen.
- Lösningen ska inte administreras om den är missfärgad, grumlig, innehåller partikelmassa, visar tecken på läckage mellan kamrarna eller utåt eller om förseglingarna inte är intakta.
- Den avtappade vätskan bör inspekteras med avseende på förekomst av fibrin eller grumlighet, eftersom detta kan vara tecken på infektion eller aseptisk peritonit.
- Endast för engångsbruk
- Efter det att ytterpåsen har öppnats skall den långa förseglingen (förseglingen mellan kamrarna) ome-delbart öppnas för att blanda de två lösningarna. Därefter skall den korta förseglingen (accessförseg-lingen) öppnas för att tillåta administrering av den blandade vätskan. Peritonealdialysvätskan för intra-peritonealt bruk måste infunderas inom 24 timmar efter blandning.
- Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpmämne som anges i avsnitt 6.1.

Physioneal 35 Glucose ska inte användas till patienter som har:

- mekaniska skador som inte kan åtgärdas och som förhindrar effektiv peritonealdialys eller ökar risken för infektion
- dokumenterat nedsatt peritonealfunktion eller omfattande adherenser som försämrar peritonealfunkt-ionen.

4.4 Varningar och försiktighet

Användning hos patienter med tillstånd som påverkar buken

Peritonealdialys ska utföras med försiktighet hos patienter som:

- 1) har något tillstånd som påverkar buken, exempelvis skador på bukhinnan eller diafragman till följd av operation, kongenitala missbildningar eller trauma innan läkningen fullbordats, tumor i buken, infektion i bukväggen, bräck, analfistel, kolostomi eller ileostomi, frekventa episoder av divertiklit, inflammatörisk eller ischemisk tarmsjukdom, stora polycystiska njurar eller andra tillstånd som äventy-rar bukväggens, bukhinnans eller bukhålans integritet, och
- 2) har andra tillstånd som nyligen genomgången aortatransplantation eller allvarlig lungsjukdom.

Inkapslande peritoneal skleros (EPS)

Inkapslande peritoneal skleros (encapsulating peritoneal sclerosis, EPS) betraktas som en känd, sällsynt komplikation vid peritonealdialysbehandling. EPS har rapporterats hos patienter som använder peritonealdialysvätska, däribland vissa patienter som använder Physioneal 35 Glucose som en del av peritonealdialysbehandlingen.

Peritonit

Om peritonit uppstår ska valet och doseringen av antibiotika om möjligt baseras på resultaten av identifierings- och känslighetsstudier av den/de enskilda organismen/erna. Innan den eller de organismer som är involverade har identifierats, kan antibiotika med brett spektrum användas.

Överkänslighet

Lösningar som innehåller glukos framtaget från hydrolyserad majsstärkelse ska användas med försiktighet hos patienter med känd allergi mot majs eller majsprodukter. Överkänslighetsreaktioner såsom de mot majsstärkelse, inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, kan förekomma. Avbryt infusionen omedelbart och dränera lösningen från bukhålan om några tecken eller symptom på misstänkt överkänslighetsreaktion utvecklas. Lämpliga terapeutiska motåtgärder måste vidtas såsom kliniskt indicerat.

Patienter med förhöjda laktatnivåer

Patienter med förhöjda laktatnivåer bör använda laktatinnehållande peritonealdialy whole solutions med försiktighet. Patienter med tillstånd som man vet ökar risken för mjölkysyraacidos [t.ex. svår hypotoni, sepsis, akut njurinsufficiens, medfödda rubbningar i ämnesomsättningen, behandling med läkemedel som metformin och omvänta transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp (NRTI)] bör övervakas för eventuell förekomst av mjölkysyraacidos innan behandlingen inleds samt under behandling med laktatbaserad peritonealdialysvätska.

Allmän övervakning

När lösningen ordinaras till en viss patient ska hänsyn tas till eventuella interaktioner mellan dialysbehandling och andra samtidiga behandlingar relaterade till andra befintliga tillstånd. Kaliumnivån i serum måste följas noggrant hos patienter som får hjärtglykosider.

Ett noggrant vätskeschema måste föras och patientens kroppsvikt ska noggrant övervakas för att undvika över- eller underhydrering med allvarliga konsekvenser inkluderat hjärtsvikt, volymdepletion och chock.

Proteiner, aminosyror, vattenlösliga vitaminer och andra mediciner kan förloras under peritonealdialys och kan behöva ersättas.

Serum elektrolytkoncentrationer (speciellt vätekarbonat, kalium, magnesium, kalcium och fosfat), blodkemi (inklusive parathormon och lipidparametrar) och hematologiska parametrar ska utvärderas regelbundet.

Metabolisk alkalos

Hos patienter med plasmanivåer av vätekarbonat överstigande 30 mmol/liter skall risken för metabolisk alkalos vägas mot fördelarna med behandling med denna produkt.

Överinfusion

Överinfusion av Physioneal 35 i bukhålan kan kännetecknas av utspänd buk/buksmärta och/eller andfåddhet.

Överinfusion av Physioneal 35 behandlas genom att den volym Physioneal 35 som finns i bukhålan avlägsnas genom dränering.

Användning med högre glukoskoncentration

Överanvändning av Physioneal 35 peritonealdialysvätska med högre glukoshalt kan resultera i att för mycket vatten dras från patienten.

Se avsnitt 4.9.

Tillägg av kalium

Physioneal 35 lösningar innehåller inget kalium pga risken för hyperkalemi. I situationer när en normal serumkaliumnivå eller hypokalemi föreligger, kan tillägg av kaliumklorid (upp till en koncentration på 4 mEq/l) vara indicerat för att förebygga svår hypokalemi och skall göras efter noggrann utvärdering av serum- och total kaliumhalt i kroppen under överinseende av läkare.

Användning hos diabetespatienter

Hos diabetespatienter ska blodglukosnivåerna mätas och insulindosen eller andra behandlingar av hyperglykemi justeras.

Felaktig administrering

Om flushing eller öppning och stängning av klämmor sker i felaktig ordningsföljd kan det resultera i att luft kommer in i bukhålan, vilket kan orsaka buksmärta och/eller peritonit.

Patienten skall ges instruktioner om att både den långa och den korta förseglingen måste öppnas före infundering. Om patienten bara öppnar den korta förseglingen, kan infundering av oblandad lösning ge buksmärta, hypernatremi och svår metabolisk alkalos. Vid infundering av oblandad lösning skall patienten omedelbart tappa ur vätskan och i stället använda en nyblandad påse.

Pediatrisk population

Säkerhet och effektivitet hos pediatrika patienter har inte fastställts.

4.5 Interaktioner med andra läke medel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

- Blodkoncentrationen av dialyserbara läkemedel kan reduceras under dialysen. En möjlig kompenstation för eventuella förluster måste övervägas.
- Plasmanivåerna av kalium hos patienter som behandlas med hjärtglykosider måste noggrant följas eftersom det föreligger en risk för digitalisintoxikation. Tillägg av kalium kan vara nödvändig.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Physioneal 35 Glucose hos gravida kvinnor. Physioneal 35 Glucose rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Det är okänt om Physioneal 35 Glucose-metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/späd-barnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om kvinnan ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Physioneal 35 Glucose efter att hänsyn tagits till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om fertilitet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter med terminal njursvikt som genomgår peritonealdialys kan uppleva biverkningar som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som har förekommit (hos 1 % eller fler av patienterna) under kliniska prövningar och efter marknadsintroduktion listas nedan.

Frekvensen delas in i följande kategorier: Mycket vanliga ($\geq 1/10$), Vanliga ($\geq 1/100, < 1/10$), Mindre vanliga ($\geq 1/1\,000, < 1/100$), Sällsynta ($\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$), Mycket sällsynta ($< 1/10\,000$), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Klassificering av organsystem	Föredragn term	Frekvens
BLODET OCH LYMF SYSTEMET	Eosinofioli	Ingen känd frekvens
METABOLISM OCH NUTRITION	Hypokalemia Vätskeretention Hyperkalcemi Hypervolemi Anorexi Dehydrering Hyperglykemi Laktatacidos	Vanliga Vanliga Vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga
PSYKISKA STÖRNINGAR	Insomnia	Mindre vanliga
CENTRALA OCH PERIFERA NERVSYSTEMET	Yrsel Huvudvärk	Mindre vanliga Mindre vanliga
BLODKÄRL	Hypertension Hypotension	Vanliga Mindre vanliga
ANDNINGSVÄGAR, BRÖSTKORG OCH MEDIASTINUM	Dyspné Hosta	Mindre vanliga Mindre vanliga
MAGTARMKANALEN	Peritonit Nedsatt funktion av bukhinnan Buksmärta Dyspepsi Flatulens Illamående Inkapslande peritoneal skleros Grumligt dialysat	Vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Ingen känd frekvens Ingen känd frekvens
HUD OCH SUBKUTAN VÄVNAD	Angioödem Utslag	Ingen känd frekvens Ingen känd frekvens

MUSKULOSKELETAL SYSTEMET OCH BINDVÄV	Muskuloskeletal smärta	Ingen känd frekvens
ALLMÄNNA SYMTOM OCH/ELLER SYMTOM VID ADMINISTRERINGSSTÄLLET	Ödem Asteni Frossbrytningar Ansiktsödem Bråck Sjukdomskänsla Törst Pyrexia	Vanliga Vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Mindre vanliga Ingen känd frekvens
UNDERSÖKNINGAR	Viktökning PCO ₂ ökning	Vanliga Mindre vanliga

Andra biverkningar av peritonealdialys relaterade till behandlingen: bakteriell peritonit, infektion runt katetern och kateterrelaterad komplikation.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via (se detaljer nedan).

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Möjliga konsekvenser av en överdos inkluderar hypervolemi, hypovolemi, elektrolyttörningar eller (hos diabetiker) hyperglykemi. Se avsnitt 4.4.

Behandling av överdosering

Hypervolemi kan behandlas med hyperton peritonealdialysvätska och vätskerestriktion.

Hypovolemi kan behandlas med vätskersättning, antingen oralt eller intravenöst beroende på graden av dehydrering.

Behandling av elektrolytrubbningar beror på den specifika elektrolyttörningen, vilken skall verifieras med blodprov. Den vanligaste störningen är hypokalemia och kan behandlas med oralt intag av kalium eller med tillägg av kaliumklorid i peritonealdialysvätskan i enlighet med behandlande läkares föreskrift.

Hyperglykemi (hos diabetiker) skall behandlas med justerade insulindoser i enlighet med den behandlande läkarens föreskrivna insulinschema.

Se avsnitt 4.4 för information om överinfusion av Physioneal 35 och dess behandling.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Peritonealdialysvätska, hypertona lösningar, ATC-kod: B05DB00

Verkningsmekanism

Peritonealdialys är en behandling för patienter med njursvikt, med avsikt att avlägsna toxiska substanser från kvävemetabolismen och som normalt utsöndras via njurarna, samt för att underlätta vätske- och elektrolytregleringen såväl som syra-basbalansen.

Behandlingen utförs genom att administrera peritonealdialysvätska via en kateter in till bukhålan.

Farmakodynamisk effekt

Glukos gör lösningen hyperosmolär jämfört med plasma och bildar en osmotisk gradient som möjliggör avlägsnandet av vätska från plasma till lösningen.

Överföringen av substanser sker via peritoneum enligt principen för osmos och diffusion. Efter en viss tid är vätskan mättad med toxiska ämnen och måste bytas. Med undantag av laktat, som ingår som vätekarbonat-prefuskor, har elektrolytkoncentrationerna i vätskan valts för att normalisera plasmainhalterna. Kvävehaltiga restprodukter, närvarande i höga koncentrationer i blodet, passerar via peritoneum över till dialysvätskan.

Klinisk effekt och säkerhet

Över 30 % av patienterna i kliniska prövningar var äldre än 65 år. Utvärderingen av resultat för denna åldersgrupp visade ingen skillnad jämfört med andra patienter.

In vitro- och *ex vivo*-studier har visat på förbättringar av Physioneal 35 biokompatibilitetsparametrar jämfört med vanlig laktatbuffrad lösning. Dessutom har kliniska prövningar på ett begränsat antal patienter med buksmärta vid tillförseln av lösning visat viss symptomatisk lindring. För närvarande finns emellertid inga tillgängliga data som indikerar att kliniska komplikationer allmänt sett minskar eller att regelbunden användning av sådana lösningar kan innebära betydande fördelar på längre sikt.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Intraperitonealt administrerad glukos, elektrolyter och vatten absorberas till blodet och metaboliseras via de normala vägarna. Glukos metaboliseras (1 g glukos = 4 kilokalorier eller 17 kilojoule) till CO₂ och H₂O.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga prekliniska studier har utförts med Physioneal 35.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälvpämnen

Saltsyra, utspädd (pH-justering)

Natriumhydroxid (pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, utom de som omnämns i avsnitt 6.3.

Aminoglykosider (t.ex. netilmycin, gentamicin, tobramycin) ska inte blandas med penicillin på grund av kemisk inkompatibilitet.

6.3 Hållbarhet

- 2 år.
- Efter öppnande/spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats i 24 timmar vid 25°C för: cefazolin (750 mg/l), heparin (2500 IE/l), lågmolekylärt heparin (Innohep 2500 IE/l), netilmycin (60 mg/l) och vankomycin (1000 mg/l).

Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats i 6 timmar vid 25°C för insulin (Actrapid 4 IE/l, 10 IE/l, 20 IE/l och 40 IE/l).

Gentamicin (60 mg/l) och tobramycin (60 mg/l) kan tillsättas om lösningen används omedelbart efter läkemedelstillsatsen.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar, om inte beredning/spädning (etc.) har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras ej under 4°C.

Förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förfärdignings- och förvaringsanvisningar

Physioneal 35 förvaras i en tvåkammarpåse tillverkad av co-extruderad film (Clear-Flex film) av polypropylen, polyamid och en blandning av polypropylen, SEBS (styrenetylensbutylstyren) och polyetylen.

Den övre kammaren har en fastsvetsad injektionsport för att kunna blanda läkemedel med glukos- och elektrolytlösningen. Den nedre kammaren har en port för koppling till lämpligt överföringsaggregat som tillåter dialysanvändning.

Påsen är försedd i en transparent ytterpåse bestående av flerskiktade copolymerer.

Påsvolym efter blandning: 1500 ml (1125 ml av lösning A och 375 ml av lösning B), 2000 ml (1500 ml av lösning A och 500 ml av lösning B) och 2500 ml (1875 ml av lösning A och 625 ml av lösning B), 3000 ml (2250 ml av lösning A och 750 ml av lösning B), 4500 ml (3375 ml av lösning A och 1125 ml av lösning B), 5000 ml (3750 ml av lösning A och 1250 ml av lösning B).

Singelpåsen är en tvåkammarpåse (stor kammare "A" och liten kammare "B", se avsnitt 2) för att användas vid automatisk peritonealdialysbehandling (APD).

Duo-påsen är en tvåkammarpåse (stor kammare "A" och liten kammare "B", se avsnitt 2) med ett integrerat fränkopplingssystem samt en tom avtappningspåse för att användas vid kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialysbehandling (CAPD).

Eventuellt kommer inte alla förfärdigningsstørlekar att marknadsföras.

1,5 l x5	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
1,5 l x6	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
1,5 l x5	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling
1,5 l x6	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling

2,0 l x4	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,0 l x5	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,0 l x4	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,0 l x5	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling

2,5 l x3	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,5 l x4	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,5 l x3	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling
2,5 l x4	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling

3,0 1 x3	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
3,0 1 x3	Duo- tvåkammarpåse	Skruvkoppling
4,5 1 x2	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
5,0 1 x2	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling
5,0 1 x2	Singel tvåkammarpåse	Skruvkoppling + HomeChoice APP set med skruvkoppling + jodsnäcka och minicap

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

För mer information se avsnitt 4.2.

- En detaljerad instruktion om bytesproceduren vid peritonealdialys ges till patienten genom träning på ett träningscenter innan användning hemma.
- Efter det att ytterpåsen har öppnats, öppna omedelbart den långa förseglingen (förseglingen mellan kamrarna) för att blanda de två lösningarna och sedan den korta SafetyMoon-förseglingen (accessförseglingen) för att tillåta administrering av vätskan. Peritonealdialysvätskan för intraperitonealt bruk måste infunderas inom 24 timmar efter blandning. Se avsnitt 4.2.
- Läkemedel ska tillföras via injektionsporten i den stora kammaren innan förseglingen mellan kamrarna öppnas. Läkemedlens kompatibilitet måste kontrolleras före blandning, pH och lösningens salter måste tas med i beräkning. Lösningen ska användas omedelbart efter läkemedelstillsatsen.
- Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
- Vid eventuell skada ska påsen kastas.
- Lösningen är fri från bakteriella endotoxiner.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Baxter Oy
PL 119 (Tammasaarenkatu 1)
00181 Helsingfors

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg/ml (1,36 % w/v) Clear-Flex: 19152
Physioneal 35 Glucose 22,7 mg/ml (2,27 % w/v) Clear-Flex: 19153
Physioneal 35 Glucose 38,6 mg/ml (3,86 % w/v) Clear-Flex: 19154

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 6.9.2004
Datum för den senaste förnyelsen: 24.10.2008

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

16.08.2021