

## **PAKKAUSSELOSTE**

Nerfasin vet 100 mg/ml, injektioneste, liuos naudoille ja hevosille

### **1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

#### Myyntiluvan haltija:

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Alankomaat

#### Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer  
Alankomaat

### **2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Nerfasin vet 100 mg/ml, injektioneste, liuos naudoille ja hevosille  
Ksylatsiini (hydrokloridina)

### **3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET**

1 millilitra sisältää:

#### **Vaikuttava aine:**

Ksylatsiini (hydrokloridina) 100,0 mg  
(vastaten 116,55 mg ksylatsiinihydrokloridia)

#### **Apuaineet:**

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218) 1,0 mg

Kirkas, väritön liuos.

### **4. KÄYTTÖAIHEET**

Sedaatio. Esilääkityksenä yhdessä muiden anesteettien kanssa.

### **5. VASTA-AIHEET**

- Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.
- Älä käytä eläimillä, joilla on ruuansulatuskanavan tukos, sillä lääkeaineen lihaksia rentouttava vaikutus voimistaa tukoksen oireita ja voi aiheuttaa oksentelua.
- Älä käytä vaikea-asteisesta munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivillä eläimillä äläkä

eläimillä, joilla on hengitysvaikeuksia, epänormaali sydämen toiminta, alhainen verenpaine ja/tai sokki.

- Älä käytä sokeritautia sairastaville eläimille.
- Älä käytä eläimille, joilla on esiintynyt kouristuskohtauksia.
- Älä käytä alle 200 kg naudoille. Älä käytä alle 2 viikon ikäisille varsoille.
- Älä käytä lopputiimeyden aikana (riski liian aikaiseen synnytykseen) lukuun ottamatta synnytystä (katso kohta 12).

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Alfa-2-adrenergisten reseptorien agonisteille tyypillisiä haittavaikutuksia, kuten sydämen hidasyöntisyyttä, ohimeneviä rytmihäiriötä ja verenpaineen laskua, voi esiintyä. Ruumiinlämpö voi nousta tai laskea riippuen ympäristön lämpötilasta, sillä ksylatsiini vaikuttaa ruumiinlämmönsäätylyn. Hengityselimistön lamaa ja/tai hengityskatkoksia voi esiintyä.

### Nauta

- Ksylatsiini voi naudalla laukaista ennenaikaisen synnytyksen ja se heikentää munasolun kiinnitymistä.
- Naudoilla, jotka ovat saaneet suuria annoksia ksylatsiinia voi joskus esiintyä löysiä ulosteita 24 tuntia annostelun jälkeen.
- Muita haittavaikutuksia voivat olla kuorsaaminen, lisääntynyt kuolaaminen, pötsin atonia, kielen atonia, regurgitaatio, puhaltuminen, ylhähengitysteiden vinkuminen, hypotermia, sydämen hidasyöntisyys, lisääntynyt virtsaaminen ja palautuva penisprolapsi.

### Hevonen

- Hevoset usein hikoilevat rauhoitusvaikutuksen vähetessä.
- Erityisesti hevosilla on raportoitu vakavaa sydämen hidasyöntisyyttä ja hidastunutta hengitystihetyttä.
- Hevosille annostelun jälkeen on usein havaittavissa tilapäinen verenpaineen nousu, minkä jälkeen verenpaine laskee.
- Tihentynyt virtsaamista on raportoitu.
- Lihasväriin ja voimakkaisiin ääni- tai fyysisiin ärsykkisiin reagoiminen on mahdollista. Hevosilla on harvinaisissa tapauksissa raportoitu voimakkaita reaktioita ksylatsiinin annostelun jälkeen.
- Ataksiaa ja palautuvia penisprolapseja voi esiintyä.
- Hyvin harvinaisissa tapauksissa ksylatsiini voi aiheuttaa lievää ähkyä suolen liikkeiden vähentyessä tilapäisesti. Ennaltaehkäisevästä toimenrahua voi antaa vasta kun sedaation vaikutus on kokonaan poistunut.

Jos havaitset vakavia vaiktuksia tai joitakin muita sellaisia vaiktuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

Haittavaikutusten esiintyyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

## 7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta ( $\geq 200$  kg) ja hevonen.

## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Nauta: lihakseen.

Hevonen: laskimoon.

Oikean annoksen varmistamiseksi, eläimen paino on määritettävä mahdollisimman tarkasti.

\* Nauta:

*Annos:*

Annos naudoille			
Annostaso	ksylatsiini (mg/kg)	Nerfasin vet 100 mg/ml (ml/100 kg)	Nerfasin vet 100 mg/ml (ml/500 kg)
I	0,05	0,05	0,25
II	0,1	0,1	0,5
III	0,2	0,2	1
IV	0,3	0,3	1,5

Annos 1: Sedaatio, lievä lihastonuksen lasku. Eläin pystyy seisomaan.

Annos 2: Sedaatio, selvä lihastonuksen lasku ja lievä analgesia. Eläin usein pysyy seisallaan, mutta voi käydä makaamaan.

Annos 3: Syvä sedaatio, vielä lisääntynyt lihastonuksen lasku ja analgesia. Eläin käy makaamaan.

Annos 4: Erittäin syvä sedaatio, merkittävä lihastonuksen lasku ja analgesia. Eläin käy makaamaan.

\* Hevonen:

*Annos:* kerta-annos 0,6-1 mg/kg ksylatsiinia  
(0,6-1 ml valmistetta 100 elopainokiloa kohden)

## 9. ANNOSTUSOHJEET

Injectio laskimoon tulee antaa hevosille hitaasti.

Tulppaa ei tule lävistää yli 20 kertaa. Lävistyskertojen määrä tulisi merkitä ulkopakkaukseen.

## 10. VAROAIKA

Nauta:

Teurastus: 1 vrk

Maito: nolla tuntia

Hevonen:

Teurastus: 1 vrk

Maito: nolla tuntia

## 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätä.

Ei saa käyttää pulloon ja pahvikoteloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaike on 28 vuorokautta. Päivämäärä, jolloin mahdollisesti jäljelle jäyntä valmiste on hävitettävä tulpan lävistämisen jälkeen, lasketaan tässä pakkausselosteessa ilmoitetun, ensimmäisen avaamisen jälkeisen kestoajan avulla. Tämä hävituspäivä on merkittävä sille osoitettuun kohtaan etiketissä.

## 12. ERITYISVAROITUKSET

### Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Hevonens:

- Ksylatsiini hidastaa suolen normaalista liikettä. Siksi sitä tulisi käyttää vain sellaisessa koliikissa, joka ei vastaa analgeetteihin. Ksylatsiinin käyttöä on syytä välttää umpsiuolen toimintahäiriöissä.
- Ksylatsiini tulisi annostella siinä paikassa, jossa hoitotoimenpide on tarkoitus suorittaa, sillä hevoset eivät mielellään kävele lääkkeen vaikutuksen alettua.
- Käytetään varoen hevolla, joilla on kohonnut kaviokuumeriski.
- Hevoset, joilla on hengityselinsairaus tai -toimintahäiriö, voivat saada henkeä uhkaavan hengenahdistuksen.
- Annos on pidettävä alhaisimpana mahdollisena.
- Yhteisvaikutukset muiden rauhoitus- tai anestesia-aineiden kanssa on huomioitava hyöty/haittarviota tehtäessä. Arvioinnissa on huomioitava valmisteiden koostumus, annos ja tehtävä kirurginen toimenpide. Suositeltavat annokset todennäköisesti vaihtelevat valittujen lääkeaineiden yhteisvaikutusten mukaan.

Nauta:

- Märehtijät ovat erittäin herkkiä ksylatsiinin vaikuttuksille. Alemmillä annoksilla naudat jäävät normaalista seisomaan, mutta jotkut yksilöt voivat käydä makuulle. Korkeimmilla suositelluilla annoksilla suurin osa eläimistä käy makuulle ja osa voi käydä kyljelleen.
- Ksylatsiini lamataa verkkomahan ja pötsin toimintaa, mikä voi johtaa puhaltumiseen. On suositeltavaa paastottaa (ei vettä eikä rehua) eläintä useita tunteja ennen ksylatsiinin annostelua.
- Nautoja on valvottava huolellisesti heräämisen ajan, sillä niiden kyky röyhäillä, yskiä ja niellä on heikentynyt rauhoituksen aikana. Eläinten tulisi maata rintalastansa varassa.
- Lihaksensisäinen annos, joka ylittää 0,5 mg/kg ruumiinpainoa, voi aiheuttaa naudalla henkeä uhkaavia vaikuttuksia (hengityksen ja verenkierton lama). Siksi mahdollisimman tarkka annostelu on tärkeää.
- Tätä valmistetta tulisi käyttää vain yli 200 kg painoisille naudoille. Koska valmisten konsentraatio on erittäin korkea, pienikin poikkeama injektoitavassa määriässä voi aiheuttaa vakavia haittavaikuttuksia. Mikäli alle 200 kg painoisia nautoja hoidetaan ksylatsiinilla, tulisi käyttää konsentraatioltaan matalampaa valmistetta (esim. 20 mg/ml).
- Yhteisvaikutukset muiden rauhoitus- tai anestesia-aineiden kanssa on huomioitava hyöty/haittarviota tehtäessä. Arvioinnissa on huomioitava valmisteiden koostumus, annos ja tehtävä kirurginen toimenpide. Suositeltavat annokset todennäköisesti vaihtelevat valittujen lääkeaineiden yhteisvaikutusten mukaan.

### Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Pidä eläimet rauhallisina, sillä ne voivat reagoida ulkoisiin ärsykkeisiin.

Vältä annostelua valtimoon.

Makaavilla naudoilla voi esiintyä tympaniaa, mikä voidaan välttää pitämällä eläimet makaamassa rintalastansa varassa.

Välttääksesi syljen tai rehun aspiraation, suuntaa eläimen päätä ja kaula alas päin. Pidä eläimet paastolla ennen valmisten annostelua.

- Iäkkääät ja uupuneet eläimet ovat herkempiä ksylatsiinille, kun taas hermostuneet ja erittäin kiihyneet eläimet voivat tarvita suhteellisen korkean annoksen.
- Nestehukasta kärsiville eläimille ksylatsiinia on käytettävä varoen.
- Älä ylitä suositeltua annosta.
- Annostelun jälkeen eläimen annetaan levätä rauhassa, kunnes täysi vaikutus on saavutettu.
- On suositeltavaa jäähdyttää eläimiä, jos ympäristön lämpötila ylittää 25 °C ja pitää eläimet lämpiminä alhaisissa lämpötiloissa.
- Kiviliaissa toimenpiteissä ksylatsiinia käytetään aina yhdistettynä paikalliseen tai yleisanestesiaan.
- Ksylatsiini aikaansaaja jonkinasteista ataksiaa; siksi ksylatsiinia on käytettävä varoen raajojen distaalisten osien toimenpiteissä ja seisovan hevosen kastaatiossa.
- Hoidettuja eläimiä valvotaan, kunnes vaikutus on täysin poistunut (esim. sydämen ja hengityselinten toiminta, myös toimenpiteen jälkeen). Tarvittaessa eläimet on erotettava toisistaan kiusaamisen välttämiseksi.

#### Eriyiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

- Vältä valmisteen injisoimista vahingossa itseesi. Nieltäässä tai injisoitaessa valmistetta vahingossa ihmiseen, on käännyttää välittömästi lääkärin puoleen ja näytettää tälle pakkausselostetta. ÄLÄ AJA AUTOA, sillä rauhoittuminen ja muutokset verenpaineessa ovat mahdollisia.
- Vältä ihon, silmien ja limakalvojen kosketusta valmisteen kanssa.
- Huuhdo altistunut ihoalue välittömästi runsaalla määräällä vettä.
- Riisu kontaminointuneet vaatteet, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihan kanssa.
- Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhdo silmät runsaalla määräällä puhdasta vettä. Oireiden ilmetessä, ota yhteys lääkäriin.
- Raskaana olevien naisten on käsiteltävä valmistetta erityisen varovasti, sillä systeemivaikutuksia aiheuttavan itse-injektion seurauksena voi olla kohdun supistuminen ja sikiön verenpaineen lasku.

#### Ohjeet lääkärille:

Ksylatsiini on alfa-2-adrenoreseptoriagonisti, joten imetyymisen jälkeiset oireet liittyvät aineen klinisiin vaikutuksiin ja ne voivat olla annosriippuvaista rauhoittumista, hengityselinten lamaa, sydämen hidasyöntisyyttä, verenpaineen laskua, suun kuivutta ja hyperglykemiaa. Kammioperäiset rytmihäiriöt ovat myös mahdollisia. Hengitys- ja verenkiertoelimistön oireet hoidetaan oireenmukaisesti.

#### Tiineys

Vaikka rotilla suoritetuissa laboratorioteisteissä ei ole havaittu teratogeenisia tai sikiötoksisia vaikutuksia, tulee valmistetta käyttää tiineyden ensimmäisen kahden kolmanneksen aikana vain eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella.

Älä käytä tiineyden viimeisellä kolmanneksella (erityisesti naudoilla) lukuun ottamatta synnyystä, sillä ksylatsiini aiheuttaa kohdun supistelua ja voi aiheuttaa ennenaikaisen synnytyksen.

Älä käytä alkionsiirtoja saavilla naudoilla, sillä lisääntynyt kohtutonus voi vähentää munasolun kiinnittymisen todennäköisyyttä.

#### Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muut keskushermosta lamaavat aineet (barbituraatit, huumausaineet, anesteetit, rauhoitteet jne.) voivat vahvistaa keskushermistolamaa, jos niitä käytetään yhdessä ksylatsiinin kanssa. Näiden aineiden annosta voidaan joutua vähentämään. Ksylatsiinia tulee käyttää varoen yhdistettynä neurolepteihin tai rauhoitteisiin.

Ksylatsiinia ei tule käyttää samanaikaisesti sympathomimeettisten lääkkeiden kuten adrenaliihin kanssa mahdollisen kammiorytmihäiriön takia.

Samanaikaisen suonensisäisten potentioitujen sulfonamidienväistöön alfa-2-agonistien kanssa on raportoitu aiheuttavan rytmihäiriötä, jotka voivat johtaa kuolemaan. Vaikka tällaisia vaikutuksia ei ole raportoitu tämän valmisteen kanssa, ei trimetopriimia/sulfonamideja sisältäviä valmisteita tule käyttää hevosen ollessa rauhoitettu ksylatsiinilla.

#### Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)

Tahattoman yliannostuksen sattuessa rytmihäiriötä, hypotensiota ja voimakasta keskushermosto- ja hengityslamaa voi esiintyä. Myös kouristusohtauksia on raportoitu yliannoksen jälkeen. Ksylatsiini voidaan kumota alfa-2-adrenergisillä antagonistilla.

Ksylatsiinin hengitysteitä lamaavia oireita hoidettaessa mekaaninen hengityksen avustaminen, joko hengitystä stimuloivien lääkkeiden (esim. doksapraami) kanssa tai ilman niitä, on suositeltavaa.

#### Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

### **13. ERITYiset varotoimet käyttämättömän valmisten tai jätemateriaalin hävittämiseksi**

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

### **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTty**

20.7.2017

### **15. MUUT TIEDOT**

Pullo, joka sisältää 10 ml, 25 ml tai 50 ml.

Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Vain eläinlääkärin annettavaksi.

## BIPACKSEDEL

Nerfasin vet 100 mg/ml, injektionsvätska, lösning till nötkreatur och hästar

### 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLika

#### Innehavare av godkännande för försäljning

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Nederlanderna

#### Tillverkare:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer  
Nederlanderna

### 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN

Nerfasin vet 100 mg/ml, injektionsvätska, lösning till nötkreatur och hästar  
Xylazin (som hydroklorid)

### 3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

per ml:

#### Aktiv substans:

Xylazin (som hydroklorid): 100,0 mg  
(motsvarar 116,55 mg xylazinhydroklorid)

#### Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,0 mg

Klar, färglös lösning.

### 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Sedation. Förmedicinering i kombination med ett bedövningsmedel.

### 5. KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller något hjälpämne.
- Använd inte till djur med mag/tarmförstopning eftersom de muskelavslappnande egenskaperna hos läkemedlet verkar accentuera förstopningen och kan möjligen orsaka kräkningar.
- Använd inte till djur med allvarliga försvagningar i njurar eller lever, nedsatt andningsfunktion, hjärtabnormaliteter, hypotoni och/eller chocktillstånd.
- Använd inte till djur med diabetes.

- Använd inte till djur med historik av krampanfall.
- Använd inte till nötkreatur som har en kroppsvikt under 200 kg. Använd inte till föl som är yngre än 2 veckor.
- Använd inte under det sista dräktighetsstadiet (risk för tidig födsel), förutom vid nedkomsten (se avsnitt 12).

## **6. BIVERKNINGAR**

Generellt sätt kan biverkningar som är typiska för alfa-2-adrenoceptoragonist som bradykardi, reversibel arytmia och hypotoni förekomma. Värmeregleringen kan påverkas och därmed kan kroppstemperaturen öka eller minska beroende på den omgivande temperaturen. Andningsdepression och/eller andningsstillestånd kan förekomma.

### Nötkreatur

- Hos nötkreatur kan xylazin förorsaka för tidig nedkomst och det minskar även implantation av ägg.
- Nötkreatur som har fått höga doser av xylazin lider ibland av lös avföring under 24 timmar efter injiceringen.
- Andra biverkningar inkluderar snarkningar, rikligt dreglande, ruminal atoni, atoni i tungan, regurgitation, uppsvällning, nasal stridor, hypotermi, bradykardi, ökad urinering och reversibel penisprolaps.

### Häst

- Hästar svettas ofta när sedationens effekt klingar av.
- Allvarlig bradykardi och minskad andningsfrekvens har rapporterats särskilt hos hästar.
- Efter administrering till hästar förekommer vanligtvis en övergående höjning följt av en sänkning av blodtrycket.
- Mer frekvent urinering har rapporterats
- Muslektdremor och rörelse som respons på skarpa ljud- eller fysiska stimuli kan förekomma. Även om de är sällsynta har våldsamma reaktioner rapporterats hos hästar efter administrering av xylazin.
- Ataxi och reversible penisprolaps kan förekomma.
- I mycket sällsynta fall kan xylazin förorsaka mild kolik eftersom tarmmotiliteten tillfälligt är nedsatt. Som en förebyggande åtgärd bör hästarna inte matas efter sedationen tills dess effekter har klingat av helt.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

Frekvensen av biverkningarna anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur uppväxer någon av dessa biverkningar under en behandlingsperiod)
- Vanliga (fler än 1, men färre än 10 djur av 100)
- Mindre vanliga (fler än 1, men färre än 10 djur av 1 000)
- Sällsynta (fler än 1, men färre än 10 djur av 10 000)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

## **7. DJURSLAG**

Nötkreatur ( $\geq 200$  kg) och hästar.

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Nötkreatur: intramuskulärt.

Häst: intravenöst.

För att försäkra en korrekt dosering, bör djurets vikt uppskattas möjligast noggrant.

\* Nötkreatur:

*Dosering:*

<b>Dosering för nötkreatur</b>			
Doseringsnivå	xylazin (mg/kg)	Nerfasin vet 100 mg/ml (ml/100 kg)	Nerfasin vet 100 mg/ml (ml/500 kg)
I	0,05	0,05	0,25
II	0,1	0,1	0,5
III	0,2	0,2	1
IV	0,3	0,3	1,5

Dos 1: Sedation, med en liten minskning av muskeltonus. Förmågan attstå upp bibehålls.

Dos 2: Sedation, markerad minskning av muskeltonus och viss analgesi. Djuret kan vanligen förblif staende men kan komma att lägga sig ner.

Dos 3: Djup sedation, ytterligare minskning av muskeltonus och en grad av analgesi. Djuret lägger sig ner.

Dos 4: Mycket djup sedation, en djupgående minskning av muskeltonus och en grad av analgesi. Djuret lägger sig ner.

\* Häst

*Dosering:* enkeldos på 0,6-1 mg xylazin per kg kroppsvikt.  
(0,6-1 ml produkt per 100 kg kroppsvikt).

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Intravenösa injektioner till hästar ska ges långsamt.

Korken bör inte punkteras mer än 20 gånger. Antalet punktioner bör noteras på den yttre förpackningen

## **10. KARENSTID**

Nötkreatur:

Kött och slaktbiproducter: 1 dag  
Mjölk: noll timmar

Häst:

Kött och slaktbiproducter: 1 dag  
Mjölk: noll timmar

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan och kartongen efter (EXP).

Hållbarhet i öppnad inre förpackning är 28 dagar.

En öppnad injektionsflaska ska användas inom den hållbarhetstid för öppnade förpackningar som anges

i bipacksedeln. Anteckna detta sista användningsdatum i det utrymme som reserverats för ändamålet på flasketiketten.

## 12. SÄRSKILDA VARNINGAR

### Särskilda varningar för respektive djurslag

Häst:

- Xylazin hämmar normal intestinal motilitet. Därför ska det endast användas till hästar med kolik som inte är mottagliga för analgetikum. Användning av xylazin ska undvikas till hästar med blindtarm funktionsnedsättning.
- Efter att hästar behandlats med xylazin är de ovilliga att gå, så när det är möjligt ska läkemedlet administreras på den plats där behandlingen/undersökningen ska genomföras.
- Försiktighet ska vidtas när produkten administreras till hästar som är mottagliga för fång.
- Hästar med luftvägssjukdom eller -nedsättning kan utveckla livshotande dyspné.
- Dosen ska hållas så låg som möjligt.
- Association med andra pre-narkosmedel eller narkosmedel ska vara föremål för nytt/riskbedömning. Denna bedömning ska överväga produkternas komposition, deras dos och kirurgins art. De rekommenderade doserna kommer troligtvis att variera med valet av narkosmedelsassociation.

Nötkreatur:

- Idisslare är mycket mottagliga för xylazinpåverkan. Normalt sett förblir nötkreatur stående vid låga doser men några djur kan lägga sig ner. Vid de högsta rekommenderade doserna kommer de flesta djuren att lägga sig ner och några djur kan lägga sig på sidan.
- De retikala-ruminala motoriska funktionerna hämmas efter en injektion av xylazin. Detta kan resultera i trumsjuka. Det är tillrådigt att undanhålla mat och vatten i flera timmar före administrationen av xylazin.
- Hos nötkreatur bibehålls men reduceras förmågan att stöta upp, hosta och svälja under sedationsperioden, därför ska nötkreaturen övervakas noga under återhämtningsperioden: djuren ska behållas liggande på brösten.
- Hos nötkreatur kan livshotande effekter framträda efter intramuskulära doser på över 0,5 mg/kg kroppsvikt (andnings- och cirkulationsrubbning). Därför krävs mycket precis dosering.
- Denna produkt ska endast användas till nötkreatur som väger 200 kg eller mer. Eftersom den är högkoncentrerad kan en liten avvikelse från den faktiska volymen som ska injiceras orsaka allvarliga biverkningar. I fall där nötkreaturen som väger mindre än 200 kg behöver få behandling ska xylazin med lägre styrka användas (t.ex. 20 mg/ml).
- Association med andra pre-narkosmedel eller narkosmedel ska vara föremål för nytt/riskbedömning. Denna bedömning ska överväga produkternas komposition, deras dos och kirurgins art. De rekommenderade doserna kommer troligtvis att variera med valet av narkosmedelsassociation.

### Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Håll djuren lugna eftersom de kan reagera på externa stimuli.

Undvik intra-arteriell administrering.

Tympany kan stundtals förekomma hos liggande nötkreatur och kan undvikas genom att se till att djuret ligger på brösten.

För att undvika aspiration av saliv eller mat, sänk ner djurets huvud och hals. Se till att djuren fastar innan produkten används.

- Äldre och utmattade djur är mer känsliga för xylazin medan nervösa och lättretliga djur kan behöva en relativt hög dos.
- Om uttorkning förekommer ska xylazin användas med försiktighet.
- Överskrid inte den rekommenderade doseringen.

- Efter administreringen ska djuren få vila i lugn och ro tills full effekt har uppnåtts.
- Det är tillräddigt att svalka djur när den omgivande temperaturen är över 25 ° C och värma djur vid lägre temperaturer.
- Vid smärtsamma ingrepp ska xylazin alltid användas i kombination med lokal eller allmän bedövning.
- Xylazin producerar en viss grad av ataxi; därför måste xylazin användas med försiktighet vid ingrepp som inbegriper de distala extremiteterna och vid stående kastreringar av hästar.
- Behandlade djur ska alltid övervakas tills effekterna har sjunkit undan helt (t.ex. hjärt- och lungfunktioner, även i den postoperativa fasen) och de ska hållas avskilda för att undvika trakasserier.

#### Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

- Försiktighet ska iakttas för att undvika ofrivilliga självinjektioner. Vid fall av oavsiktligt oralt intag eller självinjicering, sök medicinsk rådgivning omedelbart och visa packsedeln för läkaren men KÖR INTE BIL eftersom sedation och blodtrycksändringar kan förekomma.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.
- Tvätta den exponerade huden omedelbart efter exponeringen med stora mängder vatten.
- Ta bort kontaminerade kläder som är i direkt kontakt med hud.
- Om produkten oavsiktligt kommer i kontakt med ögon, skölj rikligt med färskvatten. Om symptom förekommer, konsultera en läkare.
- Om gravida kvinnor hanterar produkten ska särskild försiktighet vidtas så att självinjicering inte förekommer eftersom livmodersammandragningar och minskat blodtryck hos fostret kan förekomma efter oavsiktig systemisk exponering.

Råd till läkare:

Xylazin är en alfa-2-adrenoceptoragonist, symptomen efter absorbering kan inbegripa kliniska effekter inklusive dosberoende sedation, andningsdepression, bradykardi, hypotoni, torr mun och hyperglykemi. Ventrikulär arytmia har även rapporterats. Respiratoriska och hemodynamiska symptom ska behandlas symptomatiskt.

#### Dräktighet

Även om laboratoriestudier av råttor inte har visat några bevis för teratogena eller fetotoxiska effekter ska användning under de två första trimestrarna av dräktigheten endast ske i enlighet med nytta/riskbedömning av den ansvariga veterinären.

Använd inte under de senare stadierna av dräktigheten (särskilt till nötkreatur) förutom vid nedkomst, eftersom xylazin orsakar livmodersammandragningar och det kan förorsaka för tidiga värkar.

Använd inte hos nötkreatur som får äggtransplantationer eftersom ökad tonus i livmodern kan minska chanserna för implantationen av ägget.

#### Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra CNS-lugnande medel (barbiturater, narkotiska medel, anestesimedel, lugnande medel etc.) kan orsaka additiv CNS-depression om de används med xylazin. Doseringen av dessa medel kan behöva minskas. Xylazin ska därför användas med försiktighet i kombination med neuroleptikum eller lugnande medel.

Xylazin ska inte användas i kombination med sympathomimetiska läkemedel som adrenalin eftersom detta kan resultera i ventrikulär arytmia.

Samtidig intravenös användning av förstärkta sulfonamider med alfa-2-agonister har rapporterats orsaka hjärtarytmia som kan vara dödlig. Trots att inga sådana effekter har rapporterats för denna produkt rekommenderas det att intravenös administrering av produkter som innehåller trimetoprim/sulfonamid inte ska genomföras när hästar har bedövats med xylazin.

#### Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Vid händelse av en oavsiktlig överdos kan hjärtarytm, hypotoni och djupgående CNS- och andningsdepression förekomma. Krampanfall har också rapporterats efter överdoser. Xylazin kan motverkas med alfa-2-adrenerga antagonister.

För att behandla de andningsnedsättande effekterna av xylazin rekommenderas mekanisk andningshjälp med eller utan andningsstimulans (t.ex. doxapram).

#### Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

### **13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUCTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

### **14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

20.7.2017

### **15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Flaskorna innehåller 10 ml, 25 ml eller 50 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Administreras endast av veterinär.